

HEMIPTERA NOVA ORIENTALIA

ab E. Bergroth descripta.

Fam. PENTATOMIDÆ.

Spudæus aculeatus n. sp.

Subdepressus, ochraceus, nigro-fusco-punctatus, vitta laterali inframarginali anteculari mox supra tubercula antennifera furcata, articulo quarto rostri (basi excepta), parte minus quam dimidia postica marginis lateralis anterioris prothoracis, apice scutelli, basi et apice segmentorum connexivi, vitta sublaterali anteriore pleurarum, vittis duabus latis mediis mesosterni, angulis basalibus et apicalibus segmentorum ventris, fascia basali inferiore et processu laterali segmenti genitalis maris superne et « cauda rectali » (SHARP) apice superne nigris, macula reniformi ad angulos basales scutelli viridi-nigra, macula spiraculum includente segmentorum ventris nigro ænea, antennis nigris, articulo primo et dimidio basali secundi ochraceo-conspersis, annulo lato basali articulo trium ultimorum flavo, pedibus ochraceis, apice femorum dense, in posticis confluer, nigro-conspurcatis, annulo subbasali angustiore et subapicali latiore tibiarum, annulo basali et apicali articuli primi tarsorum articuloque horum ultimo toto nigris. Caput pronoto medio paullo longius, jugis et tylo irregulariter punctatis, margine interno illorum impunctato, punctis verticis in vittas sex angustas ordinatis, vitta extima leviter S-formiter curvata, vitta latiuscula intraoculari impunctata, bucculis medium oculorum paullum superantibus, antice in dentem acutum apice fuscum deflexis, rostro medium segmenti tertii ventris paullum superante, articulo primo bucculis parum longiore, articulo primo antennarum dimidio suo apicem capitis superante, articulis tribus mediis subæque longis, singulo primo longiore, quinto quarto paullo brevior. Pronotum apice capite cum oculis paullo latius, medio æque longum ac apice latum, sat dense irregulariter punctatum, marginibus lateralibus anticis anguste depressis, arcuato-sinuatis, antice per spatium breviusculum acute irregulariter denticulatis, angulis lateralibus in spinam acutissimam extus productis. Scutellum sat dense sed pone frena parcius punctatum, parte basali nonnihil convexo-elevata, punctis mox ante medium scutelli in maculam majusculam rotundatam condensatis. Hemelytra apicem abdominis superantia, corio sat dense irregulariter punctato, in area antemediana et majore mediana mesocorii atque angulum apicalem versus multo remotius punctato, angulo apicali corii latiuscule rotundato, membrana

fusco-umbrata, regione anguli basalis interioris et venis piceis. Abdomen subtus medio lævi excepto parce subtiliter concoloriter punctulatum, solum latera versus ad marginem basalem et apicalem segmentorum fusco-punctatum, medio e basi sua usque ad apicem segmenti quarti late haud profunde sulcatum, spiraculis segmenti primi (ut in *Halyinis* sæpe) metapleura non oblectis, segmento sexto maris medio duobus præcedentibus unitis paullo longiore, segmento genitali maris utrinque in processum spiniformem longiuscule producto, subtus trisinuato, sinu medio profundo, sinibus lateralibus multo brevioribus. — Long. ♂ 18 mill.

Australia (Queensland).

Cum nulla alia specie confundendus, *S. Doria* SIGN. forte proximus.

Fam. COREIDÆ.

Aschistocoris bombæus n. sp.

Ochreo-testaceus, dense fusco punctulatus, articulo ultimo antennarum pallide rubiginoso, macula minuta antemediana propleurarum et submediana meso- et metapleurarum nigra, ventre medio multo remotius punctulato, punctis utrinque in vittam condensatis, inter hanc vittam et limbum lateralem vitta fere concoloriter punctulata et seriem striolarum longitudinalium nigrarum, plerumque duarum in quoque segmento, includente prædito, spiraculis fuscis, linea longitudinali media pronoti et scutelli ac venis corii lævigatis, membrana opaca, incana, venis dilute vitulino-incarnatis. Caput inter oculos et basin antennarum leviter angustatum, rostro coxas medias paullum superante, articulis tribus primis antennarum minute fusco-granulatis, primo, tertio quartoque subæque longis, secundo ceteris sat multo longiore, primo subtriquetro, secundo subcompresso, ambobus utrinque leviter sulcatis. Pronotum medio latitudine paullulo brevius, apice sat profunde sinuatum. Metapleuræ margine postico leviter sinuatæ. Hemelytra (♂) apicem abdominis fere attingentia. Pedes minutissime fusco-granulati. Segmentum genitale maris apice sinuatum, fundo sinus processu spatuliformi, late obcordato, stylo brevi angusto suffulto instructo. — Long. ♂ 12 mill.

India orientalis (Bombay).

Colore insolita membranæ opacæ a ceteris tribus speciebus divergens, *A. brevicornis* DALL. proximus.Obs. — Pro genere *Aschistus* STÅL, cujus nomen præoccupatum est (FÖRSTER, Hymenoptera, 1868), nomen propono *Aschistocoris*.*Acantholybas Kirkaldyi* n. sp.

Oblongo-ovatus, fusco-testaceus, sat dense fusco-punctatus, capite

lem interiorem occupante luteo-ochracea, antennis, articulo primo et basi secundi exceptis, fusco-olivaceis, articulo apicali rostri pallide fusco, tarsi rufotestaceis. Caput lobo postico pronoti distincte longius, spatio interoculari diametro longitudinali oculi dimidio latiore, articulo secundo antennarum primo quintuplo longiore. Lobus anticus pronoti distincte sculptus, tuberculo angulorum apicalium obtuso, impressione media postica per lobum posticum lineariter continuata; lobus posticus transversim leviter rugosus, rugis impressionis lateralis multo distinctioribus. Scutellum in processum sublinearem horizontalem impressione transversa a cetera parte scutelli discretum productum. Mesosternum impressione media rhomboidali praeditum. Hemelytra apicem abdominis nonnihil superantia. Pedes sat longe modice dense ochraceo-pilosi. Long. ♂ 14 mm.

India orientalis (Bombay).

Colore valde insignis et a ceteris speciebus primo visu distinguendus, *T. fuscipenni* (STÅL) proximus.
