

dagegen sind die 2 Vorderflecken untereinander und mit den hinteren so verschmolzen, dass in der Regel nur der Längsarm der kreuzförmigen Zeichnung als lichte, lanzettförmige Mittellinie deutlich erkennbar ist. Die Wangenflecken sind ferner hier stets grösser, deutlicher und stehen mit den Längsmakeln in Zusammenhang, so dass sie beiderseits einen vom Hinterrande des Kopfes schräg nach vorne verlaufenden, hellen Seitenstreifen und einen lichten Fleck hinter den Augenhügeln begrenzen. Den von Brauer angegebenen schwarzen Punkt auf den Coxen*) der Hinterbeine habe ich bald mehr bald weniger deutlich, aber ohne Ausnahme bei allen untersuchten Individuen gefunden, selbst bei solchen, die schon mehrere Jahre in Weingeist gelegen waren. Möglicherweise mag jedoch derselbe, sowie die Zeichnung am ganzen Körper, im Laufe der Jahre sehr undeutlich werden oder ganz verschwinden. Der von Hagen (l. c. p. 290) erwähnte Unterschied in der Fühlerbildung trifft häufig zu; da jedoch diese nicht nur innerhalb der Art wechselt, sondern sogar oft an einem und demselben Thiere der rechte und linke Fühler verschieden gebildet sind, kann das Verhältniss der zwei ersten Glieder nicht als charakteristisch betrachtet werden. Die Klauen der Hinterfüsse endlich finde ich bei *M. formicarius* länger und deutlich stärker gekrümmt als bei *M. europaeus*.



→ Eine neue Wanzenart aus dem Himalaya.

Von Dr. G. v. Horváth in Budapest.

✓ *Stortheocoris* nov. gen. *)

Corpus breviter ovale. Caput transversum, leviter convexum, ante sinus anteculares antrorsum sensim dilatatum; jugis deplanatis totis distantibus, ante tylum subelevatum haud convergentibus; tuberculis antenniferis extus in spinam conicam cum marginibus lateralibus capituli in eodem plano positam productis; bucculis percurrentibus, humilibus, ubique aequae altis. Antennae breviusculae, articulo basali a supero toto distinguendo, crassiusculo,

*) Als *Coxa* bezeichne ich nach dem Vorgange Mac Lachlan's (Stett. Ent. Z. 1873, pag. 448) das grosse, querliegende Stück der Beine.

*) στέρθη = Zacke; κόρη = Wanze.

Wien. Ent. Ztg. 2(12) 296-297

articulo secundo tertio multo brevior, articulo quarto tertio nonnihil brevior, articulo quinto praecedente paulo crassior, elongato-fusifor. Thorax transversus, marginibus lateralibus anticis acutis, irregulariter serratis, pone angulum anticum processu armatis, ante angulos humerales in dentem acutiusculum productis, disco medio transversim impresso, lobo antico nonnihil rugoso, pone marginem anticum sulco transverso utrinque versus angulos anticos sensim evanescente ibique ad marginem anticum appropinquato instructo. Scutellum magnum, corio longius, apicem abdominis attingens (♂) vel fere attingens (♀), pone basin leviter angustatum, dein leviter ampliatum; frenis brevibus. Prosternum sulcatum, sulco marginibus modice elevatis praedito. Pedes mediores; tibiis superne sulcatis. Segmentum genitale marium secundum totum obtectum, tantum segmentum genitale tertium distinguendum.

Structura capituli ab affinis Podopariis optime distinctum genus Pentatomidarum. A Scotinophara Stål praeterea rostro brevior annuloque collari utrinque in dentem prominulo destituto divergit. Ab Amauropepla Stål (genere mihi ignoto) capite ante sinus anteculares antrorsum haud angustato, tylo subelevato et rostro longiore differre videtur.

✓ *Stortheocoris nigriceps* n. sp.

Fusco-testaceus, sat dense fusco-punctatus; capite, pectore discoque maximo ventris nigris; jugis tylum distincte superantibus, ante medium sensim paulo dilatatis, apice oblique rotundato-truncatis; spina tuberculorum antenniferorum valida, recta, oblique extrorsum vergente et apice subacuta; marginibus lateralibus anticis thoracis pone processum collarem triangularem levissime rotundatis et dilatatis, sulco intramarginali obsolete marginibus parallelo; linea mediana percurrente plus minusve obsolete thoracis maculisque tribus basalibus scutelli callosis, pallidis; scutello apice truncato (♂) vel rotundato (♀); membrana albedo-hyalina; limbis lateralibus metastethii et ventris late flavo-testaceis, nigro-punctatis, spiraculis ventris maculisque parvis basalibus connexivi nigris; rostro, antennis et pedibus flavo-testaceis, nigro-variegatis, parce griseo-pilosulis; articulo tertio antennarum articulo secundo plus quam triplo longiore. ♂ et ♀ long. 7, lat. 4 mm.

Patria: Himalaya. (Mus. Hung.)