

~~Horvath~~ Horvath on computers  
- 82 -

tibiis posticis totis tarsisque omnibus nigris. Capite anteriore, margine incisuræ imæ posticæ pronoti maculisque minusculis marginalibus atque subbasalibus segmentorum connexivalium supra subtusque (supra in segmentis posterioribus introrsum in fasciolas obsoletas continuatis) dilute luteis. Imo apice scutelli, macula majuscula rotundata corii marginem apicalem tangente lineaque in eo ipso margine, areolam anteriorem corii retrorsum claudente, cretaeis. Membrana nigra, cyaneo-micante. Antennæ et pedes intermediis desunt.

Long. corp., 20 2/3; lat. hum., 6 1/2; lat. max. abd., 9 mill.

Femoribus (saltem anticis et posticis) unicoloribus, tibiis atque anticarum dimidio basali miniativo a congenericis facillime distinguuntur.

Assam (coll. Breddin).

NOTE SUR LE *SEHIRUS MACULIPES* ET ESPÈCES AFFINES

Par le Dr G. HORVATH.



Mulsant et Rey ont décrit, en 1852, du Midi de la France, sous le nom de *Cydnus maculipes*, un Pentatomide que les Hémiptéristes appellent aujourd'hui *Sehirus maculipes*. C'est une espèce méridionale qui a été signalée déjà de l'Italie et de l'Espagne, et qui habite aussi l'Algérie. J'en ai vu encore un exemplaire de Hongrie (Fiume) dans la collection de M. Montandon, qui l'a reçu de feu Lethierry. On l'avait indiqué même du Caucase, mais évidemment à tort. Il existe, en effet, au Caucase et dans l'Arménie russe, un insecte bien voisin; cependant, c'est une espèce distincte, le *Sehirus congener* Jak. (1).

Edm. André a trouvé dans les environs de Beaune, sur le *Ceanothus angustifolius*, en quantité, un autre *Sehirus* du même

(1) Le *Sehirus congener* Jak. paraît une espèce exclusivement orientale, qui ne se trouve pas dans l'Europe occidentale. C'est une étiquette mal placée qui me l'a fait indiquer une fois erronément du Midi de la France. (*Revue d'Entomologie*, 1897, p. 96).

groupe, qu'il a répandu sous le nom de *S. maculipes* et qui figure depuis une vingtaine d'années dans toutes les collections sous ce nom. Un nouvel examen vient de me prouver que cet insecte de Beaune diffère bien du *S. maculipes* et constitue une espèce distincte, encore inédite.

Une quatrième espèce du même groupe des *Sehirus*, méconnue jusqu'à présent et également nouvelle, habite la Sicile.

En décrivant ces deux espèces nouvelles, je crois utile d'indiquer d'abord dans un tableau synoptique les caractères qui séparent les quatre espèces bien voisines et bien semblables du petit groupe du *Sehirus maculipes*.

- A. Cories brunes, leur rebord latéral et partie de l'exocorie voisine de ce rebord d'un blanc d'ivoire; échancrure antérieure du pronotum moins profonde. . . . . *S. fuscipennis* n. sp. ✓
- B. Cories noires, la couleur blanche de leur rebord latéral bien limitée au rebord même; échancrure antérieure du pronotum profonde.
  - a. Dessus du corps noir sans reflet bleuâtre ou verdâtre; tête courte et à peine échancrée en avant; joues peu réfléchies et presque tronquées à l'extrémité; ventre partout densément et distinctement ponctué.
    - z. Bord externe du connexivum avec un trait jaune à la base des segments; membrane d'un brun noir. . . . . *S. maculipes* M. R. ✓
    - β. Connexivum entièrement noir; membrane blanche. . . . . *S. congener* Jak. ✓
  - b. Dessus du corps noir avec un léger reflet bleuâtre ou verdâtre; tête plus longue et fortement échancrée en avant; joues fortement arrondies et réfléchies à l'extrémité; ventre à ponctuation moins dense sur les flancs, très faible et presque imperceptible sur le disque. . . . . *S. micans* n. sp. ✓

✓ *Sehirus fuscipennis* n. sp.

Breviter ovalis, niger, nitidus, punctatus; marginibus lateralibus pronoti et hemelytrorum callosis eburneis; capite superne fortiter, fere rugoso-punctato, ante oculos sensim angustato, apice leviter reflexo, inciso, margine reflexo ferrugineo, jugis apice rotundato-truncatis, tylum haud includentibus et paulo superantibus; antennarum articulis secundo et tertio æquilongis, ferrugineis, dimidio apicali articuli tertii nigro; pronoto transversim leviter impresso, apicem versus sensim rotundato-angustato, margine antico leviter sinuato; hemelytris fusco-piceis, corio non solum margine costali calloso, sed etiam intra hunc marginem anguste flavo-albido; membrana albida, disco plus minusve infusca; rostro, maculis pectoris ad coxas pedibusque fusco-piceis, tibiis (basi apiceque exceptis) albidis, fusco-spinulosis, tarsis basi albidis; ventre minus dense

punctato, pone medium maculis marginalibus flavo-albidis notato.  
♂ ♀. — Long., 4 1/2-5 1/2 mill.

France: Beaune, commun sur *Centranthus angustifolius* (Edm. André). L'habitat de cette espèce n'est pas limité seulement à Beaune. Je la possède aussi de Dijon, et M. le docteur Puton me l'a donnée de l'Espagne (Escorial).

Elle se distingue du *S. maculipes* M. R. par la taille un peu plus large, la tête plus fortement réfléchie et échancrée en avant, le deuxième article et la base du troisième article des antennes rous-sâtres, l'échancrure antérieure du pronotum moins profonde, les cories brunes ou brunâtres, la couleur blanche du rebord latéral des cories envahissant aussi une partie de l'exocorie voisine, la membrane blanchâtre et le ventre moins densément ponctué.

✓ *Sehirus micans* n. sp.

Oblongo-ovatus, niger, cuperne cœruleo vel viridi-micans, nitidus, punctatus; lateribus pronoti et hemelytrorum callosis eburneis; capite longiusculo, antrorsum parum angustato, apice fortiter inciso, jugis tylum fere includentibus et distincte superantibus, apice singulatim rotundatis ibique et lateribus late redexis; articulis secundo et tertio antennarum longitudine subæqualibus; pronoto transversim impresso, versus apicem sensim rotundato-angustato, apice profunde sinuato; hemelytris tantum ipso margine costali calloso eburneo, membrana albida; tibiis albidis, nigro-spinulosis, basi nigris, apice cum tarsis fuscis; ventre lateribus sat remote punctato, disco minutissime et obsoletissime punctulato, pone medium striolis marginalibus flavidis signato. ♂ ♀. — Long., 4 1/2-5 1/2 mill.

✓ *Sehirus maculipes* Fieb., *Eur. Hem.*, p. 368. 6. (1861) excl. syn.

Sicile. — J'ai vu deux exemplaires dans les Musées de Budapest et de Vienne et deux autres dans la collection de M. Montandon.

Cette espèce diffère du *S. maculipes* M. R. par le reflet bleuâtre ou verdâtre du dessus, la structure de la tête; la membrane blanche et la ponctuation du ventre moins serrée sur les flancs et beaucoup plus fine sur le disque.

C'est bien l'espèce décrite par Dyber sous le nom de *S. maculipes*. Les caractères indiqués par lui: « Schwarzgrün, glänzend. Membran glasartig durchscheinend » et « Kopf länglich, vorn eingekerbt, die Jochende rundlich » ne laissent aucun doute à cet égard.

SUR QUELQUES

HÉMIPTÈRES AQUATIQUES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

Par G.-W. KIRKALDY.

*Thaumastometra* n. g.

Genre de la sous-famille *Gerrinæ* (*sens. lat.*), appartenant à la section dans laquelle les bords intérieurs des yeux sont concaves; allié à *Ptilomera* Am. et Serv. et à *Heterobates* Bianchi.

Corps entier plus ou moins fourni d'une pubescence assez éparsée et courte; tête petite, bec de quatre segments, antennes plus courtes que la longueur entière du corps, premier segment plus long que les trois autres réunis. Prothorax petit, bien distinctement séparé du mésothorax, celui-ci bien développé, rondement élargi de côté, mesonotum bien distinctement séparé du metanotum; prosternum canaliculé au milieu, metasternum caché entièrement (?) sous le mesosternum. Elytres et ailes manquantes (chez les quatre exemplaires que j'en ai vus). Tibias antérieurs bien légèrement plus longs que les tarsi, fournis d'un éperon bien fort (droit en dessus, convexe en dessous) près le sommet; tarsi de deux articles, les ongles falciformes, bien courts, prenant naissance au-dessous du sommet, le deuxième article tarsal excisé comme chez l'*Hydroessa*, etc. Fémurs intermédiaires et postérieurs non ciliés, plus longs que le corps entier; tibias intermédiaires légèrement (mais assez distinctement) ciliés; tarsi de deux articles (?) [ongles perdus]. Abdomen petit, assez retiré, composé (évidemment) de neuf segments, les deux derniers fortement modifiés, sont superficiellement comme chez *Halobates* Eschsch.; connexivum assez bien développé aux sept premiers segments.

*Thaumastometra* diffère de *Ptilomera* par la tête et le pronotum beaucoup plus petits en proportion, les méso- et métathorax plus grands et plus convexes de côté et par la forme tout à fait différente de l'abdomen; de plus, dans *Ptilomera*, les fémurs intermédiaires sont fortement ciliés chez l'imago. Diffère d'*Heterobates* par les proportions des segments antennaires et par les proportions relatives des tibias et des tarsi antérieurs; de plus, dans *Heterobates*, le corps est assez long et étroit, et il manque le curieux appendice abdominal de la *Thaumastometra*.