

Montandon, 1899

Ann. Mus. Civ. Storia Nat. Genova

(2) 19: 551-554

on computer

Cat.



Division of Entomology
Department of Entomology
U. S. National Museum

INSECTES DE LA DERNIÈRE EXPÉDITION BOTTEGO

PLATASPIDINAE

1899

PAR A. L. MONTANDON

1. *Pseudoponsila puncticeps*, Montand. (Ann. del Mus. Civ. di St. Nat. di Genova, Ser. 2.^a, Vol. XV, 6 Aprile 1895, p. 98).

Lago Bass Narok, Septembre 1896.

2. *Coptosoma Bottegoi*, nov. sp. — Noir, légèrement bronzé, brillant; avec la plus grande partie des joues, la double marge sur les côtés du pronotum; des taches assez grandes sur le devant du pronotum, derrière le niveau des ocelles; deux petits traits transversaux, assez allongés mais très étroits sur le disque du pronotum, un de chaque côté derrière les cicatrices et au devant du sillon transversal; une tache sur l'angle huméral; marge élytrale; quatre taches sur la base de l'écusson, deux de chaque côté, une triangulaire sur l'extrémité de la callosité basilaire, l'autre transversale, étroite, sur le petit bourrelet qui fait suite extérieurement à la callosité basilaire; un double liseré sur tout le pourtour externe de l'écusson, le liseré interne trois fois plus large que l'externe; jaunes. Ces deux liserés de l'écusson sont séparés par le faible sillon noir intramarginal qui entoure l'écusson sur ses côtés externes.

Tête lisse brillante avec quelques rides transversales très superficielles sur le tylus et quelques vagues points enfoncés à peine visibles devant les ocelles, vertex lisse sans points enfoncés appréciables. Joues arrondies subtronquées en avant, étroitement brunes sur leur bord externe, un peu plus largement noires le long du tylus, pas plus longues que ce dernier qui est libre à peine rétréci à son extrémité; les taches jaunes des joues tronquées en arrière au niveau du milieu des yeux.

Ponctuation du pronotum et de l'écusson très faible et espacée, nulle sur le disque; les taches jaunes humérales du pronotum rejoignant l'extrémité de la bordure latérale jaune; le sillon qui sépare le double liseré latéral du pronotum en ligne droite, enfoncée, ponctuée, coupant postérieurement le bord externe, formant la limite interne des dilatations latérales, mais n'atteignant pas tout à fait en avant le bord antérieur du pronotum en étroit bourrelet bien accentué, ininterrompu, sur lequel le liseré latéral externe jaune se coude et se prolonge de chaque côté jusque derrière le niveau du milieu de l'œil. Sillon transversal du pronotum en dépression peu accusée, mais bien visible et ponctuée même sur le disque.

Callosité basilaire de l'écusson faible, mais bien limitée en arrière par une ligne enfoncée très faible quoique visible même sur le disque. Liseré jaune interne de l'écusson à peine élargi et très faiblement remontant au milieu en arrière au dessus de la pièce génitale ♀ (♂ inconnu).

Antennes jaunâtres légèrement pubescentes, un peu rembrunies sur leurs deux derniers articles; pattes jaunâtres pubescentes comme les antennes, avec les fémurs bruns; tibias non sillonnés, au moins à la paire postérieure.

Abdomen presque lisse avec des rangées transversales de points enfoncés espacés plus visibles sur la base et l'extrémité des segments; le bord externe de l'abdomen ainsi qu'une assez forte virgule calleuse sur le bord de chacun des segments, jaunes. Pièce génitale ♀ large, noire assez étroitement bordée de jaune à sa partie supérieure.

Longueur 2,8 — largeur 2,6 millimètres.

✓ Da Mat-Agoi a Lugh. Novembre 1895.

Par sa tête lisse cette espèce rentre dans le groupe des *C. marginellum*, Dall., *limbatellum*, Stål et *Stâli*, Montand. Elle s'en distingue facilement par sa teinte légèrement bronzée, par les liserés et les taches du pronotum et de l'écusson plus étendus et plus nombreux, la forme moins convexe, la ponctuation beaucoup moins accentuée.

✓ 3. *Coptosoma alienum*, nov. sp. — Forme très convexe, partie antérieure du pronotum et tête fortement déclives; d'un noir

brillant; avec la surface des joues, un double liseré sur les côtés du pronotum et deux assez grandes taches sur son bord antérieur ainsi que deux très petits points sur son disque; la plus grande partie des élytres; quatre taches sur la base de l'écusson, deux de chaque côté, l'une subtriangulaire presque à l'extrémité de la callosité basilaire, l'autre transversale, assez large, sur le bourrelet faisant suite extérieurement à la callosité; un double liseré à l'écusson arrêté en avant au tiers basilaire des côtés latéraux, jaunes; les liserés de l'écusson séparés par un sillon intramarginal brunâtre, le liseré externe en dehors du sillon très étroit à peine rembruni; le liseré interne très large, au moins quatre fois plus large que l'externe, marqué par places à son côté interne de quelques très petits points espacés noirs.

Surface de la tête avec des points enfoncés bien marqués, même sur le vertex. Joues très étroitement noires sur leur bord externe, la surface jaune depuis le milieu des yeux, le côté interne assez largement noir le long du tylus; assez convergentes et arrondies en avant, mais non confluentes; tylus rétréci à l'extrémité atteignant le bord antérieur, légèrement brun au sommet.

Pronotum et écusson presque lisses très finement et assez densément ponctués, la ponctuation un peu plus accentuée sur les côtés. Sillon transversal du pronotum en dépression très superficielle, même sur les côtés, à peine visible sur le disque. L'étroit bourrelet du bord antérieur est entièrement noir, même derrière les yeux; les taches jaunes du bord antérieur très transversales, un peu élargies à leur côté interne, s'étendent en dedans du bourrelet noir antérieur depuis le niveau du milieu de l'œil jusqu'au niveau des ocelles et les petits points jaunes discoïdaux assez rapprochés se trouvent situés devant le sillon transversal au niveau de l'extrémité interne des taches antérieures. Les liserés latéraux du pronotum se terminent en avant derrière le petit bourrelet antérieur noir, séparés par le sillon noir densément ponctué et élargi au milieu qui limite les dilatations latérales à leur côté interne; ce sillon noir n'atteint pas

postérieurement le côté latéral qui se continue en arrière jaune lisse et calleux jusque sous l'angle huméral.

Callosité basilaire de l'écusson faible mais cependant assez bien limitée en arrière par une très fine ligne enfoncée ininterrompue, même sur le disque où elle est néanmoins très peu visible. Liseré interne de l'écusson légèrement rétréci au dessus de la pièce genitale ♂; cette pièce aussi large que haute, verticale, noire, étroitement bordée de jaune sur les côtés latéraux et supérieurement, à côté inférieur entier, non échancré.

Abdomen à ponctuation assez fine en lignes transversales, noir avec le bord externe jaune et une tache longitudinale un peu oblique, jaune, calleuse sur le bord externe de chaque segment, n'atteignant pas postérieurement l'extrémité des segments. (♀ inconnue).

Longueur 2,2 mill. — largeur 2 millimètres.

Dai Badditu a Dimè (Juin - Août 1896).

De forme beaucoup plus convexe que l'espèce précédente le *C. alienum*, Montand. rentre dans le groupe des *C. adjunctum*, Montand. et *C. oculator*, Reiche et Fairm. dont il se distingue par la ponctuation à peine plus accentuée, par le double liseré et les taches discoidales du pronotum. Il ressemble aussi beaucoup à *C. nothum*, Montand., mais ce dernier plus fortement ponctué a en outre sur le pronotum une tache jaune humérale et le disque immaculé; la ponctuation de la tête est à peine visible, le vertex presque entièrement lisse; le liseré de l'écusson (au moins chez les ♀) est élargi en arrière où il remonte légèrement en angle obtus, et il atteint la base sur les côtés latéraux.

Bucarest, Janvier 1899.

Estratto dagli Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova
Serie 2.^a, Vol. XIX (XXXIX) 20 Febbraio 1899.

Genova — Tip. Sordo-muti.