

Druckfehlerliste.

60. Jahrgang 1899.

Seite 213 Zeile 4 von unten lies Noronha.

- " 215 " 2 " oben " Abakaschf (nicht é).
- " 219 " 1 " " " Cortiço.
- " 219 " 3 " " " Mauá (nicht Maná).
- " 222 " 7 " " " Inhomirim.
- " 222 " 12 " " " Zahnradbahn.
- " 222 " 14 " " " Piabahna.
- " 223 " 20 " " " Fora.
- " 223 " 31 " " " Mauá.
- " 225 " 3 " " " zwischen Wörstädter und Moselthal.
- " 226 " 5 " " " Garganta.
- " 226 " 7 " " " Kastellaner.
- " 226 " 14 " " " des.

61. Jahrgang 1900.

Seite 171 Zeile 1 von oben lies desselben.

- " 174 " 8 " " entwickelten.
 - " 184 " 21 " " Puppen.
 - " 191 letzte Zeile " bestimbar.
- ~~~~~

NOTICE: This material may be protected by
copyright law (Title 17 U. S. Code)

Hemiptera Sumatrana

collecta a dom. Henrico Dohrn,
enumerata et descripta a Gustavo Breddin.

Part I.

Fam. Pentatomidae.

Subfam. Plataspini.

✓ *Heterocrates marginatus* Thunb.
Soekaranda (m. Januario).✓ *Brachyplatys radians* Voll.
Soekaranda (m. Januario).✓ *Brachyplatys nigriventris* Westw.
Soekaranda (m. Januario).✓ *Brachyplatys subaeneus* Westw.✓ *crum* var. *crux* Voll.✓ *intermedia* m.✓ *pauper* Voll.

Has formas, quae fere semper intermixtae occurunt, in unam speciem coniungo. Capite in plerisque speciminiibus, quae examinavi (en. 80), puneta vel lineolas duo plus minusve obsolete latera, vel lineolas duas et punctum intermedium exhibente (var. *intermedia* m.), raro tuto nigro (var. *pauper* typica). Varietas *crux*, fronte quadrimaculata insignis, alias rara (2 specim. e Borneo vidi, Mons Kina Balu) in insulis Balabac et Banguey abundare videtur; mares tamen tantum vidi hoc modo coloratos; feminae omnes in his duabus insulis ad formam typicam pertinent.

Soekaranda (m. Januario, var. *intermedia*; var. *pauper* rarius intermixta; ibique etiam forma typica (*subaeneus* Westw.) occurrit.

Praeterea Java (var. *typica*, *intermedia* et *pauper*), Borneo (Mons Kina Balu, var. *intermedia* et *crux*), Banguey et Balabac (var. *typica*, *pauper*, *intermedia*, *crux*), Celebes (var. *pauper*).

Coptosoma cibrarium Fab.

Soekaranda (m. Januario).

Coptosoma pygmaeum Montd. var.

Soekaranda (m. Januario).

Coptosoma Rabieri Montd. var.¹⁾

Soekaranda (m. Januario).

Subfam. Scutellerini.

Coleotichus sumatranaus n. spec.

♂: Corpore modice lato, circa humeros latissimo, deinde retrorsum sensim angustato. Capite cum oculis longitudine sua distinctissime latiore, ante oculos sinuato, apicem versus subacuminato-corrotundato; tylo fere aequilate percurrente. Pronoti marginibus antero-lateralibus subrotundatis, vix reflexiusculus; marginis postice parte basin sentelli tangente retrorsum distinctissime rotundato-produeta. Scutello pone basin breviter dilatato, tum longe aequilato, pone medium rotundato-angustato, apice ipso truncatulo. Pectoris laminis gularibus et sternalibus bene elevatis; sulco mediano pectoris usque in ventris segmentum tertium distinctissimo ibique utrimque elevatione cariniformi inclusu. Angulis apicalibus segmentorum ventralium leviter et subacute prominulis; iisdem angulis in segmento sexto (maris) in apicem liberum acuminatum retrorsum productis. Rostro basin ventris attingente vel subsuperante. Antennis breviuseculis; articulis duobus basilibus subaequilongis, tertio secundo longiore (3 : 2), quarto tertio distinete longiore (quinti apice in specimine descripto muto).

Supra subopacus, subsordide brunnescenti-fulvus, capite, pronoti parte antea cum marginibus antero-lateralibus nec non linea media angustissima percurrente pronoti scutellique paulo dilutioribus; ubique sat dense nigro-irrorato, guttulis singulis punctum parvum impressum includentibus et hic illive in lineolas vel macululas confluentibus. Infra nitiduseculus, cum pedibus antennisque lutescens, his apicem versus ferruginescentibus;

1) * = neu für die Fauna von Sumatra.

ventris basi media metasternique carinis ferrugineis. Linea angusta obliqua capitis inferioris suturam inter inga et genas notante, rostro (basi excepta), labro, articulis tarsalibus apicem versus (his dilutius), regione evaporativa meso- et metastethii, vitta utrimque sublaterali ventris pone medium segmenti septimi connexa et ita formam ferri equini effidente, angulis apicalibus segmentorum ventralium nec non segmento foto genitali maris nigropiceis. Pectore et ventre nigro-punctatis et hic illive etiam nigro-guttatis; punctulis ventris setuligeris.

♂: Ventris lateribus cum segmento genitali sat dense albescenti-pilosis, pilis laterum subadpressis. Segmento genitali medio transversim depresso; margine postico subcorrotundato, medio profunde et sat anguste trapezoidaliter exciso; angulis inter hunc sinum et marginem posticum subobtusatis.

Long. corp. $11\frac{3}{4}$ mm; lat. hum. $7\frac{1}{4}$ mm.

Soekaranda (mense Januario).

Species valde memorabilis propter patriam suam! Congenerici fere omnes regionem inhabitant australicam atque plerique aut Australiam ipsam aut Novam Caledoniam insulasque pacificas. Unica denique species *C. fuscus* Voll. in insulis Moluccis dicitur esse capta. Ceterum species nostra *Coleotichus* est omnino typicus, inter omnes species, quas cognoscam, cum *C. nigrovario* Walk optime comparandus, tamen multo minus robustus, retrorsum distinete angustatus. A *C. fusco* Voll. differt coloribus aliis magnitudineque minore, tamen forte cum eo coniungendus, quod tamen secundum diagnosin solam auctoris, omnia characteristicæ vere morphologica (e. g. structuram partium genitalium) plane omittentem erui nullo modo potest, praesertim in tanta distantia patriarcharum.

Cantao ocellatus Thunb.

(var. spinis humeralibus armata).

Soekaranda (mense Januario).

* *Tetrarthria variegata* Dall.

✓ 1 ♀ (fere typica colorata).

Soekaranda (mense Januario).

[Praeterea etiam Ins. Talaur (?)]

var.

Capite proportionaliter magno pronoto fere aequilongo, antennis rostroque distincte longioribus. Pronoto scutelloque brunnescens et unicoloribus, illo tamen lituris quibusdam marginalibus et submarginalibus viridi-metallicis antice et latera versus ornatus. Pedibus antennisque sordide brunnescens vel fuscescentibus, horum articulo quarto basi, femorunque parte dimidia basali dilute luteis.

1 ♀ (bene evoluta).

{

Soekaranda (m. Januario).

✓ * *Brachyaulax oblonga* Westw.

Ventre litoris luteis nonnunquam omnino destituto.

Statura seminae valde variat (12—17 mm).

Soekaranda (m. Januario; ♀♂) et Liangagas.

✓ * *Eucorysses Iris* Germ.

2 ♂♂. Soekaranda (m. Januario).

Occurrit etiam in insula Balabac [prope Borneo] (coll. Breddin).

✓ * *Eucorysses grandis* Thunb.

Forma typica (♂) cum var. maculis multis destituta (♂).

Soekaranda (m. Januario).

✓ * *Cosmocoris Dohrni* n. spec.

Capite latitudine sua cum altero oculo aequilongo, ante oculos ipsos profunde sinuato, ante sinus primum aequilato tum rotundato; tylo ante ingu protuberante; capite supra glabro, vix et obsoletissime ruguloso. Pronoto remotissime et obsoletissime punctulato, fere impunctato, area antica collari (maris) latera versus sparsim punctulata; marginibus antero-lateralibus anguste

Stett. entomol. Zeit. 1900.

reflexis, medio subsinuatis, ante medium subrotundatis. Scutelli basi distinctissime elevata, glaberrima, nec rugosa; reliquo scutello disco sat remote et obsoletissime, latera versus distinctius punctato. Ventre latera versus aciculato-ruguloso, lateribus ipsis dense rugoso-punctatis. Antennarum articulo secundo (3) brevissimo, articulo primo fere triplo breviore.

Supra viridi- vel coeruleo-viridi-aeneus; capitis vitta mediana antice decurtata, maculaque utrinque circa ocellum, pronoti et scutelli maculis ut in *C. excavato* Guér. dispositis sed omnibus, praesertim scutelli, multo maioribus, nigris; maculis cinctricalibus pronoti distinctis quamvis nonnunquam metallice-nucleatis; macula subbasali malleiformi scutelli cum maculis lateralibus seriei primae interdum confluente; macula scutelli sub-apicali transversaliter reniformi. Corpore toto inferiore viridi-metallico, maculis circa spiracula et pedibus cyaneo-metallicis; femorum basi, trochanteribus coxisque in altero specimine (sumatrano) dilute luteis, in altero (ex insula Nias reportato) concoloribus. Ventris disco aut leviter coeruleo-maculante aut nigriscente. Tarsis, rostro antennisque nigris.

♂: Ventris segmento septimo¹⁾ retrorsum rotundato-subproducto. Segmento genitali brevi et transversali; margine postice late et parum profunde sinuato, angulis lateralibus apice rotundato-obtusatus. Impressione pronoti triangulari distinctissima atque bene circumscripta. Femina latet.

Long. corp. $12\frac{1}{2}$ — $14\frac{1}{2}$ mm; lat. hum. $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm.

Soekaranda (m. Januario); praeterea insula Nias (1 ♂ coll. mea, a dom. Lange, Annaberg, benigne mihi communicatus); aliud specimen sumatrana adest in Museo berolinensi.

C. excavato Guér. similis, minor, differt ventre macula lutea vel sanguinea omnino destituto, capite breviori ante oculos profundius sinuato, pronoto fere impunctato, area collari media omnino

1) Segmentum abd. secundum meum = primum auctorum ele.

impunctata, scutello a latere viso pone callum basalem longe aequialto (nec retrorsum iterum rotundato-elevato), maculis omnibus corporis superioris maioribus ocellisque nigrocinetis.

Species statim, colore et magnitudine macularum valde similis *Chrysocoris bilunulatus* Voll., cum quo facile confunditur.

✓ *Chrysocoris bilunulatus* Voll.

Color ventris variat: Maculae luteae segmentorum quinti et sexti nunc typice transversales, nunc rotundatae parvae; macula segmenti quinti nonnunquam omnino evanescit (et forte interdum etiam macula segmenti sexti?). Inveniuntur tamen rarius specimenia colore luteo valde extenso et totum discum ventris occupante radiosque ad marginem lateralem emitte. Species, quae abundat in insula Sumatra, maculis magnis corporis superni inter vicinas facile recognoscenda.

Soekaranda (m. Januario), Liangagas, Bindjey Estate (Deli, Sumatra orient., W. Burchard leg., Mus. Hamburg).

✓ *Chrysocoris dilaticollis* Guér.

Soekaranda (m. Januario), Sinabong. [Præterea etiam Sumbawa (!)]

var.

Minor ($9\frac{1}{2}$ mm). ventris disco dilute picescente, pedibus typice coloratis. A *C. equite* F. vix distinguenda.

Liangagas.

✓ var. *sumatrana* Voll.

Femoribus fere totis coeruleo-metallieis; scutello in specimine unico apicem versus purpurascente. $9\frac{1}{2}$ mm.

Bekantiang.

✓ *Chrysocoris eques* Fab.

Soekaranda (m. Januario), Liangagas.

Stett. entomol. Zeit. 1900.

✓ * *Graptophara Reynaudi* Guér.

Capite pronotoque purpureis, violaceo nigro-maculatis; scutello subaurantiaco-luteo, maculis nigris duabus seriei posterioris omnium maximis; ventris lateribus immaculatis.

Long. corp. $13 - 14\frac{1}{2}$ mm.

Soekaranda (m. Januario), Liangagas.

✓ *Hotea circulionoides* H.-S.

✓ cum var. *punctulata* Germ.

Soekaranda (m. Januario), Liangagas. [Præterea etiam Sumbawa (!), ins. Talaur (!)]

✓ **Subfam. Graphosomini.**

✓ *Podops inermis* Hagn. var.?

Exemplaria compluria inter se sat divergentia vidi omnia cum illa specie conferenda. Describam hie specimen, quod diagnosin auctoris maxime appropinquare mihi videtur:

Statura maiuscula, subelongata. Capite latitudine sua intraoculari cum altero oculo aequilongo, ante oculos profunde sinuato, tum anterorum paulatim dilatatulo, apicem versus corrotundato; margine antico inter iuga et tylum subaequilonga biuncis. Spina tubercularum antennalium graciliter acuminata. Pronoto transversaliter haud vel vix impresso parteque cicatricali haud convexo-elevata. Margine antico pone oculos recte (ne oblique) truncato, extus extrorsum in dentem breviseulum et fortiusculum prominentem; margine antero-laterali usque ad apicem ipsum dentis humeralis subrectilineo; hoc dente postice sinuulo terminato parumque prominente, dente collari vix latiore. Scutello sat angusto, per partem paulo minus quam tertiam basalem retrorsum angustato, deinde leviter dilatato, fere aequilato, apice sat graciliter corrotundato nec truncato. Antennarum articulis duobus basalibus aequilongis, tertio secundo multo longiore (5 : 2), quarto tertio nonnihil breviore, quinto omnium longissimo.

Corpo supra sordide brunneo-fulvo. Capite, pronoti parte antica et scutelli angulis basalibus subimpressis nigrescen-

Stett. entomol. Zeit. 1900.

tibus. Corpore foto superiore sat dense fuscopunctato breviterque griseo-pilosulo. Pronoti marginibus antero-lateralibus, macula parva et diffusa angulorum basalium sentelli, corii margine costali sectoribusque et principali et interiore suturam clavi sequente impunctatis, fulvescentibus. Corpore inferiore nigro, grisecenti-pilosulo densissimeque punctato; ventris disco angusto aciculato-punctato; prostethii marginibus lateralibus, metastethii area postica ventrisque limbo diffuso fuscopunctato-ferrugineis; spiraculis glandulisque pone spiracula positis nigerrimis. Femoribus tibiarumque basi subtus nigris; harum reliqua parte, tarsis rostroque ferrugineo-flavis; tibias antice paulo obscurioribus. Antennis picescenti-nigris.

Long. corp. 10 mm; lat. hum. $5\frac{1}{2}$ mm.

♀ e Java insula dicitur esse (coll. mea).

Magna species forma thoracis distincta. An *Podops obscura* Voll. (nee. *Dallas*) hinc referenda?

✓ **Podops latinuscula* n. spec.

Corpore quam in specie praecedente paulo latiore, dilutiore, glabriore, dente humerali pronoti obsoletiore, scutello pone partem tertiam basalem distinctius rotundato apicemque abdominis non omnino attingente nec non capite nonnihil breviore differt. Ventris limbo late fulvescente.

Long. corp. $9\frac{1}{2}$ mm; lat. hum. $5\frac{1}{2}$ mm.

Soekaranda (m. Januario).

✓ **Podops sororcula* n. spec.

Corpore subelongato. Capite latitudine sua cum altero oculo nequiloni, ab oculis ipsis usque antrorum sinuato-angustato, deinde longe nequilito, ante apicem ipsum utrimque oblique sub-sinuato-truncato; ingi apice subobtusato, tylum vix superante. Spinis tuberculorum antennalium sat validis, acuminati. Pronoto ante medium transversim distinctissime impresso, ante impressionem subtuberculato-elevato, praesertim cicatricibus tumido-convexis; parte elevata et capite subtiliter, reliquo pronoto rudiuseule et

Stett. entomol. Zeit. 1900.

densissime punctato. Pronoti dente collari oblique antrorum atque extrorum prominenti, gracili, aucto articulo primo antenmarum aequilongo. Margine antero-laterali pone dentem collarem usque ad basin dentis humeralis rectilineo, hoc dente distinctissime extrorum prominenti, basi lato, apice acutangulari; humero pone dentem distincte sinuato. Scutello gracilisculo, a basi usque per partem fere tertiam basalem sensim angustato, deinde subrotundato-dilatatulo, apicum versus sat graciliter corrotundato nunc plus nunc minus truncatulo toto cum hemelytris sat rude et distincte punctato. Angulis apicalibus segmentorum abdominis leviter prominulis. Rostro coxas posticas attingente. Antennarum articulis primo secundoque et iterum tertio quartoque inter se subaequilongis, tertio secundo fere duplo longiore, quinto omnium longissimo.

Corpore plerumque pilulis et materia griseo-lutescenti densissime vestito, cum denudatur, supra picco-nigro, regione humerali sentellique limbo diffuse brunnescentibus, corio connexivoque fulvis, macula utrimque basali sentelli punctiformi luteo-alba. Corpore inferiore densissime punctulato griseo-nigro; angulo postico metastethii, maculis marginalibus ventris medium segmentorum occupantibus maculisque parvis intra spiracula positis diffuse fulvescentibus. Femoribus, tibiarum posteriorum basi tibiisque antice fere totis vel totis nigris vel nigropiceis; reliquis tibiis, tarsis totis rostroque ferrugineo-flavis. Antennis sordide fulvescentibus, articulis omnibus apices versus, primo toto quintoque basi excepta nigrescentibus vel nigris.

Long. corp. $7-7\frac{1}{2}$ mm; lat. hum. $4-4\frac{1}{5}$ mm.

Soekaranda (m. Januario).

Ex affinitate *P. luridae* Germ. et *coarctatae* Fab.; differt dente pronoti collari longo, aucto, oblique antrorum prominenti, pronoto distinctissime transversaliter impresso, area cicatriciali elevata tuberculata, cicatricibus ipsis distincte tumescenti-convexis.

Stett. entomol. Zeit. 1900.

✓ *Podops inermiceps* n. spec.

Corpo ovali. Capite breviuscule, latitudine sua interoculari vix longiore, ante oculos distincte transversales valde sinuato-angustato, deinde subaequilato vel antrosum levissime paulatim dilatato, apice sat subito corrotundato, sere truncato; ingis tylo nequilongis. Tuberculis antennalibus antice subrecte truncatis, angulo libero exteriore obtusatulo, spina antrosum vergente omnino non armato. Pronoto ante medium transversim distinctissime impresso; parte cicatricali longitrosum convexa, tuberosa, praesertim cicatricibus ipsis semigloboso-convexis. Margine antico pone oculos suboblique subsinuato-truncato, extus in dentem validiusculum extrorsum vergentem apice subobtusatum producto; marginibus antero-lateralibus post dente collares retrorsum usque ad apices dentium humeralium sinuato-divergentibus; hoc dente ultra humeros extrorsum acutiuscule prominente, denti collari nequiloni. Scutello per paulo plus quam quartam partem basalem retrorsum angustato, deinde rotundato-subdilatato, apice corrotundato. Angulis apicalibus segmentorum abdominalium leviter prominulis, subobtusatis. Rostro inter vel pone coxas intermedias extenso. Antennis breviusculis; articulo secundo primo paulo breviore; tertio secundo sensim longiore (5 : 3); tertio quarto-subbreviore; quinto omnium longissimo.

Corpo subferrugineo-sulvo, lutescenti-pilosulo, supra fuscopunctato. Capite supra subtusque, margine antico pronoti cum dentibus collaribus (horum marginibus exceptis), scutulis cicatricibus, angulis imis basalibus scutelli basique scutelli ipsa media (haec dilutiore), angulis basalibus segmentorum abdominalis supra subtusque, ventris spiraculis discoque magis minusve extenso, pectore (metastethii angulo lato postico excepto), femoribus, tibiarum omnium basi antecarumque saepe etiam apice piceoscentibus vel nigris. Tibiis, tarsis, rostro antennisque dilute ferrugineo-flavis, harum articulo quinto (basi excepta) semper, articulo primo plerumque piceis, reliquis articularis apicem versus saepe subfuscatis; rostri apice saepe fuscescente. Scutelli macula utrinque

Stett. entomol. Zeit. 1900.

basali punctiformi lutea plus minusve distincta. Colore fuso ventris nonnunquam usque ad spiracula extenso, tum maculas diffusas intraspirculares lutescentes includente.

Long. corp. $5\frac{1}{2}$ —7 mm; lat. hum. $3\frac{1}{2}$ —4 mm.

Soekaranda (m. Januario); practerea ins. Java occidentalis (Pengalengan, 4000 pedes, leg. Fruhstorfer, coll. mea).

P. sororculae m. magnitudine subsimilis, paulo latior coloribusque dilutioribus; distinguitur practerea facile dente collari pronoti distincte extrosum directo; haec nota et tuberculis antennalibus inornatis, antice subrecte truncatis a congenericis sat distincta parva species.

✓ * *Podops tarsalis* Völl.

Capite brevi, latitudine sua interoculari subbreviore, apice latiusculo, nec ibidem sensim angustato; ingis latis, apice suboblique introrsum sinuato-emarginatis, angulis sinuum exterioribus angulariter paululum prominentibus; tylo ingis distincte breviore capiteque inter inga quadrangulariter subexciso. Pronoti parte paulo plus quam dimidia anteriore distinctissime longitrosum convexa, dense luteo-tomentosa soleulisque cicatricibus glabris nigris veluti sculpturato-ornata; marginibus antero-lateralibus inter dentem humerale et collarem distincte rotundatis, obsoletissime serrulatis. Tibiis antecis semper nigris, intermediis supra medio nonnunquam ferrugineoscentibus. Scutello vitta lata mediana fuscescente ornata.

Long. corp. 7— $7\frac{1}{2}$ mm.

Soekaranda (m. Januario).

✓ * *Podops serrata* Völl.

Soekaranda (m. Januario), Sinabong.

✓ * *Aspidestrophus morio* Stål.

Soekaranda (m. Januario), Liangagas.

Stett. entomol. Zeit. 1900.

✓ **Subfam. Cydnini.**

✓* *Stibaropus subglaber* n. spec.

♂♀. Corpore sat late ovali. Capite latitudine sua cum altero oculo aequilongo, oculis parvis exceptis a basi ultra medium leviter dilatato, apicem versus subsemiorbiculariter rotundato, ings tylo haud vel vix longioribus capitisque margine antico medio haud nisi levissime inciso; capite supra ruguloso, margine utriusque ingi stylulis 8—9, tylo ante apicem stylulis duobus armatis. Pronoti marginibus antero-lateralibus longe ciliatis rotundatis, parte fota antehumerali a supero visa subsemiorbiculari, antice distinete marginata; medio transversaliter vix impressiuseculo; parte ante impressionem sita sere omnino glabra; parte postica remote et subobsoleta punctata, haud vel vix rugosa. Scutello latitudine sua itemque pronoti longitudine longiore, disco et apice remote et obsolete, latera versus densius et paulo distinctius punctato; parte postfrenali lata, mox ante apicem subito corrotundata. Hemelytris remote et obsolete, inter rimulam plicatoriam et marginem costalem paulo densius punctatis. Membrana vitrea, venas tres vel quatuor distinctiores exhibente abdominisque apicem longe superante. Rostro brevi, coxis anticus haud vel vix superante; artieulis duobus basalis et iterum duobus apicalibus aequilongis, secundo tertio sere duplo longiore, hoc supra leviter inflatulo. Antennarum articulum parvum secundum, qui adest in omnibus, quos quidem cognoscem, congenericis, hic distinguere nullo modo possum; articulo elevato eiusmodi ex secundo et tertio connato articulo antecapitali longiore articuloque apicali subaequilongo. Tibiis anticus ultra medium subaequalitis, apice graciliter acuminato deorsum curvato; tarso paulo ante basin partis tertiae apicalis inserto. Tibiis posticus validis breviterque clavatis; tarsis posticis debilibus.

Corpore supra ferrugineo-brunneo, subtus ferrugineo: antennis, rostro, acetabulis, coxis, trochanteribus femoribusque anterioribus cum basi tibiarum tarsisque omnibus dilute flaves-

Stett. entomol. Zeit. 1900.

centibus. Apice curvato tibiarum antecarum maenulaque dilata subapicali ventris picescentibus.

Long. corp. cum memb. 5—6 mm; lat. hum. 3—3 $\frac{1}{4}$ mm.
Soekaranda (m. Januario).

Prima species cognita Archipelagum Malesium inhabitans. Punctura obsoleta praesertim pronoti, rostro brevi, antennis quadrangulariatis bene distincta species.

✓ *Scoparipes insignis* Voll.

♂♀. Numerus punctorum setiferorum marginis costalis in corio valde variat (9—20 utrimque), variat etiam plerumque in eodem specimine. Et rostrum quoque longitudine variat: nunc inter coxas intermedias, nunc inter posticas extensus.

Long. corp. 13 $\frac{3}{4}$ —14 $\frac{1}{4}$ mm; lat. hum. 7 $\frac{1}{2}$ —7 $\frac{4}{5}$, lat. max. abd. 8—8 $\frac{1}{5}$ mm.

Soekaranda (m. Januario, cum specimine nuper evoluto).

✓* *Scoparipes latipes* Sign.

♂♀. Ad hanc speciem refero specimen duo margine antico capitidis rotundato-bilobato interque lobos distinctissime inciso, numero punctorum setiferorum in margine costali corii posteriorum variabili, semper tamen parvo (2—5 utrimque).

Cum *Sc. insigni* Voll. magnitudine corporis puncturaque capitidis, pronoti, scutelli sat bene congruens vel eo paulo angustiore, punctura corii posterioris paulo remotiore. Rostro breviusculo, medium mesosternum haud vel vix attingente; articulo quarto omnium longe brevissimo. Segmento sexto maris postice, ut videtur, paulo profundius, quam in *Sc. insigni*, sinuato.

Long. corp. 13 $\frac{1}{2}$ —14 mm; lat. hum. 7 $\frac{1}{4}$ —7 $\frac{1}{2}$, lat. max. abd. 7 $\frac{3}{4}$ —8 mm.

Soekaranda (m. Januario).

✓* *Scoparipes minor* n. spec.

♂: Corpore subelongato-ovato, transversaliter sat convexo. Capite fortiter denseque rugoso-punctato, vertice tantum glabriore,

Stett. entomol. Zeit. 1900.

Tylo subaequilate pereurrente, sed iugis paulo breviore. Margine antice epitis rotundato, medio inciso, stylulis et setis armato. Pronoto inter humeros longitudine sua mediana tertia parte sua latiore; lateribus longe subrectis leviterque antrorum convergentibus, antice rotundato convergentibus, setis nonnullisque stylulis marginalibus armatis. Pronoto impressione antica in mare destituto, impressione levi transversa pone medium posita et irregulariter punctata diviso; parte anteriore disco glabra, acervulos punctorum minutorum hie illieve exhibente, marginibus lateralibus et antico dense et fortiter punctatis, hae parte antica punctata, postice triloba, lobo medio in striam punctulatam medianam retrosum continuato. Parte posteriori antice sparsim punctata, punctulis nonnullis intermixtis, postice et in humeris glabra. Scutello puncta nonnulla maiora punctulaque intermixta exhibente, linea impressa laterali antice et postice decurvata densius punctata. Corio sat remote subtiliterque punctato; sectoribus omnibus utrinque serie punctorum inclusis; margine costali setis 6--9 instructo; clavi punctis in series tres ordinatis. Ventre remotiuscule punctato, lateribus dense longiorum rugulosis, disco glabro, incisuris omnibus plus minusve distincte carinatis. Mesosterni carina mediana subpereurrente, postice band dilatata. Antennarum articulis duobus busulibus nequilonigis; secundo tertio paulo breviore; hoc articulo quartoque quintoque fere nequalibus. Rostro brevinseculo, coxas intermedias band attingente; articulo quarto omnium brevissimo, secundo longissimo sed primo non multo longiore. Crista interiore scoparia tibiarum posticarum maris distinctissima.

Niger, infra cum pedibus piecscens; tarsis, antennis, rostro ferrugineo-flavis, huius basi paulo obscuriore.

Long. corp. $9\frac{3}{4}$ mm; lat. hum. $5\frac{1}{4}$, lat. max. abd. $5\frac{3}{4}$ mm.

13. Soekaranda (m. Januario).

Difert a congenerieis statuera multo angustiore corporeque supra convexiore.

Stett. entomol. Zeit., 1900.

✓ * *Cydnus indicus* Westw.

Soekaranda (m. Januario cum speciminiibus nuper evolutis rufo-piceis).

✓ *Geotomus pygmaeus* Dall.

Soekaranda (m. Januario).

✓ *Opatrocydnus* n. gen.

Corpo supra subplano. Capite fere a basi usque subverticali profunde in pronotum immerso, parte postoculari parte antecoculari distincte longiore, ocellis ab oculis longe distantibus; iugis tylo multo longioribus euimque profunde includentibus; margine stylulis et setis, disco setis quibusdam instructo; imo margine antico capitis medio deorsum inflexo laminulamque perpendiculariter cretam effidente. Pronoto antice immarginato, subangulariter profunde sinuato; marginibus antero-lateralibus laminato-dilatatis seriem submarginalem punctorum setigerorum exhibentibus; angulis collaribus antrorum prominentibus. Scutello graciliter triangulari latitudineque sua basali distincte longiore; apice subacuminato. Corio sat longo elytrisque elausis apicem scutelli distinctissime superante; membrana minuscula corio multo minore. Margine costali corii sublaminato-dilatato. Tibiis posticis subcylindricis vix compressis. Tarsis antieis in apice uno tibiarum insertis. Antennis quinquarticulatis.

Genus singulare secundum habitum in *Brachypeltae* vicinitate verisimiliter enumeranda, distinguitur facile capite profunde immerso, tylo iugis profunde inclusu, lateribus corporis sublaminato-dilatatis.

✓ * *Opatrocydnus cryptocephalus* n. spec.

♀. Capite plano, subcordiformi, basi excepta dense punctato, margine antico rotundato-bilobo, inter lobos late angulariter inciso; iugis ante tylum distincte contiguis. Spatio inter ocellum et oculum diametro longitudinali oculi aequali. Pronoto distinctissime transversali, inter humeros longitudine sua mediana duplo latiore;

Stett. entomol. Zeit., 1900.

marginibus antero-lateralibus antrorum rotundato-convergentibus; angulis collaribus subrectangulariter antrorum productis marginemque anticum oculorum subattentibus; margine basali pronoti vix rotundato, sere truncato. Pronoto toto usque ad margines laterales angustissime lineariter reflexuseulos dense punctato; litura utrimque lineiformi, curvata cicatricem notante impunctata; disco utrimque pone medium leviter impresso. Scutello punctato, mucula angularum basalem subimpressa glabra; apice immo vix subrotundato. Corii margine costali subdilatato leviter rotundato; angulo apicali obtuso, sutu a membranali recta; tota parte coriacea dense punctata, punctis circa suturam clavalem in series complures ordinatis; sectoribus distinctis, perecurrentibus. Costa corii omnino non reflexo-elevata, usque ad marginem punctata; in hoc margine ipso puncta 3-5 maiora distinguuntur, quae normaliter setas ferre videntur. Membrana parva (in specimine descripto submutilata). Ventre pone basin medio subinflato, lateribus passim et apicem versus dense punctatis; incisuris omnibus plus minusve carinulatis. Rostro coxas intermedias attingente; articulis tribus basalibus subaequilongis, quarto dimidio articuli tertii vix longiore. Antennarum articulis primo et tertio nequilongis, secundo illo paulo breviore (articulis duobus apicalibus in specimine descripto, ut videtur, deformatis).

Niger, antennis, rostro, tarsis piceo-brunneis. Membrana quantum restat piceo-brunneo.

Long. corp. $8\frac{1}{3}$ mm; lat. hum. et lat. max. abd. $5\frac{1}{4}$ mm.
Soekaranda (m. Januario).

✓ Subfam. Pentatomini.

✓ *Dalpada oculata* Fab.

Larva tibiis antieis ut in imagine dilatatis et coloratis distincta. Capitis margine utrimque ante oculos spina, paulo ante apicem dente rectangulari armata.

Soekaranda (m. Januario, cum larvis). [Praeterea etiam Malacea (Perak!), Borneo (!)].

Stett. entomol. Zeit. 1900.

✓³ *Aedus obscurus* Dall.

Ad hanc speciem refero specimenum suministratum, rostro coxas posticus nunquam attingente saepe ne intermedias quidem coxas superante. Margine ventris nunc brunnecenti-fusco, nunc omnino nigro; pectore serie macularum callosarum lutescentium saepe notata.

Long. corp. $9\frac{1}{2}$ mm; lat. max. abd. $6\frac{1}{2}$ - $6\frac{2}{3}$ mm.
Soekaranda (m. Januario).

✓ *Neodius depressus* Eller. Breddin.

Quatuor species cognoscere generis *Neodii* ex insula Sumatra reportatus, omnes inter se sat similes, e quibus ea, quae maxime cum diagnosi *N. depressi* congruere videtur, haec est:

Corpore ovali. Capite plano; marginibus lateralibus ingorum subrellexis, ante oculos in dentem distinctiorem omnino non prominulis, sed ab oculis usque sat graciliter sinuato-angustatis, antice angulariter corrotundatis. Iugis tylo longioribus, per totam longitudinem distantibus atque apice distinctissime hiscecentibus, Pronoto depresso; marginibus lateralibus sublaminatis, et antice et postice usque pone humeros subrellexis; humeris distincte rectangulariter prominulis, apice rotundatis, postice incisulis; pronoto ab his angulis humeralibus usque ad angulos collares subsinuato-angustato; margine antico quam capite distinctissime latiore idque utrimque sensim superante, parte pone oculos sita recte truncata (vel vix immo angulo collari levissime antrorum producto); margine igitur laterali corporis a supero viso inter oculum et pronotum distinctissime neutangulariter inciso. Venis membranae compluribus ab areola basali transversali (rarius obsoleta) decurrentibus. Rostro coxas intermedias subsuperante. Antennarum articulo secundo quam tertio plerumque paulo breviore.¹⁾.

¹⁾ Longitudo proportionalis illorum articulorum in genere, ut videtur, nonnihil variat.

Sordide fulvo-intens, dense, in corio tamen inaequabiliter, fuscopunctatus, colore punctorum circa basin scutelli, in dimidio antice pronoti et in vertice posteriore in colorem omnino fuscescentem plus minusve confluent. Linea mediana pronoti et scutelli nec non venis corii clavique clarissimis fuscescentibus. Ventris et lateribus et disco dense aciculato-punctulatis, cum meso- et metastethio nigro-fuscis; huius et ventris limbo obsolete brunnescens; prostethio fuscobrunneomarmorato; soleo ostiolorum ferruginescenti. Rostro pedibusque dilutius flavescentibus, femoribus apicem versus ferruginescenti-conpersis. Antennis plus minus sordide ferruginescentibus; articulo quinto basin versus albescens. Dorso abdominis fuscus.

δ : Margine postico segmenti genitalis late sinuato, in fundo illius sinus subtruncato.

Long. corp. 12—13 $\frac{1}{4}$ mm; lat. hum. 6 $\frac{1}{2}$ —6 $\frac{2}{3}$, lat. max. abd. 6 $\frac{1}{2}$ —7 $\frac{1}{3}$ mm.

Tandjong (Sumatra orient., Fratres Siemssen legg. IX—XII 1893 (Mus. Hamburg)).

Praeterea: Borneo orient.-merid. [Tandjong, F. Suck leg. (Mus. Hamburg) et coll. Breddin].

Angulis humeralibus angulariter prominulis marginibusque pronoti intercallibus distincte sinuatim et subreflexis haec species a congenericis haud difficulter distinguitur.

Neodius Ellentriederi n. spec.

N. depresso Eller. Breddin maior et distinctissime latior; pronoto convexiore; humeris haud vel vix prominulis et omnino rotundatis; margine laterali sublaminato, antice latius, postice anguste reflexo, subrecto, ante medium leviter rotundato; margine antice capite non multo latiore idque utrumque paulo superante, parte pone oculos sita suboblique sinuato-frumentata, oculorum margini postice parallelo cumque subtangente, margine igitur lateralim corporis inter oculum et pronotum haud vel leviter angulariter inciso.

Stett. entomol. Zeit. 1900.

Capitis parte antecoculari quam in *N. depresso* sensim latior ante oculos multo levius atque obsoletius sinuata, antrosum latius rotundata. Iugis, ut in illa specie, cylindri multo superantibus sed totis distantibus. Scutelli apice paulo latiore. Membranae venis, numero sat variabilibus (5—9), in nullo, quod quidem viderim, specimine areolam basalem efficiuntibus.

Corpo supra sordide subferrugineo-fulvo, dense fuscopunctulato, vel punctis plus minusve confluentibus corporeque ob eam causam plus minusve brunneo-fusco vel dilute picescens, rugulis numerosis transversalibus fulvescentibus in pronoto scutelloque intermixtis. Punctis pronoti densius et magis aequabiliter quam in *N. depresso* dispositis. Linea mediana fulvescenti pronoti et scutelli obsoletiuscula; lituris clavi coriique obsoletis. Puncto utrinque basali vel nonnunquam striola longitudinali scutelli et nonnunquam etiam utrinque callulo punctiformi discali pronoti flavescentibus. Membrana dilute et sat sordide flava, venis fuscescentibus. Ventre aciculato-punctulato, nitidulo, limbo sericeo subopaco. Ventris disco, area evaporativa nec non meso- et prosterno nigro-picis vel nigris; reliquo pectore dense ventrisque lateribus multo remotius flavo-marmoratis; limbo ipso extraspiculari cum connexivo obsolete brunnescens-fusco. Apice solei ostiolorum, carina mesosternali, rostro, pedibus antennisque subferruginescenti-luteis; his apicem versus infuscatis, articuli quinti dimidio basali albido. Femoribus apicem versus, tibiis antennarumque articulis 1—3 obsolete ferrugineo-conpersulis, nonnunquam sere totis sordide brunnescentibus. Dorso abdominis nigro-fusco.

δ : Margine apicali segmenti genitalis sere ut in *N. depresso* sinuato.

Long. corp. cum memb. δ : 12 $\frac{1}{2}$, ♀: 14 mm; lat. hum. 6 $\frac{3}{4}$ (δ)—7 $\frac{1}{2}$ mm (♀); lat. max. abd. 7 $\frac{1}{4}$ (δ)—8 mm (♀).

Sockaranda (m. Januario).

[Praeterea: Java occid. (Pengalengan, 4000 pedes. leg. Frubstorfer, coll. Breddin)].

Stett. entomol. Zeit. 1900.

✓ *Neodius Dohrni* n. spec.

Statura ceterisque cum *N. depresso* aptissime comparandus, pronoto transversaliter paulo magis convexo, abdōmine, ut videtur, proportionaliter nonnihil magis dilatato, pronoto anterius minus distincte angustato, marginibus lateralibus subrectis; pronoti margine antico, ut in *N. depresso*, caput utrinque sensim superante, pone oculos recte truncato marginaque laterali corporis et hic quoque inter oculum pronotique marginem antieum angulariter inciso; angulis humeralibus sensim reflexo-marginatis, parum prominulis, subrectangularibus. Capite sere ut in *N. depresso* formato et marginie partis anteocularis eodem modo areuato, tamen iugis ante tylo profunde inclusum distincte et sat longe contiguous marginaque apicali medio angulariter \downarrow inciso. Antennis quam in *N. depresso* nonnihil brevioribus, pilosulis. Punctura fusca praesertim pronoti posterioris et baseos scutelli distinctissime remotoe quam in *N. depresso* et *N. Ellenriederi*. Linea mediana corporis superioris (et capitis quoquel) liturisque hemelytrorum distinctis. Corpore superiore subopaco dilutiore atque magis in ferrugineo-brunneum vergente quam in *N. depresso*. Membrana abdominalis apicem haud superante, subsordide flavescenti, venis fuscis plerisque ex areola basali transversali decurrentibus. Ventre cum pro- et mesosterno piceo-fuscis, peitoris lateribus cum area evaporativa ventrisque disco medio basali (hoe obsoletius) sordide ferruginesceni-marmoratis; ventris limbo extraspiraculari cum connexivo fusco-brunneo vel sordidissime ferrugineo, fusco-punctulato. Pedibus, rostro, antennis sordide fulvo-luteis, distinctissime et sere ubique fuscescenti-conpersulis; antennarum articulo quarto sere toto articulique quinti albidii parte tertia apicali griseofuscis. Dorso abdominis piceo-fusco.

♂: Margine apicali segmenti genitalis medio profundo et sat late in formam quadri rectangularis — (nee obtrapezoidaliter!) exciso; lobis lateralibus maiusculis, orbiculariter rotundatis.

Long. corp. 12 mm; lat. hum. $62\frac{1}{2}$; lat. max. abd. $71\frac{1}{5}$ mm.

Soekaranda (unicum specimen).

Stett. entomol. Zeit. 1900.

A *N. depresso* et *Ellenriederi* forma segmenti genitalis masculini facilime distinguitur.

✓ *Neodius Schultheissi*¹⁾ n. spec.

N. depresso similis, eo tamen distinctissime minor et gracilior, multo dilutius et clarus coloratus; supra plus minusve dilute testaceo-flavescens, fusco-punctulatus; punctis pronoti et scutelli hic quam in *N. depresso* paulo remotius positis neque inquam confluentibus. Linea mediana corporis superioris (in pronoto et praesertim in capite interdum obsoletiore) venisque hemelytrorum impunctatis et dilutioribus. Capite latitudini suea inferoculari cum altero oculo aequilongo et quam pronoto distincte breviore (2 : 3), supra plano, marginibus leviter reflexis, ante oculos dente omnino destitutis, paulo profundius quam in *N. depresso* sinuatis, ante sinus ipsos breviter subparallelis, apicem versus subrotundato-angustatis. Jugis tylo distincte longioribus et ante eum nunc contiguous nunc subcontiguis. Pronoti angulis humeralibus haud vel vix prominentibus, postice angulum subobsoletum formantibus; marginibus lateralibus sere omnino rectis, sat anguste reflexis; margine antico capite cum oculis latiore, pone oculos sere recte truncato, extus denticulo obsoleto armato, marginibus igitur corporis inter oculos et pronoti marginem antieum angulariter incisis. Scutelli parte postfrenali quam in *N. depresso* paulo graciliore, retrorsum valde angustato, apice subangulariter-corrotundato. Abdomine hemelytra clausa utrinque paulo tantum superante, quam latitudine humerali vix latiore. Corpore inferiore cum area evaporativa ferruginescenti-luteo, fusco-punctato; mesosterno et ventre piceo-fuscis, hoc nonnunquam minute flavescenti-marmorato et in disco medio plus minusve in ferrugineo-flavum transeunte. Margine exteriore metastethii, limbo extraspiraculari ventris intus integro (nee, ut in quibusdam speciebus, sinuato)

¹⁾ In memoriam Dom. Benjamin Schultheiss, nuper defuncti, disciplinae nostrae studiosissimi, qui medicus Sumatram pervagans de cognitione faunae entomologicae illius insulae optime meruit.

segmentisque genitalibus luteo-lutescentibus. Ventris limbo interdum obsolete ferrugineo-conpersulo; segmento genitali masculino fusco-punctato. Suleis pseudoinsularibus segmentorum ventralium nigris, exustis in punctum rotundatum exenlibus. Suleo ostiolario, pedibus, rostro, antennis subferrugineo-entei; harum articulo apicale dilute fuscosecenti, basi luteo-albo; pedibus minutissime et sat obsolete ferrugineo-conpersulis. Membrana subsordide hyalina; angulo basali concolori vel sutura tantum fuscosecenti; venis fusco-griseis, areolum basalem hanc efficiens. Dorso abdominis rufo-ferrugineo, disco fuscosecenti, vel omnino fuscosecenti, connexivo ferrugineo-luteo.

♂: Segmento genitali late et profunde trapezoidaliter inciso; marginibus inferioribus loborum lateralium subrotundatis.

Long. corp. cum memb. $10\frac{1}{2}$ - $11\frac{1}{2}$ mm; lat. hum. $5\frac{1}{2}$ - 6, lat. max. abd. $5\frac{2}{3}$ - $6\frac{1}{4}$ mm.

Tebing-Tinggi (Sumatra sept.-orient. 10. VIII. 84 Schultheiss leg.); Tandjoeng (Morawa, idem legit); Indrapura Estate (Deli, Sumatra orient., fratres Siemssen legg., mus. Hamburg).

A *N. depresso* statura minore et angustiore ventreque plus minusve luteo-luteo-limbato facile distinguendus.

Happaea taprobanensis Dall.

Soekaranda (m. Januario).

✓ * *Halyomorpha pieus* Fab.

Soekaranda (m. Januario).

✓ * *Halyomorpha ornativentris* n. spec.

Capite latitudine suae cum oculis aequilongo; ante oculos sat graciliter sinuato-angustato, sat longe ferre aequilato, apice subsemicirculariter corrotundato. Pronoto capiti aequilongo et quam latitudine sui humerali plus quam duplo breviore (2 : 5). Humeris prominentibus, abdominis latitudinem utrimque vix superantibus, rectangularibus; marginibus antero-lateralibus inter angulum

Stett. entomol. Zell. 1900.

humeralem et dentem collarem leviter lateque sinuatis, anguste tantice etiam angustissime) filiformiter reflexis. Abdomine quam hemelytris clavis vix latiore; angulis apicalibus segmentorum acutiuscula prominulis. Antennis gracilibus; articulo primo apicem capitidis haud attingente; articulis secundo tertioque et iterum quarto quintoque inter se aequilongis vel subaequilongis. Tibiis anticus apicem versus levissime dilatatis. Rostro segmenti tertii ventralis medium attingente vel subsuperante; articulis secundo tertioque aequilongis.

Supra plus minusve dilute picea vel castanea, rugulis et maculis glabris lutescentibus hic illie marmorata, praesertim macula orbitali verticis, maculis compluribus basalibus capitidis superioris, linea tenui mediana pronoti, angulis imis humeralibus maculaque corii ad apicem rimulae intus posita semper lutescentibus. Scutelli apice late maculaque minuscula semilunaria utrimque in angulis basalibus posita lutea lutescens. Corpore superiore, his maculis glabris exceptis, nigro-punctato; punctis praesertim in capite et pronoti regione cicatriciali in maculas diffusas subaeneo-entes coacervatis. Corpore inferiore cum pedibus, rostro, antennis luteo-flavo-luteo, in capite inferiore et pectoris lateribus sat fortiter, in ventre latera versus subtiliter et subobsolete punctato. Corpore inferiore utrimque vitta marginali, a rostri basi usque ad anum perducta, sat lata (in pectore latissima), ex punctis et atomis fusco confluentibus composita et hic illie (praesertim in pectore) luteo viridi-metallecenti ornata. Macula utrimque prostethii ad marginum lateralium medium posita maculisque marginalibus ventris semiorbicularibus segmentorum connexivalium supra subtusque luteo flavis, impunctatis. Macula maiusecula segmenti ventralis septimi spiraculis, rostri articulo apicali articulorumque secundi tertiique linea mediana inferiore, tibiis tarsisque apicem versus, antennarum articulo quarto toto quintoque (huius basi late albescenti excepta) nigris vel nigrescentibus. Articulis tribus basalibus antennarum femorumque parte apicali cum ima basi tibiarum nigro-

Stett. entomol. Zell. 1900.

conspersis, ventris disco et femorum dimidio basali remote sanguineo-conspersis. Membrana sordide flavescenti; macula maiuscula obscura anguli basalis interioris, serie semiorbiculariter curvata macularum discium in venis posticarum limboque subdilato exteriore et apicali cum venarum extremitatibus adiacentibus piccis vel pieciscientibus. Dorsum abdominis picco, leviter violaceo-mieante, circa apicem scutelli lutescenti. Alis subsordide hyalinis, apice et venis fusciscientibus.

♂: Segmento genitali (in specimine unico masculino, quod vidi, nonnihil dislocato) apice late et sat profunde sinuato.

Long. corp. eum memb. $11\frac{1}{2}$ —14 mm; lat. hum. $6\frac{1}{4}$ — $7\frac{1}{4}$ mm.

Soekaranda (m. Januario).

Species scutello trimaculata, ventris lateribus ut in *Dalpadis* quibusdam decoratis inter congenericas egregia; habitu notisque quibusdam aliis *Tolumniae* nonnihil admonet. Occurrit etiam in insula Borneo.¹⁾

Tolumnia trinotata Westw.

Soekaranda (m. Januario).

[Praeteret etiam Malacea (Perak!).]

Tolumnia latipes Dall. var.

In speciminibus, quae vidi, sumatranis genicula tantum postica tibiarumque posteriorum et antearum apices nigra sunt. Antennarum articulo primo luteo, extus linea nigra notato. Tibiis anteris anguste dilatatis.

Praeter has notas haec specimina a *T. trinotata* Westw. affinissima vix distinguuntur.

Soekaranda (m. Januario).

¹⁾ Specimen unicum sumatranum (Soekaranda, m. Januario) aliudque e Borneo merid.-orient., reportatum tibiis apice concoloribus, femoribus apice raro-guttatis ventreque vitta marginali omnino destituto differunt. Segmento genitali maris, ni fallor, angustius et profundius atque subapertangulariter sinuato. Species verisimiliter distincta.

✓ * *Aeschrocoris nodiventris* n. spec.

Oculis medioeribus, sat prominentibus globosis. Capite ante oculos paulatim angustatulo; ings. tymum includentibus et ante eum longe contiguis, extus ante apicem tuberculo acute conico extrosum vergente armatis, ante haec tubercula spiniformia valde deelivibus et subito sinuato-angustatis. Bucculis percurrentibus, sat elevatis, apicem versus angulum apertum effluentibus. Serobiculis antennarum in inferiore parte capitis positis, postice et intus tuberculo elongato subobliquo ocellatis. Angulis humeralibus pronoti in processus horizontales sat validos in apicem gracillimum subito constrictos extrosum et paulo antrosum vergentes excurrentibus. Scutello quam duobus terciis abdominis paulo breviore, in angulis basalibus utrimque impressione longitudinali nigra, in apice medio nodulo glabro instrueto. Abdominis margine nodulis paulo maioribus et minoribus alternantibus armato. Rostro coxas posticas paulo superante, articulo primo pone bucculas vix extenso. Ventris basi haud vel indistinetissime sulcato; segmento tertio prope marginem posticam in utroque sexu tuberculis duabus submedianis nodiformibus distinctissimis armato. Antennarum articulo primo apicem capitis haud attingente, valde extrosum excurvato; articulis secundo tertioque aequilongis; quarto quam tertio sensim longiore, quam quinto multo breviore.

Laete subferrugineo-flavus, rude nigropunctatus, callis rugositatibusque numerosis intermixtis; processu humerali supra, fascia diffusa interhumerali carinulaque mediana pronoti anterioris impunctatis vel subimpunctatis; punctura partis anterioris pronoti densiore magisque in maculas vel nebulas confluenta. Capite supra subtusque, processum humerale apice imo marginibusque anteriore et posteriore cum tota eorum facie inferiore, impressionibus basalibus scutelli, pectore (hoc latera versus flavomarmorato), ventris disco, eiusdem segmento septimo fere toto, connexivo ventreque margine extraspiraculari (nodulis marginalibus maioribus exceptis), rostri articulo basali, coxis, trochanteribus, femoribus tibiarumque basi nigris. Harum annulo postmediano

et apice imo, tarsis apicem versus, antennarum articuli primi apice imo, articulo quarto (basi excepta) quinque piceis. Ventris lateribus nigro-marmoratis. Macula lateralii metapleurorum subpunctiformi glaberrima noduloque apicali scutelli luteo-luteis. Membrana ferrugineo-grisea, fuscoc-reticulata. Femoribus posterioribus interdum obsolete ferrugineo-anulatis.

Long. corp. 5—7 mm; lat. hum. $4\frac{1}{2}$ —6 mm.

Soekaranda (m. Januario.)

(Ocurrebit etiam in Java orient. (Tengger Montes, Frustorfer leg., coll. mea).

A. testudinario Walk praesertim capitis structura affinis et forte similis; differt tamen ab hoc aliisque congenericis proportionibus articulorum antennalium omnino aliis. Nodis duobus discalibus ventris valde singularis.

✓ *Eusarcoris bovillus* Dall?

Cum hac specie coniungo, quamquam non sine magna dubitatione, speciem in insulis Java et Sumatra rarius obviam:

Capite trapezoidalii, ab oculis usque ad apicem distinctissime angustato, apice sat graciliter rotundato, integro. Pronoti angulis humeralibus subuentis, modice prominentibus, angulum 50—60° exhibentibus; margine postico huius processus quam margine postero-lateralii adiacente duplo breviore; ruga marginis antero-lateralis glabra distinctissima. Scutello fere per tres partes quartas dorsi abdominis extenso; marginibus lateralibus circa apicem partis tertiae basalis obsolete et late sinuatis. Tibiis posticis leviter curvatis vel, si vis, levissime S-formibus. Antennarum articulo secundo quam tertio paululo breviore vel eo subaequilongo.

Species sat glabra atque nitidula, quam *E. guttigeri* Thunb. distincte glabriore, minus fortiter minusque dense punctata. Fascia pronoti interhumerali sparsim punctata lutea conspicillari (i. e. manuam utrinque rotundatam fuseescientem includente) in nullo, quod examinavi, specimine deficiente (quae fascia, quamquam

obsoletissime, etiam in plurimis individuis *E. guttigeri* distinguuntur). Scutelli apice, ut in *E. ventrali* Westw., maculula mediana obsoleta fuseescienti notata. Pectore cum scutello concolori, latera versus fuscoc-nebuloso.

His plerisque notis ceterisque omnibus cum diagnosi Dallasi species nostra congruit.

Soekaranda (m. Januario) [praeterea Java (!)].

✓ *Eusarcoris capreolus* n. spec.

Capite ante oculos utrinque sinuato, ante sinus aequilato, apice truncato, inter tyrum et iugum incisulo. Angulis humeralibus pronoti spiniformiter prominentibus, acutissimis, angulum fere 40° efficientibus, apice levissime recurvatis; margine postico processus quam margine adiacente pronoti postero-laterali non multo breviore. Ruga marginali pronoti angustissima. Scutello quam latitudine sua basali subbreviore, per duas fere partes tertias abdominis extenso; marginibus lateralibus ante medium vix sinuatis. Tibiis posticis in utroque sexu rectis. Antennarum articulo secundo quam tertio nonnihil breviore.

Corpo griseo-luteo, punctis nigris subtiliusculis consperso, haud rugoso, submetallescens-nitido. Capite dense punctulato, pronoti macula utrinque circa cicatrices posita, eiusdem marginibus antero-lateralibus et processu humerali spiniformi, capite inferiore, pectoris lateribus ventreque neneo-nigris; huius limbo modice lato cum adiacenti angulo postico metastethii et segmentis genitalibus, rostro (huius apice nigrecenti excepto), pedibus, antennis, ruga angustissima marginali pronoti, corii margine costali cum epipleuris lineaque mediana capitis (raro obsoleta) flavo-luteis. Antennarum articulo ultimo vel duabus ultimis apicem versus brunnescientibus; femoribus tibiisque nigro-conpersis. Ventris spiraculis maculisque minusculis marginalibus in incisuris positis nigris. Macula utrinque sat magna rotundata angularum basarium scutelli albo-lutea; maculula obsoleta in eiusdem apice medio posita fuseescienti. Membrana sordide et dilute ferruginecenti, apicem versus dilutiore.

Colore pronoti posterioris et scutelli saepe in dilute piceum transente.

♂: Segmento genitali apice medio sat profunde semicirculiter exciso.

Long. corp. $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. lat. hum. $4\frac{3}{4}$ —5 mm.

Soekaranda (m. Januario).

E. bovillo Dull.? simillima; differt forma capitis, scutello distinctissime breviore, humeris anterioribus, ruga marginali pronoti angustissima et subobsoleta pleurisque plus minusve evanescenti-nigris. Pronoto in omnibus, quae vidi, speciminiibus (6) fascia interhumerali conspicilliformi destituto.

✓ *Eusarcoris ventralis* Westw.

Soekaranda (m. Januario), Liangagas.

✓ *Eusarcoris obscurus* Voll.

Soekaranda (m. Januario).

✓ *Carbula haematica* Voll.

Sinabong, Bekantiang.

✓ *Carbula trabifera* n. spec.

C. trinotatae H.-S. invanæ simillima; facile distinguitur corpore semper maiore, spinis humeralibus multo longioribus, acutissimis, longe extrorsum et sat antrorsum productis, capite paulo longiore atque graciliore, antennis longioribus, colore corporis superioris multo obscuriore, in capite, pronoto, scutello (huius maculis tribus typicis et pronoti marginibus antero-lateralibus glabris flavis exceptis) nigro-piceo, in hemelytris dilutius piceo, extus nigrescenti; punctis corporis inferioris multo maioribus, distinctissimis.

Long. corp. $7\frac{3}{4}$ —9, cum memb. 9— $9\frac{1}{2}$ mm; lat. hum. cum spinis $7\frac{1}{2}$ —8 mm.

Permulta specimina vidi omnino congruentia. *C. trinotata* vera in collectionibus, quas vidi, sat raro oecurrit.

Stett. entomol. Zeit., 1900.

Soekaranda (m. Januario). Invenitur etiam in Malacea (Perak!) et in ins. Banguey (!).

✓ *Agonoscelis nubila* Fab.

Soekaranda (m. Januario).

✓ *Agaeus metallicus* n. spec.

Corpo elongato, infra modice transversaliter convexo, supra planiusculo, scutelli basi pronotique area posteriore modice convexis; huic parte minore anteriore depressa cum capite subhorizontali. Capite elongato et sat magno, latitudine frontis cum oculis multo, longitudine mediana pronoti nonnihil longiore. Marginibus partis antocularis longe subrectis, paullatim convergentibus, mox ante apicem subito valde convergentibus; tylo iugorum apices distinctissime superante. Ocellis sat magnis, ab oculis medioeribus vix minus quam a linea sicta media distans. Pronoto longitudine sua mediana plus quam duplo latiore (8 : 3). Humeris rectangulariter sensim prominulis; parte antehumerali in medio vel ante medium subconstricta, praesertim marginibus antero-lateralibus aequaliter sinuatis, inter sinum et apicem humeralem subrectis et valde divergentibus, ante sinum rotundatis; marginibus postero-lateralibus mox pone humeros leniter rotundatis, tum subrectis; margine postico leviter lateque sinuato; angulis posticis rotundato-deletis. Pronoti carina mediana distineta, pone depressionem stricturæ incipiente; marginibus postico et postero-lateralibus levissime, antico et praesertim antero-lateralibus distinctius reflexis et glabris; his obsolete emorso-crenulatis, antice utrimque dente vel lobulo subobtuso, extrorsum vergente oculosque hanc vel vix superante. armatis. Scutello latitudine sua basali multo longiore, gracili, praesertim parte postfrenali angusta et sat longe producta; parte basali convexa late triangulari in carinam fortem, ante apicem scutelli evanescens, exente. Hemelytris clausis abdomine paulo angustioribus; membrana apicem abdominis vix superante. Buculis percurrentibus, postice humilibus, antice subtus angulum distincte apertum exhibentibus. Rostro

Stett. entomol. Zeit., 1900.

gracillimo, segmenti quinti ventralis medium attingente vel etiam superante; articulo primo basin capitis attingente, articulo secundo tertio paullo longiore, quarto tertio sensim breviore (3 : 4, vel 4 : 5). Ventre sat late et profunde sulcato, sulco in segmento sexto evanescere; segmentorum angulis apicalibus rectangulariter prominulis, inermibus. Pedibus gracilibus; tibiis distinete sulcatis, his sulcis apicem versus profundioribus latioribusque. Antennarum gracilium articulo primo cylindrico sat brevi capitisque apicem haud attingente; articulo secundo tertio distinete breviore (3 : 5); hoc et quarto nequilonigis; quinto secundo paullo longiore. Corpore fere ubique punctato; pronoto, scutelli elevatione basali pectoraque fere toto sat fortiter et confertim, capite superiore et connexivo paullo subtilius et densius, hemelytris multo subtilius et, saltem in disco corii, remotius punctatis; scutelli parte apicali (carina glabra excepta) rude ruguloso-punctata; ventris lateribus hie illuc sulcissime et obsolete punctulatis.

Corpore superiore fuscō vel fuscō-brunneō, punctis laete viridi-metallicis ornato et fere ubique praesertim autem ad latera capitis versus, in humeris et in tota parte coriacea hemelytrorum pulchre viridi-metallico-induto. Capitis marginibus summis, pronoti marginibus reflexis (marginibus humeralibus metallescentibus exceptis), eiusdem pronoti utrinque litura angusta triinfracita, litteram W imitante, scutelli marginibus angustis lateralibus et apicalibus, corii limbis angustissimis membranali et costali, maculis connexivi in medio segmentorum singulorum positis et extus dilatatis, capitis inferioris marginibus, prostethil margine exteriore (ante humeros interrupto) et antico (hoc saltem latera versus), acetabulis, epipleuris ventreque fere toto plus minus laete sanguineis. Capitis linea mediana, scutelli carina coriique fascia obsoletinseula, subelevata, ab apice rimulae usque in angulum apicalem interiorem corii ducta, plus minus sordide rufobrunneis. Capite inferiore circa et pone tuberculum antennale, pectoris lateribus maximam partem, epipleurarum macula basali, ventris maculis magnis rotundatis intus spiracula positis aliisque:

Stett. entomol. Zeit. 1900.

subtriangularibus submarginalibus, incisuras occupantibus et secundum incisuras introrsum plus minusve longe productis, laete viridi-metallicis. Capitis inferioris vitta utrinque bucculas extus sequente, buccularum fuscescentium marginibus, sternis, promeso- et metastethii marginibus posticis vittulisque quibusdam angustis arearum scapularium, rugis canalem evaporativum includentibus, coxis, trochanteribus, femoribus, tibiarum maxima parte basali rostrique articulis primo, secundo, tertio dilute luteis. Antennis, rostri latere pectorali marginibusque fissurae articuloque quarto toto, femorum lineis quatuor (duabus superioribus, duabus inferioribus), tibiarum lineis tribus basalibus (duabus inferioribus nonnunciam confluenter brevioribus, una diluta superiore plus minusve longe extensa) earundemque parte plus quam tercia apicali cum farsis et ungueolorum flavescentium apicibus fuscō-nigris vel nigris. Membrana dilute lutescenti-ferruginea, marginibus paullo obscurioribus. Alis infuscatis parte basali sat late laete sanguinea, vena principali saturate rubra, venis reliquis fuscis. Dorso abdominis sanguineo, violaceo-metallecente, segmentulo anali fuscescente.

♀. Apparatus genitalis parte basali perpendiculari, valvulis apicalibus subhorizontalibus. Fissura vaginali squama transversali, obtuse triangulari, perpendiculari et, ut videtur, mobiliter affixa semiobtecta; valvulis basalibus minusculis, rotundatis, apice inter se longe distantibus; harum marginibus exterioribus dilatatione angustiuscula segmenti ventralis septimi obiectis. Valvulis apicalibus exterioribus in apicem obtusatum excentibus; margine exteriore rotundato. Valvulis apicalibus interioribus angustiusculis, sat longe et fere aequabiliter inter se distantibus.

Long. corp. $18\frac{3}{4}$, cum memb. 19 mm; lat. hum. $8\frac{1}{2}$ mm.

1 ♀. Liangagas.

Diffr. hie primus *Agaeus* in archipelago indico inventus a congenericis ex India continentali descriptis (*Ag. tessellato* Dall. et *mimo* Dist.) magnitudine minore, rostro, ut videtur, multo

Stett. entomol. Zeit. 1900.

longiore coloribusque, praesertim corporis superioris fere ubique viridi-metallice.

Cinxia limbata Fab.

Soekaranda (m. Januario), Liangagas.

✓ Strachia crucigera Hahn.

Soekaranda (m. Januario).

✓ Hoplistodera testacea Westw.

Soekaranda (m. Januario).

Catacanthus incarnatus Drury.

✓ Ar. aurantius Sulz.

Soekaranda (m. Januario). }

✓ Hyrmine chlorina Stål.

Soekaranda (m. Januario); Liangagas; Deli (W. Burghard leg., Mus. Hamburg.).

[Praeterea etiam Java (?)].

✓ Hyrmine minor n. spec.

Corpus ovale, supra sat convexum. Caput pronoti longitudine mediana valde brevius (fere = 2 : 3), supra planum, ante oculos leviter sinuatum, tum antrosum distinete angustatum, antice corrotundatum, apice ipso subtruncato. Tylo subaequilate percurrente, ings haud nisi levissime breviore. Pronoto latitudine sua humerali multo breviore (3 : 7); humeris rotundatis, abdominis basin utrimque haud vel vix superantibus; marginibus antero-lateralibus rectis, his et praesertim margine antico leviter reflexis. Scutello latitudine sua basali paullo longiore; parte postfemali sat lata, rotundata, ante apicem utrimque levissime depresso. Hemelytris clavis abdome vix angustioribus. Sutura membranae rotundata, angulo apicali exteriore corii haud retrorsum producto. Membrana abdominalis apicem (in mare saltem) longe superante, venas sat multas a vena incurva subbasali decurrentes simplices exhibente. Mesosterno carina mediana filiformi distinctissima

Stett. entomol. Zeit. 1900.

instructo; metasterno plano, marginibus paullo reflexis incluso. Mesostethii angulis basalibus distinctissime triangulariter retrorsum productis. Rubra orificiali longissima; area evaporativa extus oblique retrorsum sinuato-truncata. Ventris basi media sat obsolete tuberculata; angulis apicalibus segmentorum abdominalium vix prominulis, haud nisi minutissime spinulosis. Antennarum articulo basali capitis apicem subaequante, articulo secundo tertio subaequilongo vel parum breviore, tertio quarto distinete breviore (fere = 2 : 3), articulis apicalibus fere aequilongis. Rostro segmentum tertium ventrale subsuperante; articulo primo bucculis modice elevatis aequilongo, articulis duobus apicalibus subaequilongis, his singulis articulo secundo parum brevioribus. Tibiis supra late fureatis, postice leviter sursum excurvatis. Supra remote et sat obsolete (in corio paullo rufius et densis) punctata, pectore hic illie punctulato, abdome sat subtiliter aciculato-punctato; scutelli apice, pronoti regione cicatricali nec non capite supra fere toto impunctatis, hoc rugulis subtilibus maculisque obsoletis tribus occipitis ex punctulis confertissimis formatis notato.

Coerulecenti-viridis¹⁾). Pronoti parte posthumerali, antrosum inter humeros reete truncata, clavo, corio fere toto (huius area tantum marginali, usque ad rimulam et corii venam principalem extensa, exceptis), scutelli macula utrimque marginali semiorbiculari ante apicem sita, capitis inferioris lineola anteooculari, antennis, pedibus (coxis exceptis) rostrique apice nigris. Ventre (margini segmentoque genitali exceptis) sordide brunnecente vel violacecente (an decolorato?). Membrana nigro-fusea, marginibus vix dilutiioribus. Alis subvitreis, apice fumigatis, venis fusca. Abdominis dorso nigro-violaceo. Tibiis apicem versus pilositate densissima subtestacea, tarsis subtus segmentique genitalis margine pilis lutescentibus vestitis.

♂. Segmento genitali subhorizontali et postice modice profunde sinuato.

¹⁾ Alterum specimen dilute violaceum; nū subimmatrum?

Long. corp. 9—9½, cum memb. 10—10½ mm; lat. hum. 6½ mm.

2 ♂♂. Soekaranda (Januar 1874).

Facile distinguitur haec pulchra species a *Hyrmine chlorina* Stål, cui similis, statura minore, capite antrosum paullo minus angustato, apice truncatulo, toto unicolori, pronoti tota parte posthumerali antrosum recte trunca nigra coriique tantum area marginali viridi et, ut videtur, corii angulo apieali retrorsum hunc producto.

~~N~~ezara viridula Lin.

~~N~~ax. torquata et smaragdula.

Soekaranda (m. Januario).

~~A~~naca florens Walk.

Color nonnunquam in sordide luteum perditus,

Soekaranda (m. Januario).

~~A~~lautia fimbriata Fab.

Soekaranda (m. Januario).

✓[#] Zangis subpunctata Walk. Dist.

Z. melanosticta Völl. see. dom. Distant.

Capite ante oculos leviter situato, tum antrosum sat grueller angustato, apice corrotundato, supra antice subtiliter strigoso, occipite subtilissime punctulato, lineis sex longitudinalibus punctorum maiorum punctisque paucis sparsis distinctioribus. Pronoti marginibus antero-lateralibus anguste filiformiter elevatis usque ad humeros, abdominis basin utrimque haud vel vix superantes, rectilineis. Pronoto (limbo antero-laterali marginaque antice levissime elevato exceptis) scutelloque subtiliter at densissime subruguloso-punctatis; hemelytrorum parte coracea punctis distincte majoribus notata, huius margine anguste costali glabro. Punctis distincte majoribus in pronoto et scutello illis punctulis passim intermixtis, circa cieatrices (ipsas impunctatas) confuse coacervatis.

Stett. entomol. Zeit. 1900.

His punctis maioribus et punctis discalibus corii (his tamen obsoletissime) imo fundo nigris vel fuscis (quod aegre distinguitur in speciminibus paullo obscurius coloratis). Pectoris lateribus (arcis evaporativis exceptis) dense et modice subtiliter punctatis; ventre dense vermiculato-aciculato, medio longitrorum glabro. Mesosterni carina distinctissima, sublaminiformi, coxis tamen nusquam altiore metasternoque elevato per totam suam longitudinem fere aequalita, fere inter coxas anticas ipsas antrosum rotundato-aceliva. Ventris basi breviter acuminata inter coxas posticas vix produeta ibique metasterni discum elevatum arte tangente. Rostro segmenti tertii ventralis medium vix superante, articulo secundo tertio paullo, hoc iterum quarto distincte (3 : 2) longiore. Antennarum articulo secundo tertio distinctissime breviore. Tibiis posticis leviter sursum excurvatis.

Nitida, plus minus late viridis: apice articuli tertii antennarum (articuli apieales in speciminibus, quae vidi, multili sunt aut deformati), rostri apice imo, magneolorum apiebus, angulis apicalibus segmentorum abdominalium macululaque vel umbra marginali mox ante apicem scutelli sita nigris vel fuscis: margine imo scutelli pone has macululas vel umbras, margine angusto costali corii, stria intramarginali pronoti marginem antero-lateralem sequente nee non capitis marginibus dilute viridibus aut plus minus eburneis. Rostro, pectoris regione sternali ventrisque medio longitrorum dilute luteis. Membrana alisque vitreis, abdominis dorso viridi.

Marem non vidi.

Long. corp. 14½ (—15¹/₄) mm; cum memb. 15¹/₄ (—16²/₃) mm; lat. hum. 8²/₃ (—9¹/₂) mm.

1 ♀. Soekaranda (Jan. 1894).

Coloribus et magnitudine omnino *Nezaram* imitatur; facile recognoscitur scutelli apice multo latiore metasternoque distincte elevato, ventris spina basali aequalito.

¶ In feminis duabus iavanis, quas examinavi.

Stett. entomol. Zeit. 1900.

✓ *Aerozangis* n. gen.

Corpo supra modice convexo, capite omnino plano, medioeri, tylo pereurrente, aequilato, ocellis oculis magnis sat appropinquatis. Pronoto transversaliter sexangulari; humeris distinctissime angulariter productis abdominisque basin utrinque superantibus. Marginibus antero-lateralibus rectis, obtusis, nec lineiformiter reflexis. Margine antico angusto leviter reflexo, linea subtili a corii disco separato. Marginibus postero-lateralibus leviter sinuatis; margine postico inter angulos pronoti posticos, rotundato-obtusos, late sinuato. Scutello subtriangulari, latitudine basali paullo longiore; frenis per plus quam partes tertias duas longitudinis scutelli continuatis; parte postfrenali modice lata, retrorsum a basi usque angustata, apice corrotundato. Hemelytris clausis abdome paullo angustioribus; corii apice angulum fere 60 graduum exhibente scutellumque distinctissime superante; sutura membranali per totam partem exteriorem recta vel vix curvata. Venis membranae sat numerosis simplicibus a vena recurvata subbasali decurrentibus. Abdomine fere a basi usque retrorsum sat graciliter angustato; angulis apicalibus segmentorum omnium distincte acute prominentibus, praesertim angulis segmenti septimi (in utroque sexu); his distincte rectis, apice nento. Apparati genitali feminae modice profunde in segmentum septimum ventrale immerso eique segmento medio aequilongo. Ventre plus minusve distincte (in mare, ut videtur, distinctius) longitrorum subrectiformi-convexo, basi in spinam validam ne brevem, metasterni elevationem tangentem, producto. Hac elevatione late cariniformi, ventris spinae aequialta. Mesosterni carina laminiformi, postice crassiore, metasterni elevationem truncatam artissime tangente ibique metasterni altitudinem haud superante, antrorsum volde descendente coxisque antice multo altiore, ante easdem coxas usque ad marginem anticum prosterni producta prosternoque arte incumbente, antice subito rotundato-necula. Mesostethii angulo postico distincte retrorsum producto, eodem angulo in metastethio recto. Suleo ostiolorum in rugam longam exente; area evaporativa extus oblique retrorsum sinuato-

Stett. entomol. Zeit. 1900,

truncata. Tibiis supra anguste sulcatis. Bucculis modice elevatis, retrorsum paullatim evanescentibus. Rostrum articulo primo capite inferiore parum breviore, articulo secundo tertio sublongiore compressiunculo, quarto tertio distinctissime breviore. Antennarum articulo primo capitis apicem haud vel vix attingente, secundo tertio distinctissime breviore, quarto et quinto subaequilongis. Corpore maximam partem viridi, supra, capite excepto, aquabiliter punctato, inter eicafries (ipsas impunctatas) et marginem antero-lateralem punctis compluribus rudibus, transversis, dense positis, notato. Ventre aciculato et nunc plus nunc minus distincte, punctato.

Genus *Zangi* Stål proximum; humeris distinctissime angulariter prominentibus, angulis apicalibus segmentorum abdominalium, praesertim septimi, acute prominentis, his distincte rectis (nec apertangularibus), marginibus antero-lateralibus prouoti omnino obtusatis nec lineiformiter reflexis, carina mesosternali alte elevata et usque ad marginem anticum prosterni extensa ventrisque lateribus nunc plus nunc minus distincte punctatis satis distinctum videtur esse.



* *Aerozangis semiprasina* n. spec.

♀: Capite pronoti longitudine et frontis cum oculis latitudine breviore, ante oculos maiusculos sat graciliter angustato, marginibus subrectis, supra serobes antennales vix sinuatis, apice corrotundato, supra ruguloso-strigato, punctulis crebris fere ubique intermixtis, his punctulis in occidente in lineas nonnullas longitudinales ordinatis. Pronoto medio latitudine humerali fere ter breviore, humeris in angulum acutum fere 75 vel 80 graduum productis, apice haud nisi levissime obtusatis; margine postico huius processus subsionato, pronoti margine postero-laterali (ab ipso angulo costali corii usque ad intimum angulum basalem scutelli) fere ter breviore. Cicatricibus, stria marginem antero-lateralem pronoti intus sequente, processibus humeralibus antice,

Stett. entomol. Zeit. 1900.

postice et subtilis prostethiique marginibus exterioribus impunctatis. Reliquis pectoris lateribus (areis evaporativis exceptis) et capite inferiore sat subtiliter punctatis. Ventris lateribus latissime aciculato-strigosulis, punctulis sat erebris obsoletiusculis intermixtis. Tibiis posticis levissime sursum excurvatis. Rostro segmenti ventralis tertii apicem haud vel vix attingente, articulo quarto tertio fere tercia parte breviore. Antennarum articulo secundo tertio distinete breviore (2 : 3), hoc iterum quarto breviore (fere = 3 : 4).

Pulehra prasina, nitidinseula. Capite supra pronotique parte antehumerali, postice leviter sinuata, eburneis, huius margine antero-laterali retrorsum angustato viridi excepto. Capite inferiore et ventris pectorisque medio longitrorsum (apice luminac mesosternalis viridi excepto) dilute viridescenti-luteis. Antennarum articulis tertio, quarto et quinto apicem versus latissime, capitinis marginis, capitinis inferioris linea angusta longitudinali ante ocellorum medium incipiente et supra serobem antennalem continua, labri linea mediana, pronoti punctis duobus impressis cieaticium marginem posticum tangentibus, linea intramarginali subobsoleta et mox abbreviata angulorum collarium, marginibus imis processus humeralis, macula triangulari eiusdem processus ab apice humerali remota et cum eo linea coniuncta, angulis apicalibus segmentorum abdominalium, margine toto posteriore segmenti septimi connexivalis, abdominis segmenti analis disco. rostri apice immidiisque apicali unguientorum nigris vel fuscis. Pronoti angulis humeralibus ante et pone maculam triangularum maculaque dilutiore capitinis inferioris, anteooculari et lineis nigris inclusa roseis. Antennarum articulo secundo basin versus, ut videtur, leviter brunnescente; tarsorum apice infuscato. Valvularum genitalium exteriorum limbo interiore laete rubro. Membrana vitrea; macula anguli basalis interioris aliaque dilutiore in angulo exteriore oriente et oblique introrsum directa nec non apicibus venarum fuscescentibus. Alis cum venis hyalinis, apice sumigato, vena principali rubra. Dorsum abdominis viridi, segmenti sexti disco lato, segmento septimo toto segmentique analis basi ipsa purpureo-rubris.

Stett. entomol. Zeit. 1900.

Long. corp. $13\frac{1}{2}$, cum memb. 16 mm; lat. hum. 10, circa abd. basin 9 mm.

1 ♀. Soekuranda (Jan. 1894).

* * *

Aliud specimen masculinum differt statuta parum minore, ventre distinctius punctato, abdominis dorso viridi, segmenti septimi margine lato apicali rufescenti-piceo, humeris haud roseo-tinctis, ventris basi media brunnescente.

♂. Segmento genitali brevissimo, sulco transversali percurrente in duas areas segmentiformes diviso, area posteriore perpendiculariter erecta latera versus in laminulas sublobiformes dilatata, his lobulis extrorsum ab areae anterioris margine exteriore incisione angusta separatis.

Long. corp. $12\frac{3}{4}$, cum memb. $13\frac{3}{4}$ mm; lat. hum. $8\frac{1}{2}$, circa abd. basin $7\frac{1}{2}$ mm.

1 ♂. Sumatra (Mus. Reg. Dresden).

Specie ab *Acrozanga semiprasina* haud videtur differe.¹⁾

Nessula n. gen. = *Utanra*

Corpore supra modice convexo, ante humeros sat fortiter deelivo. Capite supra plano, elongato, ante oculos maiusculos sat graciliter angustato, apice corrotundato. Tylo aequilato, percurrente, antice inter iuga paullo protuberante. Toto capite superiore usque in margines ipsos, distinctos at omnino non reflexos, rude punctato, punctis in occidente in lineas longitudinales, subregulares ordinatis. Ocellis magnis oculis valde appropinquatis. Pronoti humeris in processus longos anguste angulares, acuminatos, horizontaliter extrorsum et haud vel vix antrorsum vergentes exentibus. Marginibus antero-lateralibus obtusis, leviter sinuatis; angulo collari denticulo conico, fere an-

¹⁾ Similis huic speciei forte est illa „*Cuspicona antica*“ Voll. iam-dudum incertissima, quae tamen speciee vix cum nostra *Acroz. semiprasina* congruit (capitis marginis apicesque angulorum segmentalium abdominis in diagnosi non dicuntur nigri; patria „Hindostan“ fertur esse).

Stett. entomol. Zeit. 1900.

trorsum vergente armato. Margine antico vix elevato; marginibus postero-lateralibus subrectis; margine postico leviter sinuato; angulis posticis obsoletis. Pronoti, antrosum valde convexo-declivi, parte antehumerali glabra, ante et extus cicatrices obsoletissimas fortiter punctata; parte posthumerali cum scutello clavoque corioque sat rude et dense punctata. Frenis per plus quam duas partes terfas scutelli extensis; parte postfrenalii modice angusta, retrorsum marginibus rectilineis distinctissime angustata, apice sat subito rotundato. Corio apicem scutelli distinctissime superante; sutura membranali recta; membrana venis sat numerosis, ut vena subbasali recurvata decurrentibus, omnibus vel fere omnibus simplicibus instructa. Abdomine fere a basi usque retrorsum sensim angustato, vix vel leviter rotundato. hemelytris clausis nonnihil latiore. Angulis apicalibus segmentorum dentiformiter prominentibus, neutis, praesertim in segmento septimo. Ventre glaberrimo, vix aeneolato-strigoso, in utroque sexu (in mare paullo distinctius) longitrorsum feetiformi-convexo, basi in spinam validam, sat brevem, metasterni elevationem tangentem producta. Hac elevatione late cariniformi, ventris spinae aquialta. Mesosterni carina lamini-formi, postice crassiore, metasterni elevationem truncatam artissime tangente ibique metasterno aquialta, antrosum leviter elevata coisque antieis sensim altiore, inter coxas anticas producta, sterno arte incombente, apice sat subito rotundato-aenaria. Mesostethii angulo postico distinete neutangulariter retrorsum producto, eodem angulo in metastethio fere reecto. Suleo ostiolorum in rugam longam angustato; area evaporativa extus oblique retrorsum subsinuato-truncata. Bucculis modice elevatis, retrorsum humilioribus et paullatim cyanescensibus. Rostro gracili; articulo primo bucculas haud vel vix superante, articulo secundo subcompresso articulo tertio parum breviore, quarto tertio multo breviore. Tibiis teretibus, supra angustissime sulcatis. Antennis gracilibus; articulo primo apicem capitidis haud attingente, secundo tertio distinete breviore. Apparatu genitali seminae medioeri, segmento septimo ventrali medio parum breviore in eiusque sinum apicalem trapezoideum, modice

Stett. entomol. Zeit. 1900.

profundum immerso; valvulis basalibus, vaginam includentibus, latitudini sua basali aequilongis vel ea parum longioribus, postice oblique extrorsum retruncatis (ne transversalibus, postice recte truncatis, ut in *Zangi*, *Aerozangi* aliisque generibus); valvulis posticis exterioribus retrorsum in dentem anguliformem praecantum excentibus. Corpore lutescente, supra maximam partem piceo-fusco.

Genus *Zangi* et *Aerozangi* affine; differt coloribus, pronoti angulis humeralibus longe cornutis, capite rude punctato, scutelli apice graciliore, subtriangulari, praetera autem forma valvularum genitalium basalium seminae et valvulis posticis exterioribus in codem sexu dente armatis.

✓ *Nessula sponsa* n. spec.

Capite latitudine frontis cum oculis parum, longitudine mediana pronoti distinete breviore, ante oculos leviter lateque sinuato, deinde subgraciliter rotundato-angustato, supra punctato, punctis hic illie coacervatis; vittis dubius occipitis approximatis et linea punctorum sat regulari separatis maculaque obliqua marginem antero-interiorum oculorum sequente impunctatis. Processu humerali postice leviter sinuato ibique margine postero-laterali pronoti (ab ipso angulo costali corii usque ad intimum angulum basalem scutelli) paullulo longiore. Dimidio anteriore glabro pronoti punctis nonnullis maiuseulis et profundis sparso, praetera serie duplii intramarginali marginis antiei sat confusa medioque omnino interrupta punctorum fortium orbicularium serieque unica punctorum transversalium marginem antero-lateralem intus sequente et postice mox abbreviata notato. Pronoti dimidio basali (apieibus ipsis cornuum humeralium exceptis), scutello hemelytrorumque parte coriacea sat rude punctatis et hic illie levissime rugosis. Scutello latitudine sua basali paullo longiore; apice medio levissime longitrorsum impresso. Angulo apicali corii acuto fere 60 vel 70 graduum. Angulis apicalibus segmentorum abdominalium (secundi exceptis) acute prominentibus, angulo segmenti septimi acuto fere 80 graduum. Pectore (arcis evaporativis exceptis) hic rudius

Stett. entomol. Zeit. 1900.

illie subtilius punctato. Rostro segmenti quarti ventralis apicem superante vel subsuperante; articulo quarto tertio plus quam tertia parte breviore (3 : 5). Antennarum articulo tertio secundo fere quarta parte longiore; quarto omnium longissimo articulisque secundo et tertio simul sumptis haud ita multo breviore; quinto quarto paullo breviore.

Pulchre pieeo-fusca, subaeneo-micans. Pronoti parte tota glabra antehumerali usque a linea subsinuata apices cornuum connectente et cornua ipsa fere dimidiant flavescenti-lutea. Corpore toto inferiore, epipleuris coriorum, pedibus, rostro, antennarum articulo primo, maculis semiorbicularibus singulis segmentorum connexivalium marginem medium occupantibus. macula angusta triangulari basali corii inter ramos basiles rimulae posita, minuta minuscula orbiculari ad apicem rimulae intus posita striolaque marginali utrumque prope scutelli apicem posita dilute-lutescentibus. Punctis dispersis pronoti anterioris, antennarum articuli primi linea interiore et exteriore, carundem articulis reliquis (apice imo articuli quinti leviter ferruginescente excepto), rostri apice, linea capitinis inferioris mox ante oculos medios incipiente et supra tuberculos antennales continuata, punctis pluribus prostethii, maculis quibusdam minusculis meso- et metastethii, maculis marginalibus ventris in incisuris positis cum angulis apicalibus segmentorum, spiraculis, serie utrumque macularum transversalium intus spiracula positarum, valvulis genitalibus basalibus feminae intus margineque angusto apicali apparatus genitalis in eodem sexu nigris. Capite supra fuscescente, hic illie flavescenti-marmorato. Punctis impressis capitinis, pronoti (disparsis areae antehumeralis exceptis), scutelli areaeque costalis corii pulchre viridi-metallescentibus; punctis capitinis hic illie in maculas confluentibus. Ventris maculis punctisque dispersis pronoti anterioris saepe violaceo-micantibus. Connexivo punctulato viridi-metallecente. Membrana obscure fumigata, ad apicem exteriorem mucula decolori, introrsum oblique continua, notata. Alis subsordidis, viridi-vel purpureo-iridescentibus, venis et parte

Stett. entomol. Zeit. 1900.

apicali exteriore circa venas apicales fuseis. Dorso abdominis laete chalybaeo-metallico. Femoribus antieis semper vel fere semper, tibiis antieis plerumque guttulis nonnullis minutis, fuseis conspersis; femoribus posterioribus supra guttula unica subobsoleta fuscescente notatis.

♂. Segmento genitali sat parvo, oblique acelivo, latera versus sulco profundo sinuato transversaliter diviso, lobo ante sulcos sito valde depresso; segmenti parte media inter et pone sulcos producta retrorsum in apices duos subrectangulares prominente et inter illos processus sat profunde iterum fere rectangulariter incisa; marginibus incisurae callosis et reflexis. Basi media segmenti serie transversa densissima ciliarum recurvatarum armata.

♀. Dente apicali valvularum posticarum exteriorum fere rectangulare, apice acuminato, angulum apicalem segmenti ventralis septimi retrorsum parum superante.

Long. corp. $15\frac{1}{2}$ — $18\frac{1}{2}$, cum memb. 17 — $19\frac{1}{2}$ mm; lat. hum. 12 — $14\frac{1}{2}$, lat. bas. abd. 9 — $10\frac{1}{3}$ mm.

♂♀. *Sockaranda* (Jan. 1894).

✓Aspideurus Sign.

Species quinque mihi cognitae, quas ad hoc genus refereo (*A. varians* m., *flavescens* m., *ornatus* m., *politus* m. et n. spec.), ventris spina coxas intermedias superante gaudent. Antennarum articulo secundo cum tertio aequilongo vel eo vix breviore. Buceulis retrorsum humilioribus et paulatim evanescientibus. Pronoti marginibus antico et antero-lateralibus lineiformiter reflexis. Pedibus saepe piecentibus vel nigris; tibiis supra transversim convexis, utrumque subtiliter marginatis. Scutello magnitudine variante, nunc minore coriique apicem haud superante, nunc maiore abdominisque apicem attingente.

A genere *Amphimacho* Stål, quod non vidi, praeter ventris basin distinctissime armatam differe videtur articulo primo antennarum capitinis apicem vix attingente, abdominis margine imo acuminato, nec calloso, tibiisque supra distincte convexis et utrumque

Stett. entomol. Zeit. 1900.

angustissime marginatis, nec late sulcatis (quod bene distinguere solet dom. Stell.).

✓ *Aspideurus politus* n. spec.

♂: Corpore brevi ne lato, longitudine sua vix angustiore, supra sat fortiter, subtus modice convexo, valde nitido, supra subtiliter et sat remote, capite subtilissime et remotissime punctato; huius punctulis nusquam nisi secundum marginem interiorem igitur et intra ocellos et basin medium oecipitis in maculas minusculas concretatis; igitis basin versus radiatum rugulosus. Capite latitudini interoculari frontis sere aequilongo, ante oculos maiusculos sat breviter producto; parte producta ante oculos leviter sinuata, tum breviter corrotundata, antice subtruncata; marginibus angustissime reflexis linea punctorum subtilium intus terminatis. Pronoto lato, longitudine sua mediana sere fer latiore; marginibus antero-lateralibus leniter rotundatis, postero-lateralibus et postico truncatis. Scutello apicem abdominis hand attingente, latitudini sive basali sere aequilongo; frenis medium scutellum hand attingentibus, parte postfrenali latissima. Corii disco hic illie et parce punctato, maximum partem glaberrimo, basi et area costali densius punctatis, venis lineis duplicebus punctorum indicatis; angulo apicali corii apicem scutelli sere attingente, apice truncatulo. Membrana venis septem vel octo simplices vel raro fureatas exhibente. Capite inferiore et pectore medioriter, ventris lateribus sat rude et remote punctatis, maculis quibusdam et callositatibus pectoris hinc coloratis impunctatis. Ventris spina basali compressa coxarum intermedianum marginem anticum attingente vel paullo superante. Rostro coxas posticas vix attingente; articulo secundo omnium longissimo at articulis duobus apicalibus simul sumptis distinete breviore; his duobus articulis sere aequilongis. Antennarum articulis minus gracilibus, praesertim apicalibus duobus sat robustis; articulo tertio secundo paullo longiore, tertio quarto breviore (3 : 4), hoc quinto vix longiore.

Piceo-brunneus, levissime cupreo-metalleseens. Macula obsoletissima mediana tibi. antennarum articulis primo et secundo Stell. entomol. Zeit. 1900.

totis tertiique basi, rostri articulis primo foto et secundo supra, capite inferiore maximam partem, plaga marginali prostethii anterioris, acetabulis (his fusco-punctatis) maculisque et lineis aliis quibusdam glabris pectoris, coxis, trochanteribus, femorum basi apiceque (hoe obscurius et obsoletius), tibijs apicem versus, tarsis, inguinorum basibus, ventris spina basali, eiusdem vitta utrimque discali marmorata, marginibus apicalibus segmenti genitalis, serieque triplici utrimque macularum ventris limbum occupante (prima macularum sat diffusarum intus spiracula positarum, secunda obsoletiuseula macularum transversalium, spatium inter spiracula et marginem posteriorum segmentorum obtinentium, tercia macularum longitudinalium sere toton marginem exteriorem singulorum segmentorum occupantium) subferrugineo-flavis.

♂. Segmentis ventralibus quarto, quinto, sexto postice latissime et profundissime sinuatis; segmento septimo maximo, in sexti sinum apicalem late rotundatum profunde immerso, medio segmentis quatuor vel etiam quinque praecedentibus aequilongo. Segmento genitali subperpendicularly, sutura in formam campanae retrorsum aperiae curvata in areas duas diviso; area posteriore sutura illa inclusa valde depressa eiusque margine apicali (superiore) medio sat anguste et profunde exciso. Areae basalis lobo utrimque apicali distinete nonnihil reflexo, rotundato.

Long. corp. sine memb. $5\frac{1}{2}$ mm; lat. hum. 5 mm.

1 ♀. Soekaranda (Jan. 1894).

A congenericis omnibus descriptis et indescriptis mihi cognitis differt haec species punctura subtilissima et remota corporis superioris et praesertim capitis; ab *Asp. quadrivaculato* Sign. et *variegato* Sign. etiam magnitudine nimore et coloribus, ab una alterave etiam antennarum artielis apicalibus nigris, pedibus piccis membranaque late albido-marginata. Ab *Asp. rariante* Bred. vicino etiam forma latiore, antennis crassioribus, articulo tertio secundo parum longiore, capite ante oculos latius rotundato, connexivo foto cum linea ipsa marginali abdominis piceo, segmento

Stell. entomol. Zeit. 1900.

sexto ventrali in mure latius et medio sere semicirculariter sinuato, segmento septimo ventrali maiore segmentoque genitali aliter formato sive distinguitur.

Saceurus n. gen.

Corpo sat convexo, subhemisphaerico, opaco vel parum nitidulo; supra, praesertim in capite et pronoto, sat profunde et confertissime punctato. Capite subperpendiculari, ante oculos sat producto, latitudini frontali cum altero oculo aequilongo; tylo igitur band breviore. Pronoto sexangulari; margine antico profunde sinuato; marginibus antero-lateralibus rectis vel sere rectis; humeris rotundatis, band vel paululum prominulis; postero-lateralibus truncatis vel leviter rotundatis; postice late atque obsolete sinuato; angulis posticis rotundato-deletis. Margine antico pronoti linea impressa retrorsum terminata, punctato, medio seriem unicam punctorum, latera versus pone oculos puncturam confusam exhibente; soleis transversalibus cinctrices retrorsum terminantibus distinctis, impunctatis. Scutello apicem abdominis attингente, latissimo ab domineque dimidio distinctissime latiore, languiformi; frenis brevissimis, totius longitudinis vix quintam vel sextam partem efficiens; parte postfrenalii longe subaequata, tum subangustato-corrotundata. Hemelytris elansis connexivum haud tegentibus; angulis apicibus segmentorum connexivalium levissime prominulis, inermibus. Mesosterno obsoleti carinato. Ventris basi spina compressa armata. Ostiolis in rugam acuminatam, semel subinterruptam, excentribus; area evaporativa minuta. Bucculis percurrentibus, parum elevatis et undique sere aequalitis, postice truncatis. Rostri articulo primo bucculas vix superante; articulo secundo omnium longissimo. Antennis breviusculis; articulo primo apicem band attингente. Pedibus brevibus et sat fortibus; tibiis supra sere planis, utrinque distinctissime marginatis.

Aspidenro Sign. affine genus; differt capite distincte minus lato et longiore, pronoti marginibus lateralibus subrectis, margine antico pronoti medio et latera versus punctato. scutello latiore

Stett. entomol. Zeit. 1900.

etisque frenis brevissimis, punctura multo densiore et profundiore, corpore superiore opaco vel parum nitidulo, corpore convextiore minusque lato et denique fuso habitu.

Saceurus bicolor n. spec.

Capite ante oculos distinctissime angustato, deinde aequilato, apice rotundato-subtruncato ibique leviter trilobo; marginibus subtilissime reflexiusculis. Capite pronotoque confertissime et sat forsiter punctatis; illius interdum lineolis duabus interocellaribus, huius semper maculis quinque in pronoti parte anteriore positis areumque retrorsum aperum efficiens glabris (una media transversali, duabus minoribus cinctrices ipsas notantibus duabusque aliis pone soleos, qui cinctrices postice terminant, positis). Scutello multo obsoletius et remotius punctulato; punctis lateris versus magis coacervatis. Clavo coriisque dimidio basali fortiscente et confertissime, huius dimidio apicali multo remotius punctato et hic illie omnino glabro; huius eiusdem dimidii area costali plerumque regulariter biseriatim, apice confuse punctata. Angulo apicali corii distincte rotundato. Connexivo densissime punctulato. Corpore inferiore (plerumque etiam area opaca evaporativa) sat dense distincteque punctato; peitoris regione circa acetabula et ventris disco longitrorum glabris, illa sparsim punctata, hoc subtilissime longitrorum striolatulo. Spina ventrali coxas intermedias subattингente. Rostro inter coxas posticas extenso; articulis duobus apicalibus subaequilongis. Antennis apicem versus incrassatulis; articulo secundo tertio aequilongo vel eo paululum longiore; articulo ultimo sat valide fusiformi omnium articularum longissimo.

Dilute luteo-viridis. Capite supra subfuscque, pronoto, corii dimidio basali, clavo, macula utrinque marginali scutelli antemediana semiorbiculari, limbo angusto scutelli inter illas maculas et basin, prostethii limbo angusto antico tolosque peitoris lateribus, antennis, rostro tibiisque anticeis (harum basi excepta) nigris. Capite solo vel etiam pronoto nonnunquam viridi-aeneo induito. Pronoti maculis glabris quinque (et capitinis lineolis duabus, cum

Stett. entomol. Zeit. 1900.

adsum) viridi-luteis. Plaga magna nebulosa in parte apicali scutelli, corii limbo apicali, tibiarum posteriorum parte minus quam dimidio apicali, tarsis omnibus, spiraculis segmentisque genitalibus dilute piceis. Membrana septem-venosa, piceo-nigra; limbis basali (hoe late), exteriore et apicali hyalinis vel subhyalinis.

Var.: Specimina e Borneo reportata tibiis omnibus apicem versus, tarsis, rostro et nonnunquam etiam pronoti limbo laterali valde dilute picecentibus different.

♂: Segmento genitali convexiusculo ante apicem medio depresso; margine apicali medio inciso.

Long. corp. $5-5\frac{1}{2}$ mm; lat. hum. $3\frac{3}{4}-4\frac{1}{2}$ mm.

Soekaranda (m. Januario).

[Præterea Borneo (Mons Kina Balu!). Banguey (!)].

✓*Antestia Ellenriederi* n. spec.

Pentatomia cruciata? Fab. Ellenr. Nat. Tijdsch. Ned. Ind. 24
p. 154 (1862).

Species adhuc cum *A. anchora* Thunb. confusa, cum qua magnitudine, punctura picturaque ventris fere omnino congruit. Haud difficulter distinguitur his notis:

Corpore minus lato minusque convexo; colore principali lacte rubro (neq; aurantiaco-luteo). Corio trimaculato; macula anteriore reliquis haud maiore, multo longiore quam lata, oblique anterorum producta et antice valde acuminata a margine costali semper valde distante. Macula posteriore inferiore angulum interiorem corii (nisi in varietate β nigricanti) haud attingente. Macula posteriore exteriore corii anterorum in vittam marginalem maximum partem areae costalis occupantem producta. Membranae limbo haud, nisi obsoletissime atque angustissime, dilutescenti (neq; late albo-hyalino). Tylo vel toto nigro, vel linea rubra media nonnotata; macula frontis elongato-quadriformi, lineam luteam vel sanguinem ineluctante. Maculis pronoti seriem posteriorem efficientibus plerumque quatuor, raro sex; exterioribus in hoe ensu-

Stett. entomol. Zeit. 1900.

terioribus valde approximatiss¹). Angulis basalibus segmentorum ventralium maculis (nisi minutis atque obsoletissimis) haud notatis. Femoribus pictura nigra destitutis cum tibiis lutescentibus, geniculis apieque tibiarum dilute rufescentibus, vel pedibus totis rufescentibus. Antennis quam in *A. anchora* distincte gracilioribus.

Callo antico pronoti eiusque disco et scutello inter maculas nigras eburneis. Pronoti linea mediana (pone cinctrices in maculam dilatata) scutellique macula media lacte rubris.

Var. α. Corpore toto superiore (picturis typis nigris exceptis) dilute rubro.

Var. β. Pictura nigra corporis superioris valde extensa corporeque superne viso magis nigro quam rubro vel eburneo, praesertim capite hemelytrisque fere totis nigris.

Long. corp. $10-10\frac{3}{4}$ mm; lat. hum. $5\frac{3}{4}-6\frac{1}{5}$ mm.

Soekaranda (m. Januario).

Præterea: Java occid. (Mons Gede) et orient. (Montes Tengger; hic var. β); Borneo (var. α) (Brunei, coll. Horvath, Mons Kina Balu).²⁾

✓*Antestia plebeia* Voll.? var.

Cum *A. cruciata* Fab., cuius specimenia sundana nunquam vidi, structura dimensionibusque corporis macularumque situ congruens, differt scutelli apice paulo gracilius acuminato, capite interoculare haud vel quam obsoletissime punctulato, maculis scutelli et pronoti (huius tantum sex exstant) lacte viridibus (neq; nigris) capiteque (tylo viridi excepto) immaculato. Pectore et

¹⁾ Has easdem maculas in unico tantum specimine *A. anchorae* invenio ibique angulum humerale ipsum occupantes et a maculis interioribus valde distantes.

²⁾ *A. anchora* Thunb. macula corii antica omnium maxima rotundata vel subfasciiformi, marginem costalem semper attingente vel subattingente, macula corii postea exteriore subrotundata anterorum in vittam marginalem nunquam producta insignis. Indiam continentalem inhabitat.

Vidi specimenia reportata ex India septentr. (Sikkim, coll. Horvath), Birma (Carin Chebà, leg. L. Fea, mss. Hamburg.) et Perak (coll. Horvath). In Archipelago malesio haud videtur occurere.

ventre dilute luteis, latera versus viridescensibus, hoc serie utrinque submarginali macularum transversalium basin segmentorum tangentium nigrarum, postice viridi-limbatarum ornato.

Long. corp. $7\frac{2}{3}$ mm; lat. hum. $4\frac{3}{4}$ mm.

Soekaranda (m. Januario).

Insectum nitidulum atque elegantulum ab *A. cruciata* certe specificie separandum et haud scio an cum *A. plebeia* Völl., specie aenigmatica, ut eius varietas coniungendum. Unicum tantum specimen examinare potui..

Otantestia n. gen.

Corpore supra modice convexo. Capite supra glabro; marginibus anguste lineiformiter reflexis; tylo pereurrente. Pronoti marginibus antico et lateralibus-anticis filiformiter calloso-reflexis, pone oculos distinete interruptis. Impressione linearis margines reflexos antero-laterales a disco pronoti separante antice serie punctorum notata. Scutello sublinguaeformi, apice lato, rotundato. Antennarum articulo basali capitum apicem haud attingente; articulo secundo quam primo longiore et quam tertio distinete breviore. Articulo primo rostri bucculas parum elevatas retrorsum vix superante; articulo secundo omnium longissimo, quam tertio tamen non multo longiore. Tibiis supra sulcatis. Mesosterno carinulam medianum parum elevatam exhibente. Ventre circa spiracula nigromaculato, basi inermi. Pro- et mesopleurorum margine postico lineam punctorum intramarginalem exhibente. Ostiolis parvis, sulco evaporativo brevi vel brevissimo, subito decurvato, apice libere sub prominulo, in rugam omnino non exente. Area evaporativa minima, ruga obliqua extus terminata; toto apparatu evaporativo (se. exteriore) subauriculato.

Differit hoc genus novum ab *Antestia* Stål praesertim structura apparatus evaporativi omnino alia; *Pentatomia pulchra* Dall. et *Antestia modifcata* Dist. hinc referendae.

Stett. entomol. Zeit. 1900.

Otantestia pulchra Dall.

Differit a diagnosi ancoris macula discali sentelli linea angusta mediana in maculas duas subquadriiformes divisa, membrana fere nigra, antennarum articulo secundo nigro (nec aurantiaco), tibiis omnibus supra subitusque nigro-lineatis longitudineque corporis minore (δ : 9 mm).

Soekaranda (m. Januario).¹⁾

Menida formosa Westw.

Soekaranda (m. Januario).

[Præferea etiam Borneo (Mons Kina Balu!) et Bangney (!)].

Pygomenida varipennis Westw.

Soekaranda (m. Januario).

Cuspicona virescens Dall.

Cum specimenibus javanis omnino congruit. Corpore supra suepe lutescenti; angulis segmentorum ventralium apice imo nigrescentibus. Segmentum maris genitale trisinuatum, latera versus rotundatum, sinu medio parvulo.

Long. corp. 9—10, lat. hum. $8\frac{3}{4}$ — $9\frac{1}{2}$ mm.

Soekaranda (Januar 1894), Deli (W. Burchard leg. Coll. Hamburg.).

Rhynchocoris margininotatus n. spec.

Capite latitudini frontis cum oculis fere aequilongo, ante oculos sinuato-angustato, apice corrotundato; tylo per totam longi-

¹⁾ Specimen aliud, quod vidi, a dom. ill. Horvath mihi benigne commisum et circa Bangkok a dom. Xanthus captum differit magnitudine iterum minore (δ : 8 mm), supra fere omnino dilute rubrum, maculis pronoti minoribus, serici posterioris interioribus subquadriiformibus, capituli superioris basi inter oculos macula quadrangulari notata, vitta corii intus secundum suturam clavalem retrorsum extensa suturamque membranalem attingente et macula apicalis corii angulum interiore sub-tangente. Antennarum articulo secundo basique artienti tertii sordide aurantiaceis; tibiis aurantiaco-luteis, unicoloribus.

A forma typica et varietate sumatrana specificie differre haud videtur.

Stett. entomol. Zeit. 1900.

tudinem subaequilato, iuga haud superante, basi cum adiacente parte ingorum transversaliter rugosulo, ingorum parte apicali laevi, infus punctata; fronte sublaevi, impunctata, medio obsolete rugulosa. Pronoto antehumerali cum capite distincte declivo; angulis humeralibus spinis subhorizontalibus recte exfrorum productis, acutissimis armatis; marginibus antero-lateralibus leviter sinuatis, obtusatis, angulo collari tuberculo minusculo atque obtusiusculo notatis; margine antico distincte calloso-elevato, postice linea impressa uniseriatim rude punctata terminata; pronoti margine postico late et sat profunde sinuato, angulis posticis obtusangulariter prominulis, apice imo subobtusatis, haud vel haud distincte lobuliformibus; marginibus postero-lateralibus regulariter sinuatis, margini postico cornuum prothoracis fere aequilongis. Pronoti cicatricibus, marginibus antero-lateralibus, apice imo spinarum humeralium margineque postico subangusto laevibus; pronoto reliquo cum scutello, clavo corioque sat rude denseque punctatis; huius macula longitudinali ante apicem rimulae intus posita impunctata. Scutelli marginibus lateralibus circa medium late aperangulariter sinuatis; marginibus partis postfrenalis distincte rectilinealiter convergentibus, apice corrundatis; linea mediana huic partis vix perceptibili. Corit angulo externo acuto sexaginta vel septuaginta graduum. Membrana venas octo vel decem hic illie surcatas exhibente, apicem abdominis paulllo superante. Antennarum articulo tertio secundo vix longiore, quarto tertio distincte longiore (fere = 3 : 2), quinto quarto paullulo breviore. Bucculis circa rostri basin angulariter elevatis, retrorsum paullatim decrescentibus, extus linea impressa punctata marginatis. Rostro apicem segmenti quarti ventris attингente vel subsuperante; articolis secundo et tertio fere aequilongis, hoc articulo quarto distincte longiore (3 : 2). Lamina pectorali alta, a basi ventris usque mox ante coxas anticas rectilineariter descendente, antice subperpendiculariter rotundato-truncata, marginem anticum prostethii vix attингente; hoc margine carinam sortem intramarginalem, medio interruptam exhibente; area angusta collari antecarinali haud vel obsoletestissime

Stett. entomol. Zeit. 1900.

punctata. Prostethii et metastethii areis posticis dense et distincte, ventris lateribus sparsim et obsoletius punctatis. Suleo ostiolario in rugam longam acuminatam excutie, area evaporativa rugulosa. Ventre medio longitudinaliter in formam carinae obtusissimam elevato, glaberrimo. Angulis apicalibus segmentorum abdominalis parum prominentibus, haud nisi levissime dentato-productis; apicibus segmenti septimi (♂) distincte dentiformibus, angulum a centrum fere quadraginta graduum exhibentibus, segmenti genitalis marginem posticum superantibus.

Nitidus, laete subolivaceo-viridis (hoe colore tamen saepe in subolivaceo-ferrugineum vel sordide luteo-ferrugineum perdit); scutelli apice, pronoti marginibus antero-lateralibus et antico corporeque toto inferiore dilutius viridulius. Jugis, macula linearis marginali corii (plus quam quintam partem basalem areae marginalis cum adiacente area pleurali, inferiore fere tota occupante posticeque macula marginali minuscula nigra terminata) maculaque basali in connexivi segmento septimo posita, quae etiam in ventris marginem perficit, laete aurantiacis vel subroseis. Linea submarginali capitidis inferioris ante oculorum medium incipiente, tili marginibus lateralibus anguste lineiformibus, cornuum thoracis apice lineisque marginalibus postica et antica (hae antice mox abbreviata) punctisque nonnullis plus minus confluentibus supra in illis cornubus positis, maculis minusculis apices segmentorum ventralium 3—6 occupantibus et in connexivi marginem anguste extensis, dentibus apicalibus segmenti septimi abdominalis supra subitusque, macula utrinque laterali segmenti genitalis maris (ex nebula punctulorum conflente et nonnumquam deficiente), antennarum articulis quatuor apicalibus totis aut fere totis (articulorum secundi tertique bases nonnumquam brunnescentes), carinam articuli primi linea exteriore, unguiculorum apicibus rostrique apice nigris. Membrana nigro-fusca, aeneo-nitente, angulo interiore rufescente; alis subvitreis, apice fumigatis venisque obscurioribus. Abdominis dorso viridi, apicem versus fuso.

♂. Segmentum genitale postice medio leviter sinuatum, extus

Stett. entomol. Zeit. 1900.

utrimque leviter rotundato-truncatum, angulis exterioribus obsoletis subapertangularibus, marginibus lateralibus subrectis.

Long. corp. 12—12 $\frac{1}{2}$, cum memb. 13—13 $\frac{1}{2}$ mm; lat. hum. 9 $\frac{1}{2}$ —10 mm.

3 ♂. Soekaranda (Januar 1894).

Differ hic parvus *Rhynchosoris* a congenerieis pronoti angulis posticis obtusangulariter productis nec lobuliformibus, articulis antennarum secundo et tertio subaequilongis angulisque apicalibus segmentorum abdominis leviter tantum prominulis, vix dentiformibus, quibus notis transitionem quandam facere videtur ad genus *Pugionen* Stål. a quo tamen distinguitur notis principalibus plurimis. A *Rhynch. taprobanensi* Berg., cui similis videtur esse, distinguitur dorso abdominis maximum partem viridi (nec nigro-violaceo), segmento genitali maris subtus omnino non impresso, eiusdem margine apicali medio leviter nec profunde sinuato-margineque capitis concolori nec nigro.

✓ *Priassus spiniger* Hagn.

Spina ventrali cum adiacente parte ventris in hoc specimine brunnea.

Long. corp. 14, cum memb. 15 mm; lat. hum. 8 $\frac{1}{3}$ mm.
Soekaranda (m. Januario).

✓ *Amyntor pallidus* n. spec.

Caput supra planum, latitudini frontis cum oculis fere aequilongum, longitudini mediana pronoti distincte brevius, triangulare, igitur tylum multo superantibus et ante eum contignis, apice subtiliter exciso-hiscescente; margine laterali utriusque iugi obsolete bisinuato (primum supra serobes antennales, deinde mox ante apicem), inter illos sinus levissime rotundato-dilatato. Pronotum latitudine humerali multo brevius (2 : 5), marginibus antero-lateralibus distincte sinuat, humeris sat prominentibus in formam anguli fere 45 graduum, apice ipso subobtuso; horum cornuum margine posteriore pronoti margine postero-laterali paullo breviore,

Stett. entomol. Zeit. 1900.

Dimidio anteriore pronoti supra dibus impressionibus late sulciformibus et longe transversaliter extensis, extus abbreviatis faltem inter vel paullulo ante humeros, altera mox pone marginem anticum) instructo; regione cicatricali inter illos sulcos transversaliter late calliformi-elevata. Scutello latitudine basali distincte longiore, apice postfrenali subgraciliter producto, marginibus fere rectis, convergentibus, apice corrotundato-obtuso. Abdominis marginibus hemelytra clausa utrimque modice tantum superantibus, angulis apicalibus segmentorum quam levissime prominentibus. Antennarum articulo secundo tertio breviore (2 : 3, vel fere 3 : 4), quarto tertioque subaequilongis, quinto quarto distincte longiore (5 : 4). Bucculis subperecurrentibus, leviter biarcuatis. Rostro inter coxas posticas extenso, articulo secundo tertio longiore. Pedibus subrobustis; tibiis supra planis, distinctissime marginatis; tarsorum articulo basali articularis apicalibus simul sumptis subaequilongo. Suleo ostiolorum ipso brevissimo, ruga obsoleta extrorsum continuato.

Subsordide ferrugineo-fulvo, hemelytrorum parte coriacea dilute rubescente; pronoti callo cicatrices ferente, marginibus lateralibus scutelli cum apice, tertia parte basali clavi coriique huinsque parte extra rimulam sita nec non femoribus tibiisque paullo dilutius lutescentibus. Ubique dense subfiliterque fusco-punctatus; depressio posterior pronoti inter humeros, vitta utrimque subobsoleta scutelli marginem lutescentem intus sequens margoque ventris extra spiracula punctis subtilissimis et densissimis fusco-nebulosa. Angulis imis humeralibus impunctatis, denticulis marginis pronoti, tibiarum apiebus tarsisque laete flavis. Antennis rufis; articulo basali fato, articulique secundi basi quintique apice (hoc obsoletius) flavescentibus. Coxis, sternis fasciolisque compluribus callosis abbreviatis regionis acetabulariae pectoris albo-luteis glabrisque. Abdomine medio longitrosum pareius, femoribus tibiisque haud nisi obsoletissime fusco-punctatis. Membrana subsordide lutescente, venis suis sex vel octo et vittulis apicalibus quinque vel sex abbreviatis inter singulas venas positis

Stett. entomol. Zeit. 1900.

grisescensibus. Alis fuscosecentibus, dorso abdominis, connexivo excepto, nigro-fuseo, hoc colore in segmento septimo in luteofusum transeunte.

Segmentum genitale maris minusendum, perpendicularare, utrumque prope medium transversaliter impressum; margine libero superiore segmenti distincte trisinuato, sinu medio magno profundissimoque.

♂. Long. corp. 14, cum memb. $11\frac{1}{2}$ mm; lat. hum. $7\frac{3}{4}$ mm.
♀. Long. corp. 13, cum memb. $13\frac{1}{2}$ mm; lat. hum. $8\frac{1}{4}$ mm.

1 ♂, 1 ♀. Sinabong.

Differet videtur hic primus Amyntor ex Archipelago malesio cognitus a congenericis indieis depressionibus transversis pronoti, angulo marginis lateralis iugorum omnino delecto nec non coloribus et magnitudine.

✓ Subfam. Asopini.

Cierona coerulea L.

Soekaranda (m. Januario); Sinabong; Bekantiang.

Cazira strumosa Stål.

Soekaranda (m. Januario).

Cazira chiroptera H.-S.

Soekaranda (m. Januario).

Platynopus melanoleucus Westw.

Soekaranda (m. Januario), 1 ♀.

Canthecona iavana Dall.

Soekaranda (m. Januario).

Canthecona rufescens Voll.

Soekaranda (m. Januario).

Audinetia spinidens Fab.

Soekaranda (m. Januario); Liangagas.

Asopus malabaricus Fab.

Vium var. *rubrocinctus* Bred.

Soekaranda (m. Januario).

Stett. entomol. Zeit. 1900.

✓ Subfam. Tessaratomini.

Mueanum patibulum Voll.

Soekaranda (m. Januario).

[Præterea etiam Borneo (Kina Balu Mons!) et Malacea (Perak!).]

✓ *Pygoplatus Ralandi* Ellenr.

Corpore superiore in duobus, quae vidi, speciminibus haud vel quam dilutissime rubro-signato. Processibus humeralibus nigropunctatis. Margine exteriore segmentorum abdominalium haud vel quam levissime sinuato.

♂: Segmenti genitalis medio leviter et subapertangulariter exciso; angulis apicalibus segmenti septimi rectis, apice obtusatis.

Long. corp. $17\frac{1}{2}$ — $19\frac{1}{2}$ mm.

Soekaranda (m. Januario).

✓ *Pycanum rubens* Fab.

Vium var. *amethystinum* Web.

Soekaranda (m. Jannario).

✓ Subfam. Dinidorini.

Cyclopelta obscura St. Farg. & Serv.

Vium var. *trimaculata* Voll.

Soekaranda (m. Jannario).

* *Aspongopus nigriventris* Westw. Voll.

Species variat antennarum articulo quinto nunc nigro, nunc flavo.

Forma capitis insignis species. Hoe ante oculos valde atque apertangulariter sinuato, ante sinus angusto (spatio interocellari cum ocellis ipsis vix latiore) et anterius levissime dilatatulus, apice sat breviter corrotundatus vel sere subtruncatus, medio leviter inciso.

Species *Asp. cuprino* Stål philippinensi affinissima. Differt ab hoc capite ante oculos profundius atque distinctius sinuato et

Stett. entomol. Zeit. 1900.

ante sinus iterum subdilatato, antennis sensim gracilioribus coloribusque semper multo dilutioribus.

✓^{*} *Aspongopus fuscus* Westw.

Species variat antennarum articulo apicali nunc nigro, nunc flavo.

Colore principali eum praecedenti plerumque congruens, differt abdominis lateribus saepissime — at non semper! — flavo-nofatis, statura minore, praesertim autem forma capitis. Huic parte antoculari breviter et distinctissime trapezoidalis; marginibus ante oculos distinete sinuato-convergentibus; apice subtruncato-corrotundato.

Soekaranda (m. Januario).

{ Praeterea etiam Malacea (Perak!), Nias (!), Borneo (!) et Palawan (!).

✓^{*} *Aspongopus marginatus* Costa.

Soekaranda (m. Januario).

✓^{*} *Megymenum brevicorne* Fab.

Soekaranda (m. Januario).

✓^{*} *Megymenum basale* Walk.

Capite quam longitudine sua interoculari distinctissime longiore; ipsis ante oculos substylatos incrinitibus apertangulariterque sinuatis, deinde subparallelis apice singillatim late rotundatis; capite medio inter iuga distinctissime inciso. Pronoti dente collaris atque forti distinete acutangulari (circiter 75°). Numero dente minusculo recte extrorsum vergente abdominalisque basin utrimque distinctissime superante armato. Marginibus antero-lateralibus circa medium in processum dentiformem longum graciliterque acuminatum, ipsum serratulum, antrorsum atque extrorsum directum apieque suo latitudinem basalem ventris utrimque super-

¹⁾ Specimen iavanicum limbo abdominali cum corpore concolori praeeditum in coll. mea.

rantem vel subsuperantem armatis. Margine inter dentem humeralem et processum antehumeralem sat leniter, margine inter eundem processum et dentem collarem profunde (fere seniorbiculariter) sinuatis. Pronoto transversaliter subrugoso, antice in medio in tuberositatem valde convexam elevato. Scutello pone sinus retrorsum dilatatulo vel subaequilato, deinde subangulariter corrotundato. Angulis apicalibus segmentorum connexivium dente longo et acutissimo, recto armatis; segmentis singulis circa medium etiam alio dente multo minore, tamen et hoc quoque plerumque distinctissimo atque acuto instructis; in semina etiam valvulis genitalibus apicalibus eiusmodi dentibus munitis. Membrana apicem abdominalis hand omnino attingente. Antennis sublongisculis; articulo secundo capitis latitudini cum singulo oculo aequilongo; articulo quarto quam tertio distinete breviore; hoc articulo et secundo distinctissime dilatatis.

Obscure cupreum; membrana dilute flava, hic illuc nigromarmorata; his litoris nigris circa medium longitudinis membranae in fasciam nebulosam intus decurtatam coacervatis. Antennis nigris; apice articuli quarti dilute piecessenti.

Long. corp. 17—18 mm; lat. ad apicem processum $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{4}$, lat. bas. abdom. 7— $7\frac{1}{5}$ mm.

Soekaranda (m. Januario).

Species quamvis capitis longitudine subgeneris *Anaplocephalae* Stål admonens tamen propter pronoti connexivique structuram subgeneri *Pseudarado* Burm. aptius adnumeranda est, differt tamen processibus antehumeralibus pronoti graeillime acutangulariterque productis. Primo vero iam intuitu ab hoc aliisque omnibus congenericis distinguitur dentibus longiusculis atque acutissimis marginis abdominalis. *M. basale* Walk. ex insula Borneo reportato hanc nostram speciem sumatranam non sine magna dubitatione attribuo cum diagnosis illius speciei, quam dedit auctor, notis vere specificis omnino inanis sit.

✓ *Megymenum cupreum* Guér.

Soekaranda (m. Januario).

✓* *Byrsodépsus sundanus* n. spec.

Species eum *B. coriaria* Stål ex India septentrionali (Sikkim) reportato plurimis notis congruit, at corporis dimensionibus multo minoribus, *ingis supra omnino planis* (ne convexusculis, apicem versus planiuseulis!), marginibus postero-lateralibus pronoti fere rectis, margine postice late sinuato, femoribus anticis et praesertim posticis subtus pone medium spinis quaternis longis (binis in latere anteriore, binis in posteriore positis), femoribus intermediis spinis trinis (singulis in latere anteriore, binis in posteriore) armatis, pronoto et scutelli basi linea mediana quamvis tenuissima destitutis, macululis tribus baseos scutelli (intermedia paulo distinctiore) apiceque scutelli lutescentibus (hoc punetis paucis fuscis notato), corpore inferiore maculis lutescentibus, quantum video, destituto, ut totius corporis limbo regulariter atque acqulatae materie quadam sordide cretacea cooperito; in connexivo macululae nonnullae rotundatae inveniuntur ex eadem materia concretae, incisuras occupantes. Quibus omnibus notis insectum a *B. coriaria*, praesertim in tanta patriarum diversitate, specifice satis distinctum esse mihi quidem videtur.

Articulo tertio antennarum secundo fere duplo breviore late foliaceo-dilatato; articulo quarto quam tertio nonnihil longiore et, ut illo, sat longe piloso, ferruginescenti-flavo, basi nigro, apice infusento. Corpus infra, ut in *Megymenis*, modice convexum. Margine apicali segmenti genitalis rotundato, integro.

Pronoto retrorsum in processum, qui scutelli magnam partem basalem legit, dilatato genus inter vicina valde singulare.

Long. corp. 13 mm; lat. hum. 6, lat. max. abd. $6\frac{1}{2}$ mm.

1 ♂ Soekaranda (m. Januario).

✓ Subfam. **Phyllocephalini.**

✓ *Tetroda histeroides* Fab.

Soekaranda (m. Januario).

✓ *Megarrhamphus rostratus* Fab.

Soekaranda (m. Januario).

✓ Subfam. **Acanthosomini.**

✓* *Microdeuterus Dohrni* n. spec.

Capite magno mox ante oculos sinuato-angustato, ante sinus marginibus subdivergentibus, margine antico leviter rotundato. Pronoto eum scutelli basi sat fortiter subgloboso-convexo, postice late sed profunde sinuato; marginibus antico, antero-lateralibus et postero-lateralibus (his obsoletius) callosso-elevatis; angulis posticis apertangularibus, apice rotundato-obtusatis. Scutello subtriangulari, latitudine basali paullo longiore, marginibus exterioribus circa frenorum apicem leviter sinuatim; parte postfrenali subrotundato-acuminata, carina mediana subobsoleta antice et postice decurtata instructa, apice ipso obtusiusculo. Corii sutura membranali recta, angulo apicali exteriore retrorsum leviter apertangulariter producto, extus levissime membranaceo-marginato. Membrana abdominis apicem superante, venis 7 vel 8 percurrentibus. Connexivi angulis apicalibus segmentorum tertii distinete, quarti, quinti et sexti vix prominulis; his apicibus omnibus duplicatis, margine externo imo connexivi longitrorum suleato. Antennarum articulo secundo primo paullo longiore tertio multo breviore (1:3), hoc articulo quarto distinete (3:2) et quarto iterum quinto (4:3) longioribus. Buceulis subsemiorbiculariibus, valde elevatis, fere sub seribibus antennalibus altissimis. Rostro segmenti ventralis quarti apicem subattigente. Lamina sternali marginem prostethii anticum attingente. Suleo ostiolorum modice longo, apice acuminato. Ventre per totam longitudinem distinete carinato, spin basali coxas intermedias attingente.

Lutescenti-viridis, subtus, pedibus lacte viridis exceptis, subvirescenti-luteus. Corio clavoque subdiaphanis, cum

membrana sordide lutescentibus. Punctulis sat remotis pronoti et sentelli, punctis clavi et corii (venas et maculam longitudinalem rimulam intus sequentem liberas relinquentibus), capitis margine immo subobsoleti, labri linea tenui mediana, pronoti linea impressa punctata marginem anticum sequente eiusdemque margine postico, sentelli apice et basi, haec maculæ quatuor basales lutescentes includente et postice diffusa, corii maculæ obsoletiusculis et subconfluentibus (una in disco ante apicem rimulae, alia in angulo apicali exteriore, tertia in angulo interiore positis), membranae margine interiore maculaque marginis exterioris circa medium, maiore parte apicali segmentorum connexivalium angulisque apicalibus segmenti septimi ventralis piceo-brunneis aut fuscis, ventre hic illie ferrugineo-adperso, incisuris omnibus (medio interruptis) metastethiique sulco ostiolario ferrugineis; callis duplicitis postspiracularibus segmentorum ventris orbicularibus, eburneis. Dorso abdominis aurantiaco-rubro, violaceo-mieante, in segmento septimo in purpureo-rubrum transcente. Antennarum articulis tribus apicalibus larsorumque articulis apicem versus sordide brunnescensibus.

♀. Segmento ventris septimo apice profunde subtrapezoideo-sinuato (vel potius trisinuato, sinu medio longe maximo, lateribus obsoletis), angulis apicalibus sat acute prominentibus, angulum fere triginta graduum efficiensibus, apicibus levatis. Segmentorum genitalium margo posticus subtruncatus, medio leviter lateque sinuatus, nigro-ciliatus.

Long. corp. $10\frac{3}{4}$, cum membr. $11\frac{3}{4}$ mm; lat. hum. 5 mm.

1 ♀ Sockaranda (Januar 1894).

A *Microd. aequali* Walk., e Borneo reportato, coloribus corporis et antennarum et membranae aliisque notis differre videtur.

Triclioscelis nov. gen.
Dasyponinorum (Diptera)
von
V. v. Röder in Hoym (Anhalt).

Triclioscelis a reliquis Dasyponinorum generibus, quorum tibiae anticae calcare non armatae sunt, ab domine lato, convexo, facillime distinguitur. Facies lata non tuberculata; thorax gibbus. Pedes validi. Femoribus posterioribus crassissimis, tibiis posticis curvatis; tarsis posticis crassis. Pulvillis distinctis. Alae longae; cellulis posterioribus, prima quartaque ante marginem alicet clausis.

Professor Burmeister entdeckte diese neue Gattung in den La Plata-Staaten (Argentinische Republik) auf seinen Reisen dasselbst in den Jahren 1857—1860. Er erwähnt dieselbe in Bd. II seiner Reise durch die La Plata-Staaten auf pag. 170. „Bei Tucuman fand ich eine neue mit *Discocephala* Macq. verwandte Gattung, welche sich durch enorm verdickte Hinterschenkel auszeichnet.“ Dieselbe Bemerkung über diese Art nach Burmeister's Angabe, befindet sich in dem Catalogo de los Dipteros hasta ahora, descritos que se encuentran en las Repúblicas del Río de la Plata por Enrique Lynch Arribalzaga sep. pag. 36. Was die Verwandtschaft mit *Holcocephala* Jaen. == *Discocephala* Macq. anbelangt, so sind es die etwas vorgequollenen Augen und der buckelartige Rückenschild, welche ein wenig an diese Gattung erinnern, welches Burmeister wohl veranlaßt hat, dieselbe mit *Discocephala* verwandt zu halten. Es läßt sich die neue Gattung in keiner anderen Weise mit *Holcocephala* vergleichen, vielmehr schließt dieselbe sich in Flügelgeäder und Gestalt der Gattung „*Triclis* Lw.“ an. Ich nenne zu Ehren des Entdeckers derselben, Professor Burmeister, die erste Art:

1. **Triclioscelis Burmeisteri** nov. spec.

Atra; epistomate aurato pollinoso pilosoque. Articulis ambobus primis antennarum rufis. Articulus tertius deest. Proboscide