

I already announced in my *Essai monographique sur le genre Trigonosoma* (Revue d'Ent., VIII, p. 37) that *Trigonosoma rusticum* Fabr., the type of the genus, varies little. The specimens that I examined from southern Europe and from Asia Minor appeared constant to me in the general form as well as in the color and the sculpture. However, I have just noticed that in Turkestan there is a variety of it which is distinguished rather clearly from the type and which I want to name var. *advena*. It has the same aspect as the type, but the top and the lower part of the body are more slightly punctured; the base of the scutellum is not or hardly tumescent and is non-rough, but only punctured, while in the type *rusticum* the scutellum presents a strongly punctured and a transverse rough basal tumescence; the venter is entirely of a yellow straw, not smoked out on the disc, but black at the base behind the posterior legs; the two former plates of the genital segment of the female, which are concave in the type *rusticum*, are convex in the variety.

NOTES SUR LE GENRE *TRIGONOSOMA*

Par le Dr G. HORVATH.



1. J'ai signalé déjà dans mon *Essai monographique sur le genre Trigonosoma* (Revue d'Ent., VIII, p. 37) que *Trigonosoma rusticum* Fabr., le type du genre, ne varie que peu. Les exemplaires que j'en ai examinés de l'Europe méridionale et de l'Asie-Mineure m'ont paru assez constants pour la forme générale aussi bien que pour la couleur et la sculpture. Cependant, je viens de remarquer qu'au Turkestan il y en a une variété qui se distingue assez nettement du type et que je veux nommer var. *advena*. Elle a le même aspect que le type, mais le dessus et le dessous du corps sont plus faiblement ponctués; la base de l'écusson est non ou à peine tuméfiée et non rugueuse, mais seulement ponctuée, tandis que dans le *rusticum* type l'écusson présente une tuméfaction basale transverse fortement ponctuée et rugueuse; le ventre est entièrement d'un jaune paille, non enfumé sur le disque, mais noir à la base derrière les hanches postérieures; les deux plaques antérieures du segment génital de la femelle, qui sont concaves dans le *rusticum* type, sont convexes dans la variété.

2. M. W.-F. Kirby a décrit en 1891, dans un mémoire sur les Hémiptères de l'île de Ceylan (*Journal of the Linnean Society*, XXIV, p. 77), une espèce nouvelle, *Trigonosoma confusum*. Cette description a été faite d'après un exemplaire conservé au British Museum, qui a été désigné autrefois par Dallas (*List of Hem.*, I, p. 46) comme *Tr. Desfontainii* et par Walker (*Cat. Hem. Het.*, I, 65) comme *Tr. Fischeri*, de Ceylan. M. Kirby dit que cet exemplaire a été donné au Musée en 1849 par un M. Paul avec d'autres insectes provenant de l'Égypte et de Ceylan. La patrie du *Trigonosoma* n'était pas exactement indiquée. La description de M. Kirby ne permet aucun doute que cet insecte appartient en effet au *Tr. Fischeri* et que, par conséquent, il provient de l'Égypte. Le *Trigonosoma confusum* Kirby n'est donc qu'un synonyme du *Tr. Fischeri* H.-Sch.

*T. confusum* Kirby, a syn. of *T. fischeri* H-S

*T. fischeri*

= *T. desfontainii* Dallas, 1851 (Ceylon spec.)

= *T. confusum*