

1865 on computers

Uchen. Zap. Kazan. Univ. [Otd. Fis-mat. med. Nauk]
1864, 1: 109-129.

Author
Card

Hemiptera of the Volga Fauna (Rhynchota Heteroptera)

B. E. Jakovlev.

Division of Hemiptera
Department of Entomology
U. S. National Museum

catalogued

NOTICE: This material may
be protected by copyright
law (Title 17, U.S. Code).

Fam. I CORISAE.

Corisa. Am. et Serv.

1. *C. Geoffroyi*. Leach. (*C. punctata* Burm.). Оренбургъ, Киргизскія степи (Евм.)
2. *C. hieroglyphica*. L. Duf. Казань, Оренбургъ (Евм), Астрахань.
3. *C. striata*. L. Казань, оренб. губернія.

Fam. II NOTONECTAE.

Notonecta L.

4. *N. lutea*. Müll (*N. compacta* Евм. coll.) Казань.
5. *N. glauca*. L. Обыкновен. въ губерніяхъ казанской, симбирской и саратовской; Оренбургъ и Киргиз. степи (Евм.)

Fam. III NERAЕ.

Nera L.

7. *N. cinerea*. L. Обыков. въ симбирской и саратовской губ.; Оренбургъ и Киргизскія степи (Евм.)

Ranatra Fab.

7. *R. linearis* L. Киргизскія степи, Индерскъ, Оренбургъ (Евм.) Сарепта (Bull. des Nat. de Moscou 1857, N° 1, стр. 264. *A. Becker*: Naturhistor. Bericht.) Замѣчательно, что весною 1863 года А. Э. Эверсманъ поймалъ около Казани два экземпляра этого клопа, который никогда не встрѣчается на Волгѣ выше Сарепты.

Fam. IV NAUCORIDAE.

Naucoris. Fab.

8. *N. cimicoides*. L. Довольно обыков. въ губерніяхъ казанской, симбирской и саратовской; Оренбургъ (Евм.).

Fam. V HYDROMETRAE.

Hydrometra. Fab.

9. *H. rufoscutellata*. Latr. Казань.
10. *H. paludum*. Fab. Оренб. губернія (Evm.)
11. *H. thoracica*. Schml. Казань, Оренб. губернія.
12. *H. lasustris* L. Мѣстопоходженія тѣ же. Видъ, встрѣчающійся чаще другихъ.
13. *H. odontogaster*. Lett. Казань.

Fam. VI PHYMATAE.

Phymata Latr.—*Syrtis* Fab.

14. *Ph. crassipes* Fab. Казань, Сергіевскъ, Оренбургъ (Evm.); Сепенга (Bull. des Natur. de Moscou, 1858. N° III. A. Becker. Naturhistorische Mittheilungen von den Jahren 1856—57).

Fam. VII ARADIDAE.

Aradus Fab.

15. *A. depressus* Fab. Оренбургъ (Evm.)
16. *A. corticulis* L. ib.
17. *A. lugubris* Fall. Казань; Саратовъ (Bull. des Nat. de Moscou, 1861. N° 2. стр. 622. G. Flor: Rhynchoten aus dem Caucasus und von der Grenze Persiens); Сепенга (Evm.)
18. *A. betulae* L. Казань, на *ulmus campestris*; Оренбургъ (Evm); Сепенга (Bull. des Nat. de Moscou, 1858. III. A. Beck. Naturhist. Mittheilungen).

19. *A. Wagneri* n. Казань (coll. Evm.) *Niger, pronotum bisignatum, elytrae flavomaculatae, pedes fusco-flavescentes.*

Голова черная, глаза темнокоричневые. Усики темно-бурые; суставъ первый очень короткій, почти овальный, второй—расширенный при основаніи въ шишку, вдругъ переходитъ въ тонкую среднюю часть, которая постепенно расширяется къ верхнему концу — черного цвѣта; средняя этого сустава свѣтло-бурая; третій—цилиндрической, —равняющійся по длинѣ половинѣ второго, — совершенно черный; четвертый на $\frac{1}{3}$ меньше третьяго, на концѣ бѣлый. *Хоботокъ* весь свѣтло-бурый, короткій, достигающій только до $\frac{1}{2}$ prosternum. *Pronotum* съ краями ровными (безъ зубчиковъ), весь черный, только части боковыхъ краевъ его, обращенныхъ къ основанію падкрылій, имѣютъ бѣловато-жел-

Уч. Зап. К. У. 1864 г. отд. II.

8

тую полосу. Вдоль его проходятъ четыре сильныхъ ребра, недостигающихъ однако передняго края. *Щитокъ* — черный. *Надкрылья* и *метелка* — одноцветныя, бурья; наружный край *scutum'a*, при основаніи темнобурый, а нѣсколько ниже помѣщается почти 4-хъ угольное, свѣтлое, буровато-желтое пятно. *Брюшко* темнобурое, снизу съ свѣтлыми дыхальцами и бѣловатожелтыми круглыми пятнами на наружномъ, нижнемъ краю каждаго сегмента. *Соплекиум* сверху, кромѣ такихъ же пятенъ, имѣетъ еще свѣтлыя полосы, на заднемъ краю каждаго сегмента брюшка, доходящія до надкрылій. Последнія, заднепроходныя пластинки *соплекиум*, больше другихъ продолговато округленыя и не имѣютъ свѣтлыхъ пятенъ, а окаймлены бѣдножелтыми полосками, на своихъ внутреннихъ сторонахъ, которыми онѣ почти соприкасаются. Снизу передняя часть тѣла совершенно черная. Ноги свѣтлыя, буроватожелтаго цвѣта, только уголь соприкосновенія *femor* и *tibia* — нѣсколько темнѣе. $2\frac{3}{4}$.

Одинъ экземпляръ этого клопа, находящійся въ коллекціи покойнаго Эверсмана — найманъ въ Казани. Онъ названъ мною въ честь профессора сравнительной анатоміи Казанскаго Университета Н. П. Вагнера.

Aneurus Curt.

20. *A. laevis* Fab. Казань (Еум.)

Fam. VIII. TINGIDIDAE.

Zosmenus Lap.

21. *Z. variabilis* Fieb. (*Z. maculatus* Lap.) Казань (Еум.)

22. *Z. capitatus* Wolff. Казань (Еум.); Хвалынскъ — очень много по землѣ въ Іюнь и Іюль.

Monanthia Lep. et Ser.

23. *M. cardui* L. Оренбургъ (Еум); Симбирскъ; очень частъ на *carduus* (spec.)

24. *M. setulosa* Fieb. Симбирскъ, на *chenopodium* (spec.)

25. *M. quadrimaculata* Wolff. Казань (Еум.)

26. *M. Wolffii* Fieb. (*M. Echii* Wolff.) Оренбургъ (Еум); Казань, Тетюши; очень частъ на *Cynoglossum officin.*, въ маѣ и Іюнь; Камышица — рѣже на томъ же растеніи.

27. *M. humuli* Fab. (*M. convergens* Klug). Оренбургъ (Еум.)

Tingis Fab.

28. *T. pyri* Geoff. Оренбургская губернія (Еум).

Campylostira Fieb.

29. *C. verna* Fall. Казань.

Fam. IX ACANTHIDAE.

Acanthia Fab.

30. *A. lectularia* L. обыкновененъ всюду.

31. *A. ciliata* Еум. (Bull. des Nat. de Moscou, 1841. N° 1 стр. 359). Казань; рѣдокъ.

Fam. X ANTHOCORIDAE.

Anthocoris Fall.

32. *A. nemorum* L. Казань; Хвалынецкъ; часть на *Urtica urens* L.

Temnostethus Fieb.

33. *T. pusillus* H. Sff. Казань, 26 сентября.

34. *T. lucorum* Fall. Казань; часть въ апрѣлѣ.

Triphleps Fieb.

35. *T. minutus* L. Казань (Еум).

Fam. XI SALDAE.

Salda Fab.

36. *S. pallipes* Fab.

var β . (*S. ocellata* Costa) Казань.

Очень много въ апрѣлѣ и маѣ.

37. *S. geminata* Costa. Астрахань.

38. *S. orthochila* Fieb. Казань. Августъ и сентябрь, на глинистой почвѣ между низкою травю.

39. *S. saltatoria* Fab. (?) Казань (Еум).

40. *S. quadrilineata* m. Казань (coll. Еум.) *S. nigra*, *elytrae flavolineatae*, *pedes flavescentes*.

Голова, туловище, брюшко и надкрылья— чернаго цвѣта. На головѣ, надъ мѣстомъ прикрѣпленія усиковъ, помѣщается по одному, почти круглому, пятну лимонножелтаго цвѣта. Такое же пятно, нѣсколько большей величины, находится еще на основной части хоботка; послѣдній весь бурога цвѣ-

та. Усики черные; на верхней сторонѣ основнаго сустава ихъ проходитъ желтая полоска; послѣдніе два сустава густо покрыты серебристо-бѣлыми волосками. *Protorax* черный, покрытый сверху очень мелкими волосками золотисто-желтаго цвѣта, а снизу серебристо-бѣлыми. Передняя, возвышенная часть *protoga* несетъ на средней линіи тѣла значительное углубленіе. Поперекъ *scutellum* (щитка) проходитъ замѣтная линія, дѣлящая его на двѣ, почти равныя части. Голова, щитокъ и *protoga*—блестящаго чернаго цвѣта, надкрылья же матовыя, кромѣ задняго конца *clavus*, по которому проходитъ блестящая полоска; нѣсколько выше этой полоски на *clavus* замѣтно продолговатое желтоватобурое пятно. Кромѣ того весь *clavus* покрытъ золотистыми волосами. *Scorium* черный матовый; по наружному краю его проходитъ довольно широкая буроватожелтая полоса, не достигающая однако до *protoga* на $\frac{1}{4}$ своей длины и отдѣленная отъ ребра мембраны (*membrana*) черной линіей. Другая полоска такого же цвѣта, только гораздо уже первой, проходитъ по среднему ребру *scorium*'а и загибается къ наружному краю вдоль *membrana*. Между этими двумя полосками помѣщается два желтыхъ овальныхъ пятна, одно надъ другимъ. Кромѣ того одно длинное пятно лежитъ около второй полоски, внутрь *scorium*'а, а другое небольшое—въ углу между *clavus* и *membrana*. Мембрана желтоватобурая; край темнобурый. Въ клѣточкахъ, образованныхъ ребрами мембраны, помѣщается по одному продолговатому пятнышку бурога цвѣта; кромѣ того между 2-мъ и 3-мъ внутренними ребрами проходитъ буроватая полоска, въ формѣ подковы, упирающейся концами въ ребро мембраны. Крылья молочно-бѣлаго цвѣта, вмѣстѣ съ надкрыльями, выставляются надъ брюшкомъ на $\frac{1}{3}$ своей длины. Ноги буровато-желтыя, волосистыя; на всѣхъ *femog*, около сочлененія съ *tibia*, замѣчается сверху по темнобурому круглому пятну, на передней же парѣ *femog*, съ нижней стороны, проходитъ во всю длину ихъ черная полоска. *Femog* покрыты свѣтложелтыми волосками; *tibia* задней пары ногъ покрыты сильными щетинками, чернаго цвѣта, неправильно разбросанными по всей длинѣ ихъ и только, въ мѣстѣ сочлененія съ *tarsi*, собраны въ щетинистое кольцо; послѣдній суставъ *tarsi*—черный.

Эго самая маленькая изъ нашихъ *salda* и величина ея не превышаетъ $1\frac{1}{2}$ или $1\frac{3}{4}$ линіи. Единственный экземпляръ этого клопа находится въ коллекціи Э. Эверсмана.

Фам. XII REDUVIDAE.

Ploearia Scop.

41. *P. vagabunda* L. Казань.

Oncosephalus Klug.

42. *O. squalidus* Rossi. Оренбургъ (Евм).

Harpactor Lar.

43. *H. iracundus* Scop. Оренбургъ (Евм), Сарепта, Кавказъ.

44. *H. annulatus* L. Видъ самый обыкновенный изъ Reduvidae въ губерніяхъ Казанской, Симбирской и Саратовской.

Collicoris Hahn.

45. *C. griseus* Rossi. Оренбургъ (Евм.) Камышинъ въ степныхъ мѣстахъ, подъ сухимъ навозомъ.

46. *C. pedestris* Wolff. Хвалыинскъ. Очень рѣдокъ.

Pirates Am. et Serv.

47. *P. stridulus* Fab. Сарепта (Евм.)

Фам. XIII. NAVIDAE.

Nabis Latr.

48. *N. ferus* L. (*N. vagans* Fab.) Самый обыкновенный видъ въ губерніяхъ Казанской, Симбирской и Саратовской.

49. *N. pallidus* Евм. Оренбургъ (Fieber, стр. 162. n. 11. и Евм. coll.)

50. *N. brevipennis* Hahn. Казань, Оренб. губернія (Евм.)

Фам. XIV PYRRHOCORIDAE.

Pyrrhocoris Fall.

51. *P. marginatus* Kolti. Оренбургъ (Евм.) Кавказъ (Kolenati).

52. *P. apterus* L. Очень обыкновененъ всюду.

Фам. XV LYGAEOIDAE.

Micropus Spin.

53. *M. Signoreti*, Kusz. Енотаевскъ, Астраханской губерніи. (Труды рус. энтом. общества, книга 1-я, 1861 г., стр.

69. Fab. 1, fig 4.)

Lygaeus Fab.

54. *L. familiaris* Fab. Сарепта (A. Becker, Bull. des Natur. de Moscou, 1858. III).

55. *L. equestris* L. Симбирскъ, Хвалыинскъ (на *Hyosciamus niger*). Камышинъ (на *Euphorbia spec.*), Саратовъ, Астрахань.—Оренбургъ (Евм).

Lygaeosoma Spin.

56. *L. punctatoguttata* Fab. Оренбургъ (Евм).

Nysius Dall.

57. *N. thymi* Wolff. Казань, Сызрань; Камышинъ (подъ кучами сухаго навоза, въ степи).

Ophthalmicus Schill.

58. *O. grylloides* L. Хвалыинскъ, рѣдко. Оренбургская губернія (Евм).

59. *O. ater* Fab. Казань. Часть. особенно осенью, по глинистымъ мѣстамъ, поросшимъ низкою травой.

Ischnocoris Fieb.

60. *I. pallidipennis* H. Sff. (*Pachymerus staphyliniformis* Hahn). Казань, Сергиевскъ (Евм).

Megalonotus Fieb.

61. *M. chiragra* Fab. Оренбургъ (Евм.); Казань, Царевко-кокшайскъ.

Perytrechus Fieb.

62. *P. nubilus* Fall. (*Pach. geniculatus* Hahn). Казань.

Pionosonius Fieb.

63. *P. varius* Wolff. Оренбургъ (Евм).

Homalodema Fieb.

64. *H. abietis* L. Казань.

65. *H. ferrugineus* L. Казань, только раннею весною (апрѣль).

Eremocoris Fieb.

66. *E. erraticus* Fab. Казань, очень много раннею весною. Сарепта (Евм).

Scolopostethus Fieb.

67. *S. pictus* Schill. Казань.

68. *S. affinis* Schill. (*Pach. decoratus* Gahn). Казань, очень частъ весною. Оренбургъ (Евм).

Trapezonotus Fieb.

69. *T. nebulosus* Fall. Казань, Симбирскъ, Камышинъ.— Оренбургъ (Евм).

70. *T. nigripes* Fieb. Казань, Царевококшайскъ, Семі-озерная пустынь.

71. *T. agrestis* Fall. Оренбургъ (Евм); Царевококшайскъ.

Microtoma Lar.

72. *M. carbonaria* Rossi. (*Lyg. aterrimus* Wolff). Оренбургъ (Евм).

Rhyarochromus Curt.

73. *Rh. adpersus* Muls. (*Pach. sordidus* Евм.) Казань, но рѣдокъ.

74. *Rh. lynceus* F. Часть въ Казани. Оренбургъ (Евм).

75. *Rh. pini* L. Самый обыкновенный видъ въ губерніяхъ Казанской, Симбирской, Саратовской.

76. *R. vulgaris* Schill. Казань, рѣдокъ.

77. *R. pedestris* Pz. Казань, очень рѣдокъ.

Beosus Am. et Serv.

78. *B. quadratus* Fab. Сарепта (Евм).

Gonianotus Fieb.

79. *G. marginipunctatus* Wolff. Оренбургъ (Евм).—Хвалыискъ, Камышинъ, часть подъ сухимъ навозомъ.

Emblethis Fieb.

80. *E. arenarius* L. (*Lyg. grisens*, Wolff). Оренбургъ (Евм.)

Ischnorhynchus Fieb.

81. *I. didymus* Zett. (*Cymus Resedae* Pz.) Очень частъ въ Казани—Оренбургъ (Евм.)

Phygadicus Fieb.

82. *Ph. artemisiae* Schill. Казань, частъ.

83. *Ph. urticae* Fab. Казань.

Platyplax Fieb.

84. *P. salviae* Schill. Казань, очень частъ. Саратовъ (G. Flor, Bull. des Nat. de Moscou 1861. N° 2. стр. 621).

Cymus Hahn.

85. *C. glandicolor* Hahn. Казань.—Оренбургъ (Еум).

86. *C. clavicularis* Fall. Оренбургская губернія (Еум).

Fam. XVI BERYTIDAE.

Neides Latr.

87. *N. tipularis* L. Казань (Еум).

Berytus Fab.

88. *B. clavipes* Fab. Казань.

Metacanthus Costa.

89. *M. elegans* Curt. Казань, очень рѣдокъ.

Fam. XVII COREIDAE.

Bathysolen Fieb.

90. *B. nubilus* Fall. Казань, Царевokokшайскъ.

Bothrostethus Fieb.

91. *B. denticulatus* Scop. Казань, Царевokokшайскъ.

Stenocephalus Latr.

92. *S. agilis* Scop. (*Coreus pugnax* L.) Казань; Камышинъ (часть на *Euphorbia* spec.); Симбирскъ.—Сарепта (A. Becker: Bull. des Nat. de Moscou, 1858. III).—Оренбургъ (Еум).

Camptopus Am. et Serv.

93. *C. lateralis* Germ. Сарепта (Becker: Bull. des Natur. de Moscou, 1858. III).

Alydus Fab.

94. *A. calcaratus* L. Казань, Симбирскъ, Хвалыинскъ.—Оренбургъ (Еум).

Megalotomus Fieb.

95. *M. limbatus* Klg. Казань (Еум).

96. *M. sareptanus* Bär. Сарепта (Bärensprung: Berl. Entom. Zeit. 1859; стр. 334. Tab. VI, fig. 7); Одинъ экземпляръ въ моей коллекци, доставленъ мнѣ изъ Сарепты г. Пельцамомъ.

Myrmus Hahn.

97. *M. miriformis* Fall. Казань.

Syromastes Latr.

98. *S. marginatus* L. Обыкновененъ всюду.

Gonocerus Latr.

99. *G. insidiator* Fab. Симбирскъ, Саратовъ.

Enoplops Am. et Serv.

100. *E. scapha* Fab. Казань, Кавказъ (Евм).

Therapha Am. et Serv.

101. *Th. hyosциami* L. Очень обыкновененъ въ губ. Каз. Симб. и Саратовской.

Rhopalus Schill.

102. *Rh. Abutilon* Rossi. Казань.

103. *Rh. crassicornis* L. Казань, Симбирскъ, Хвалыинскъ, Сарепта.—Оренбургъ (Евм).

Corizus Eall.

104. *C. maculatus* Fieb. (*C. intricatus* Евм. in litt.) Казань. (Евм).

105. *C. capitatus* Fab. Казань, Симбирскъ, Хвалыинскъ, Сарепта.—Оренбургъ (Евм).

106. *C. parumpunctatus* Schill. Казань, Симбирскъ, Хвалыинскъ.

107. *C. rufus* Schill. Казань, Хвалыинскъ. — Оренбургъ (Евм).

Fam. XVIII RHUTOSORIDAE.

Monalocoris Dahlb.

108. *M. filicis* M. Казань (Евм).

Miris Fab.

109. *M. laevigatus* Fab. Казань, Сызрань.

110. *M. holsatus* Fab. Казань.

var. β Fieb. Сызрань.

Brachytropis Fieb.

111. *B. calcarata* Fall. Казань; Оренбургъ (Евм).

var. γ virescens. Бунскъ.

Notostira Fieb.

112. *N. erratica* L. Казань, Симбирскъ, Хвалыинскъ.—
Оренбургъ (Еvm).

Lobostethus Fieb.

113. *L. virens* L. Казань.

Megaloceraea Fieb.

114. *M. longicornis* Fall. Казань, Симбирскъ, Сызрань.

Trigonotylus Fieb.

115. *T. ruficornis* Fall. Казань, рѣдокъ.—Оренбургъ
(Еvm).

Leptopterna Fieb.

116. *L. dolabrata* L.

var. α (*Miris lateralis* Wolff).

var. β (*M. abbreviatus* Wolff).

Казань, Сызрань.—Оренбургъ (Еvm).

Campobrochis Fieb.

117. *C. Falleni* Hahn. Казань.

Homodemus Fieb.

118. *H. ferrugatus* Fab. Казань, Оренбургъ (Еvm).

Brachycolens Fieb.

119. *B. scriptus* Fab. Казань, рѣдокъ. Камышинъ, до-
вольно часть на *Balsamita suaveoleus* Pers. (Калуферъ). Кав-
казъ, Оренбургъ (Еvm).

Calocoris Fieb.

120. *C. bipunctatus* Fab. Казань; Хвалыинскъ (очень часть
на *urtica urens*), Саратовъ (G. Flor: Bull. des Nat. de Moscou
1861. II. стр. 622).—Оренбургъ (Еvm).

121. *C. chenopodii* Fall. (*Miris laevigatus* Wolff). Казань,
Симбирскъ, Сызрань; часть.

122. *C. quadripunctatus* Fab. Казань.

123. *C. vandalicus* Rossi (*Lygaeus Fraxini* Fab.) Орен-
бургъ (Еvm).

124. *C. seticornis* Fab. Казань, Хвалынский. Оренбургъ (Еvm).

Phytocoris Fall.

125. *Ph. divergens* Meg. (*Miris longicornis* Wolff). Казань; Оренбургъ (Еvm).

Pycnopterna Fieb.

126. *P. striata* L. Казань, Оренбургъ (Еvm).

Rhopalotomus Fieb.

127. *Rh. ater* L. (*Capsus tyrannus* Fab). Казань, Сызрань.

Capsus Fab.

128. *C. scutellaris* Fab. Саратов; Оренбургъ (Еvm).

129. *C. capillaris* Fab. Саратовъ; Сызрань.

Lopus Hahn.

130. *L. gothicus* L. (*Capsus albomarginatus* Fab). Казань. Оренбургъ (Еvm).

Liocoris Fieb.

131. *L. tripustulatus* Fab. Казань, Хвалынский; Оренбургъ (Еvm).

Polymerus Hahn.

132. *P. holosericeus* Hahn. Казань.

Lygus Hahn.

133. *L. pratensis* Fab. Очень обыкновен. въ губерніяхъ Казанской, Симбирской и Саратовской.

134. *L. campestris* Fab. Казань, Симбирскъ, Сызрань.

135. *L. contaminatus* Fall. Казань.

136. *L. rabulinus* L. Оренбургская губернія (Еvm).

Pociloscytus Fieb.

137. *P. unifasciatus* Fab. (*Miris semiflavus* Wolff). Казань, Саратовъ; Царицынъ—оч. много на *Xanthium strumarium*.—Оренбургъ (Еvm).

Orthops Fieb.

138. *O. pastinacae* Fall. (*Lygaeus transversalis* Fab.) Казань.

Stiphrosoma Fieb.

139. *S. leucosephala* L. Казань, Бунскъ. — Оренбургъ (Еvm).

Halticus Hahn.

140. *H. luteicollis* Pz. Казань, очень частъ въ августѣ и сентябрѣ на глинистой почвѣ, между низкою травой.

141. *H. pallicornis* Fab. Казань; Оренбургъ (Еvm).

Cyllocoris Hahn.

142. *C. histrionicus* L. Казань.

Globiceps Latr.

143. *G. flavomaculatus* Fab. Казань, Оренбургъ (Еvm).

Orthotylus Fieb.

144. *O. nassatus* Fab. Оренб. губернія (Еvm).

145. *O. viridinervis* Kirch. (*Lygus floralis* Hahn.) Казань.

Heterocordylus Fieb.

146. *H. unicolor* Hahn. (*H. pulverulenta* Klug.) Казань; Оренбургъ (Еvm).

147. *H. tumidicornis* H. Sff. Подъ Казанью я встрѣтилъ, на *urtica urens*, var., съ усиками совершенно черными, тогда какъ у экземпляровъ, описанныхъ Н. Schäffer — 3-й и 4-й суставы усиковъ — красноватые.

Orthocephalus Fieb.

148. *O. vittipennis* H. Sff. Оренб. губ. (Еvm).

149. *O. mutabilis* Fall. (*Capsus pilosus* Hahn.) Нижвй-Новгородъ, Казань, Сызрань; Оренбургъ (Еvm).

Labops Burm.

150. *L. Dahlbergi* Fall. (*L. diopsis* Bur.). Оренбургская губ. (Еvm).

Atractotomus Fieb.

151. *A. tergipes* Muls. (*Capsus magnicornis* Hahn.) ib.

Plagiognathus Fieb.

152. *P. viridulus* Fall. Казань; Оренбургъ (Еvm).

Agalliastes Fieb.

153. *A. pulicarius* Fall. (*Phytocoris saliens* Wolff). Казань, Поводъвичье (между Симбирскомъ и Сызранью).

Comaronotus Fieb.

154. *C. clavatus* L. Казань, Оренб. (Evm).

Phylus Fieb.

155. *Ph. coryli* L. (*Ph. pallipes* Hahn.) Казань.

Placochilus Fieb.

156. *P. seladonicus* Fall. Казань.

Macrocolens Fieb.

157. *M. mollucilus* Fall. Казань; Оренбургъ (Evm).

Systellonotus Fieb.

158. *S. triguttatus* L. Оренбургская губернія (Evm).

Fam. XIX MACROPELTIDAE.

Sastragala Am. et Serv.

✓ 159. *S. ferrugator* Fab. (*Cimex bispinus* Pz.) Казань, Буинскъ, Симбирскъ, Карсунъ; Оренбургъ (Evm).

Acanthosoma Curt.

✓ 160. *A. haemorrhoidalis* L. Казань; Сарепта (*Becker: Bull. des Nat. de Moscou, 1858. N° 3*).

Elasmostethus Fieb.

✓ 161. *E. griseus* L. (*Acanthosoma agathinus* Fab.) Казань, — очень частъ осенью; Саратовъ; — Оренбургъ (Evm).

✓ 162. *E. Fieberi* m.

E. nigricornis, punctiventris, connexivum flavum.

Видъ этотъ нѣсколько меньше предыдущаго: черныя точки покрывающія верхнюю сторону его тѣла и полунадкрылья, гораздо многочисленнѣе и крупнѣе чѣмъ у *E. griseus*, почему вся наружность *E. Fieberi* кажется темнѣе. Такія же точки покрываютъ и весь abdomen снизу, кромѣ средней, продольной его линіи, чего вовсе нѣтъ у *E. griseus*, брюшко котораго снизу совершенно гладкое. Вдоль головы проходятъ двѣ явственныя черныя линіи и вся она, кромѣ бу-

1865 Jakovlev Usk. Zap. Kazan. Univ., 1864, 7

горковъ, къ которымъ прикрѣпляются усики, усѣяна черными точками, что также составляетъ отличительную черту *E. Fieberi*: у *E. griseus* точки находятся только на верхней стороне головы. Усики совершенно черные, покрытые короткими волосками; у *E. griseus* они рыжіе и только послѣдній, пятый суставъ ихъ на концѣ черныи.—Первый суставъ хоботка блѣдно-бурый, остальные гораздо темнѣе. Пеперекъ scutellum проходитъ широкая, краснобурая полоса. Протогахъ покрытъ крупными черными точками, сливающимися на острыхъ плечевыхъ углахъ въ черныя пятна; только на средней линіи передней части протогахъ и по крайямъ его точекъ нѣтъ и части эти представляются узкими, желтовато-бѣлыми полосками. Всѣ части груди съ нижней поверхности точно также покрыты пунктиромъ. Полунадкрылья желтоватобурья, не имѣющія красноватаго оттѣнка, какъ у *E. griseus*. Membrana дымчатобурая. Connexivum желтаго цвѣта, съ черными пятнами на заднихъ углахъ брюшныхъ сегментовъ (у *E. griseus* — connexivum красный). Анальное отверстие свѣтлобуряго цвѣта. Ноги свѣтлобурья, tarsi темнобурья, почти черныя, тогда какъ у *E. griseus* — tibia зеленоватаго цвѣта, а tarsi красноватыя.

Въ Казани довольно частъ; одинъ экземпляръ въ моей коллекціи доставленъ мнѣ изъ Нижняго-Новгорода.

Piezodorus Fieb.

✓ 163. *P. Degeeri* Fieb.

✓ var. *α. alliaceus* (*Pentatoma alliaceum* Germ). Казань, Хвалыньскъ, Оренбургъ (Евм).

✓ var. *β. incarnatus* (*Cimex rufipennis* Deg.) Казань, Оренбургская губ. (Евм).

Tropicoris Hahn.

✓ 164. *T. rufipes* L. Казань, Буинскъ, Симбирскъ, Корсунь, Хвалыньскъ; Оренбургъ (Евм).

Eusarcoris Hahn.

✓ 165. *E. aeneus* Scop. (*Cimex perlatus* Fab). Астрахань; Оренбургъ (Евм).

✓ 166. *E. bipunctatus* Fab. Сарепта; Оренбургъ (Евм).

Mormidea Am. et Serv.

✓ 167. *M. bassarum* L. Обыкновен. въ губ. Казанской, Симбирской и Саратовской.

✓ 168. *M. nigricornis* Fab. ib. — Оренбургъ, Киргизскія степи, Кавказъ (Еум).

✓ 169. *M. Lynx* Fab. Камышинъ; Сарента (Becker: Bull. des Nat. de Moscou, 1858. N° 3). Оренбургъ (Еум).

Pentatoma Oliv.

✓ 170. *P. juniperinus* L. Казань.

Cimex L.

✓ 171. *C. vernalis* Wolff. Казань, Симбирскъ; очень частъ на *hyosciamus niger*, Хвалынецъ; Сарента (Becker: Bull. des Nat. de Moscou, 1858, N° 3.) Оренбургъ (Еум).

Strachia Hahn.

✓ 172. *S. festiva* L. Казань, Сызрань.

✓ 173. *S. ornata* L. обыкн. въ губ. Казанской, Симбирской и Саратовской. Въ Камышинъ — на *sysimbrium Sophia* и *erysimum spec.*, въ Хвалынецъ на *sysimbrium Loesellii*.

✓ 174. *S. picta* H. Sff. Хвалынецъ, Камышинъ; Кавказъ (Еум).

✓ 175. *S. dominula* Harr. Сарента (Еум) оч. рѣдокъ.

✓ 176. *S. oleracea* L. обыкнов. въ губерніяхъ Казанской, Симбирской и Саратовской, на разныхъ cruciferae.

Zicrona Am. et Serv.

✓ 177. *Z. coerulea* L. обыкнов. по всей средней и нижней Волгѣ, Кавказъ; Сергіевскъ (Еум).

Rhacognathus Fieb.

✓ 178. *Rh. punctatus* L. Казань.

Arma Hahn.

✓ 179. *A. custos* Fab. ib.

Picromerus Am. et Serv.

✓ 180. *P. bidens* L. Казань, Симбирскъ; Оренбургская губернія (Еум).

Podops Lap.

✓ 181. *P. inunctus* Fab. Казань (Еум).

Aelia Hahn.

✓ 182. *A. acuminata* L. обыкн. въ губ. Казан., Симбир., Саратов. и Оренб.

- ✓ 183. *A. Klugii* Hahn. Оренбург. губ. (Евм).
Platysolen Fieb.
- ✓ 184. *P. inflexus* Wolff. Казань. Сызрань; Сарепта (А. Becker); Оренбургъ, Кавказъ (Евм).
Sciocoris Fall.
- ✓ 185. *S. umbrinus* Wolff. Казань; Оренбургъ (Евм).
- ✓ 186. *S. Helfer* Fieb. (*S. griseus* Евм.) Оренбургъ (Евм).
Rhaphigaster Lap.
- ✓ 187. *Rh. griseus* Fab. Сарепта, оч. часть въ концѣ августа (А. Becker: *Rh. punctipennis*, Bull. des Nat. de Moscou, 1838, N° 3).

Fam. XX CYDNIDAE.

Brachypelta Am. et Serv.

- ✓ 188. *B. aterrima* Forst. (*Cimex tristis* Fab.) Камышинъ, встрѣчается колоніями подъ сухимъ навозомъ, въ степяхъ; Сарепта; Кавказъ (Евм).

Cydnus Fab.

189. *C. flavicornis* Fab. Оренбургъ (Евм).

Corimelaena Whit.

190. *C. scarabaeoides* L. Семіозерная пустынь, около Казани.

Schirus Am. et Serv.

191. *S. morio* L. Казань, Саратовъ, Камышинъ; Оренбургъ (Евм).

192. *S. biguttatus* L. Казань, Оренбургъ (Евм).

193. *S. dubius* Scop. Оренб. (Евм).

194. *S. bicolor* L. Казань.

Fam. XXI TETURAE.

Eurygaster Lab.

195. *E. maroccanus* Fab. Хвалынскъ; Оренбургъ (Евм).

196. *E. hottentotus* Fab. Саратовъ; Оренбургъ (Евм).

197. *E. maurus* Fab. var. *β picta*. Казань; Оренбургъ, Кавказъ (Евм).

✓ *Leprosoma* Bär.

- ✓ 198. *L. inconspicuum* Bär. Сарепта (*Bärensprung*: Berl. Entom. Zeitschr. 1859. стр. 336).

Graphosoma Lap.

- ✓ 199. *G. lineata* L. Обыкновен. въ губерн. Симбирской и Саратовской. Оренбургъ (Евм.).

Stiraspis Fieb.

- ✓ 200. *S. flavolineata* Fab. Сарепта; Оренбургъ (Евм.).

Acrodax Fie..

- ✓ 201. *A. Galii* Wolff. Сарепта (*A. Becker*: Bull. des Nat. de Moscou, 1858. N° 3.)

Ancyrosoma Am. et Serv.

- ✓ 202. *A. albolineata* Fab. Оренб. (Евм.).

Psacasta Germ.

203. *P. Allioni* Gmel. (*P. pedemontana* Fab.). Камышинъ, на *euphorbia* spec.; Сарепта (Евм. и *A. Becker*: Bull. des Nat. de Moscou, 1858. N° 3).

204. *P. neglecta* H. Sff. Камышинъ; Оренбургъ (Евм.).

Odontotarsus Lap.

205. *O. grammicus* L. Хвалыинскъ; Сарепта (*A. Becker*); Оренбургъ (Евм.).

Odontoscelis Lap.

206. *O. fuliginosus* L. Сарепта; Оренбургъ (Евм.).

Fam. XXII ARTHROPTERIDAE.

Coptosoma Lap.

207. *C. globus* Fab. Казань, Симбирскъ, Хвалыинскъ; Сарепта (*A. Becker*: Bull. des Nat. de Moscou, 1858. N° 3).— Оренбургъ, Кавказъ (Евм.).