

Description of new bugs of the
Russian fauna

on computer

catalogued

*

ОПИСАНИЕ

НОВЫХ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ РУССКОЙ ФАУНЫ.

4. Eusarcoris Putoni n. sp. Der ganze Kopf, ein vier-eckiger Fleck in jedem Halswinkel des Pronotum, Schulterecke und die Bruststücke metallisch kupferroth. Oberseite mit metallischem Glanz. Rücken schwarz, mit gelblichem Mittelstreif; Connexivum schwarz, mit weisslichen Flecken. Bauchmitte mit dreieckigem, metallischschwarzem Fleck, und ein schwarzer Streif an der Seite. Bauchgrund, Bauchschiene 5 und Spiracula schwarz. Hinterleibrand weisslich mit schwarzem Fleck. Fühler hellbräunlich, abstehend weissbehaart, Glied 1, 2 und 3 von unten mit schwärzlichem Strich; Glied 3 doppelt länger als Fühlerwurzel, Glied 2 wenig kürzer als 3. Pronotum mit weisslichem, durchlaufendem Mittelkiel; Seitenrand des Pronotum weiss, kielförmig, vorn. Schulterecke spitz. Schildgrundwinkel schwarz die kallosen Knoten klein, weiss. Membran bräunlich, mit sechs Rippen. Beine bräunlichgelb, schwarz punctirt; Schenkelende mit schwarzem Ring; Schienbeinende und Fussglieder braun. L. 10 mm.

Эта форма по своему *habitus* весьма напоминает *E. asneus* в значительно увеличенном видѣ; именно длина *E. asneus* до конца перепонки равняется 6—7 миллим., а ширина, взятая между плечевыми углами — $4\frac{1}{2}$ — 5 мм., тогда какъ *E. Putoni* достигаетъ 10 мм. в длину и 7 мм. в ширину.

Голова, большія два пятна в передней части передне-спинки, плечевые углы с верхней и нижней стороны, боковые части груди — металлическия, темнаго мѣднокраснаго цвѣта; кромѣ того металлическій оттѣнокъ замѣтенъ болѣе или менѣе на всей наружной поверхности наськомаго, а также на темныхъ полоскахъ брюшка. Усики (у моего экземпляра не достаетъ 4 и 5 суставовъ) — по относительной длинѣ суставовъ отличаются отъ остальныхъ видовъ *Eusarcoris*; именно 3 суставъ у описываемаго вида вдвое длиннѣе перваго и нѣсколько длиннѣе втораго тогда какъ у рода *Eusarcoris* вообще третій суставъ такъ коротокъ, что равенъ по длинѣ лишь первому и значительно короче втораго. Впрочемъ, кромѣ отличія в длинѣ суставовъ усиковъ, я не нашелъ болѣе такихъ рѣзкихъ признаковъ, основываясь на которыхъ, можно было бы отнести описываемый видъ къ особому роду. Усики свѣтлобуроватые, покрытые бѣловатыми стоячими волосками; вершины всѣхъ суставовъ, а равно полоска на нижней сторонѣ — темнобурая. Переднеспинка впереди сильно суженная, вслѣдствіе глубокихъ выемокъ съ боковъ; передняя сторона глубоко вырѣзана для помѣщенія головы; шейные углы плотно прилегаютъ къ глазамъ; плечевые углы весьма вытянутые, острые; боковой кантъ бѣлаго цвѣта широкій, короткій, идущій отъ шейнаго угла только до расширенной части переднеспинки; вдоль послѣдней идетъ замѣтное, возвышенное ребро, в передней своей части бѣлаго цвѣта. Основные углы щитка черные, съ небольшимъ голымъ бугоркомъ бѣлаго цвѣта, такой же бугорокъ помѣщается у основанія щитка, по срединѣ; передъ концомъ щитка, по бокамъ его, замѣтны два темныхъ, пологувальныхъ пятна; какъ щитокъ, такъ и переднеспинка покрыты частымъ и глубокимъ пунктиромъ, отдѣльныя точки котораго соединяются поперечными морщинами в короткіе, неправильные, пересѣкающіеся ряды. Перепонка, выдающаяся надъ брюшкомъ, съ шестью буроватыми ребрами, изъ коихъ

нѣкоторыя съ отростками. Брюшко сверху черное, пятый сегментъ по заднему краю отороченъ широкой желтовато-белой; такого же цвѣта полоска идетъ вдоль всего брюшка по средней его линіи. *Connexivum* черного цвѣта; по срединѣ каждаго сегмента, ближе къ верхнему углу, находится полукруглое бѣловатое пятно. Брюшко снизу очень выпуклое съ тремя буровато-черными полосками, отливающимися слабымъ металлическимъ блескомъ, первый сегментъ брюшка, такъ какъ и пятый, почти сплошь черного цвѣта, кромѣ боковыхъ краевъ; брюшко, за исключеніемъ средины, покрыто грубыми пунктиромъ, точки котораго на свѣтлыхъ частяхъ брюшка буроватыя; дыхальца черныя; боковые края брюшка бѣлыя съ черными пятнами во внѣшнихъ углахъ сегментовъ. Ноги буровато-желтыя, покрытыя черными точками; передъ концомъ бедра задней пары — черное кольцо; на двухъ переднихъ парахъ кольца неполныя, въ видѣ болѣе или менѣе развитыхъ пятенъ на передней сторонѣ бедра; концы голеней и всѣ суставы лапокъ, также какъ и кончики ногтей — буровато-бѣлыя. Второй суставъ хоботка вдвое длиннѣе перваго, третий и четвертый коротки, каждый короче 2-го; послѣдній изъ нихъ черного цвѣта.

Одинъ экземпляръ этого вида былъ полученъ мною, черезъ посредство С. М. Сольскаго, изъ окрестностей Алабугина, на Амурѣ.

Macrorhamphus n. g. Körper gestreckt, länglich. Kopf sehr gross, gestreckt, fünfeckig. Schnabel die dritte Bauchschiene erreichend; Schnabelwurzel so lang als der Unterkopf; Glied 2 und 3 die längsten. Fühlerwurzel halb so lang als der Kopf. Glied 2 an $2\frac{1}{2}$ Mal länger als 1, Glied 3 an $\frac{3}{4}$ von 2. Glied 4 spindelig, so lang als 3. Augen gross, vorstehend, vom Pronotum entfernt. Pronotum trapezförmig, so lang als breit, vorn verschmälert und mit zwei querliegenden S-förmigen Furchen. Schild kurz, stumpf. Vorderschenkel nicht stark

mit zwei grossen, voran mit zwei kleineren Stacheln. Hinterfüsswurzel so lang als Glied 2 und 3 zusammen. Bauchschiene in tiefer Rinne. Membran mit vier Rippen, die zwei inneren am Ende zu einer Zelle verbunden.

Родъ этотъ относится къ группѣ *hyacodae* и по своимъ признакамъ долженъ стоять рядомъ съ р. *Caenocoris*.

Головка очень большая, равная длиною переднеспинкѣ; ширина головы, взятая съ глазами вмѣстѣ, на $\frac{1}{4}$ часть короче своей длины. Глаза большіе, выпуклые, почти полушарообразной формы, нѣсколько отстоящіе отъ края переднеспинки. На затылкѣ, вдоль внутренняго края глаза проходитъ линейная бороздка. Конечъ носа вытянутый. Усики умѣренной длины, первый суставъ на половину короче головы и не выдается впередъ носомъ, такъ что вершины его и конечъ носа приходится на одной линіи. Второй суставъ усиковъ, также и третий, — тонкій, въ два съ половиною раза длиннѣе перваго; четвертый на $\frac{1}{4}$ короче втораго; послѣдній суставъ веретенообразный, равный по длинѣ третьему. Хоботокъ весьма длинный, достигающій почти до половины третьяго брюшнаго кольца; первый суставъ его равенъ длиною головѣ, 2 и 3 по длинѣ между собою равны и каждый изъ нихъ въ полтора раза длиннѣе перваго. Переднеспинка трапециoidalной формы, впереди значительно суженная; въ передней ея части находятся парныя углубленныя бороздки, въ видѣ буквы S (какъ и у всей группы *hyacodae*). Щитокъ короткій, тупой, шишковозакругленный на концѣ; боковой его край короче основнаго. Перепонка съ 4 ребрами, изъ которыхъ два первыхъ, внутреннихъ образуютъ въ основаніи своемъ замкнутую клітку. Бедра переднихъ паръ слабо утолщены; съ нижней стороны ихъ, по внутреннему краю, расположены два сильныхъ, острыхъ шипа, въ некоторомъ разстояніи другъ отъ друга; между первымъ шипомъ и вершиной бедра сидятъ еще два небольшихъ, острыхъ зубца. Первый суставъ лапокъ задней пары равенъ по дли-

нѣ остальнымъ двумъ суставамъ. Первые два кольца брюшной полости имеютъ продольную, широкую, но неглубокую бороздку.

Признаки этого рода очень сходны съ признаками *Caenocoris*, но первый легко отличается отъ послѣдняго своею большою головою и болѣе сильнымъ вооруженіемъ передней пары ногъ.

2. *M. Caucasicus* n. sp. Ganz schmutziggelblich, fein absehend weiss behaart. Kopf, Halbdecken und Hinterleib braunröthlich. Pronotum hinten zerstreut punctirt. Kopf im Nacken und unten, Schild am Grunde, und Bruststücke — schwarz. Membran bräunlich. Schenkel schmutziggelb, am Ende bräunlich. ♂ 6 1/2 — 7 mm.

Туловище сверху и надкрылья покрыты довольно густо весьма нѣжными, стоячими волосками — бѣловатаго цвѣта. Все насѣкомое сверху грязно-желтоватаго цвѣта, надкрылья съ красноватымъ оттѣнкомъ, а ноги — нечисто-бѣлаго цвѣта. Усики свѣтло-рыжіе, вершина основнаго сустава и весь слѣдній буроватые. Голова красновато-рыжая, бока ея изогномъ глазъ и продольная окологлазная бороздка — черныя. Глаза вишнево-чернаго цвѣта. Переднеспинка свѣтлая, желтовато-бѣлая, въ задней своей части слегка возвышенная и покрытая довольно сильнымъ пунктиромъ, точки котораго неправильной формы, не глубоки и рѣдко раскиданы; передняя часть переднеспинки и поперечныя, изогнутыя бороздки на ней также красновато-рыжаго цвѣта, какъ и голова; вдоль всей переднеспинки, по ея срединной линіи идетъ полоска чернаго цвѣта; такого же цвѣта полоска идетъ и по заднему краю *pronotum'a*. Въ основаніи щитка помѣщается черное, трехугольное пятно. Надкрылья въ передней своей части грязновато-желтаго цвѣта, въ задней же половинѣ, особенно ближе къ перепонкѣ, принимаютъ красноватый оттѣнокъ. Перепонка свѣтло-бурая, съ слабымъ металлическимъ отливомъ и многочисленными поперечными, неправильными

бороздками, между ребрами. Хоботокъ свѣтло-рыжеватый, послѣдній суставъ его темнобурый. Голова снизу, средне- и переднегрудь, окранны первыхъ трехъ брюшныхъ сегментовъ — бѣлаго цвѣта. Брюшко красновато-рыжее, *connexivum* свѣтло-бѣлое, съ темными пятнами въ заднихъ углахъ. Ноги грязно-желтовато-желтыя, конецъ бедеръ съ буроватыми, широкими пятнами, когтевой суставъ лапокъ — бурогаго цвѣта. Дл. 6 1/2 — 7 мм. (♂). Дербентъ (Христофъ).

Судя по неопредѣленнымъ и слабо-выраженнымъ цвѣтамъ описываемаго вида, можно предположить, что я имѣлъ дѣло съ экземплярами не вполне зрѣлыми.

Stenocarenum n. g. Körper länglich, gestreckt, kahl. Kopf schmal, viel länger als im Nacken breit. Augen ziemlich gross, halbkugelig, dem Pronotum anliegend. Schnabelwurzel fast so lang als der Kopf, Glied 4 das Ende der Mittelbrust erreichend. Fühler stark, Wurzelglied mit seiner Hälfte den Kopf überragend; Glied 2 über 2 1/4 mal länger als 1, Glied 3 an 4/5 von 2, Glied 4 gleichlang dem 3. Pronotum schmal, trapezförmig, sehr gestreckt (doppelt so lang als breit), vorn wenig verjüngt, hinten kaum niedergedrückt. Pronotum-Seiten fein geschweift, mit stumpfem Kiel. Schild lang, spitzig. Halbdecken nicht vollkommen, mit rudimentärer Membran. Vorderschenkel sehr stark, breit, mit drei grossen, voran mit einigen kleineren Stacheln. Vorderschienbeine 2/3 des Schenkels lang, bogig. Hinterfusswurzel fast zweimal länger als Glied 2 und 3 zusammen.

Описываемый родъ принадлежитъ къ группѣ *Megalonotidae*. Туловище длинное, вытянутое, снабженное массивными усиками и весьма толстыми, расширенными бедрами передней пары ногъ. Голова сравнительно небольшая, узкая, съ сильно выдающимся носомъ. Глаза довольно крупные, выпуклые, полушаровидной формы, прилегающіе къ шейному углу переднеспинки; простые глазки (*ocelli*) весьма малые. Усики

большіе, массивныя; первый суставъ ихъ на половину короче головы, но значительно выдается передъ носомъ; второй суставъ, постепенно утолщающійся къ вершинѣ, почти вдвое болѣе, чѣмъ вдвое длиннѣе перваго; третій — та же формы какъ второй, едва его короче, а послѣдній вершиннообразный, почти равный по длинѣ третьему. Вершины 1 и 3 суставовъ съ внутренней стороны оканчиваются пучкомъ щетинокъ. Хоботокъ короткий, едва достигающій до средины груди; первый суставъ его почти равный по длинѣ 2 и 3 съ отдѣльности, едва короче головы и толще прочихъ; послѣдній суставъ почти на половину короче третьяго. Передняя спинка узкая и весьма удлиненная, вдвое длиннѣе головы; впереди сужена и закруглена, а въ задней части, между плечевыми углами, незначительно расширена; боковые края ея слегка выпуклы, а передъ плечевыми углами находится пологая выемка. Задній край дугообразно вырѣзанъ, причемъ возвышенные плечевые углы нѣсколько прикрываютъ основанія надкрыльевъ. Передній край прямой, ограниченъ неяснымъ кантомъ. Боковой край также обведенъ тупымъ ребромъ, совершенно незамѣтнымъ, если смотрѣть сверху. Съ нижней же стороны отдѣленнымъ линейной бороздой. Длина переднеспинки вдвое превышаетъ ея ширину; задняя четверть ея слегка придавлена и пунктирована, передняя же большая доля — представляетъ незначительную выпуклость. Щитокъ длинный, узкій, заостренный; боковой край его въ полтора раза длиннѣе основнаго. Надкрылья съ усюродченною перепонкою; вдоль *clavus* проходитъ до пяти правильныхъ рядовъ точекъ; на *corium* правильные ряды точекъ идутъ только по сторонамъ внутренняго ребра, въ остальныхъ же мѣстахъ, особенно передъ перепонкой, точки расположены безъ всякаго порядка; вдоль главнаго ребра, замѣтнаго только до половины длины *corium*, съ верхней стороны, также идетъ рядъ точекъ; край *corium*'а въ задней половинѣ гладкій. Перепонка недоразвита, неясно разграни-

чена отъ *corium*. Бедра передней пары ногъ чрезвычайно массивныя и съ нижней стороны сильно вооруженныя; по внутреннему краю ихъ проходитъ цѣлый рядъ зубчиковъ различной величины, именно: у вершины бедра расположено шесть мелкихъ, острыхъ зубчиковъ въ видѣ гребня, тотъ же за ними сидитъ длинный, острый шипъ, затѣмъ два въ равномъ разстояніи другъ отъ друга, помѣщаются два шипа, каждый на половину короче предъидущаго; затѣмъ того сзади перваго длиннаго шипа сидитъ еще небольшая зубчикъ. Голени переднихъ ногъ гладкія, сильно сужены и къ концу значительно расширяющіяся. Первый суставъ лапокъ задней пары ногъ въ полтора раза длиннѣе остальныхъ двухъ суставовъ.

3. *S. vulsus* n. sp. Körper schwarz, matt, kahl. Tylus, Schabel und Beine bräunlich gelb. Halbdecken braunroth mit schwarzem viereckigem Fleck im Innenwinkel des Corium. Fühler schwarz, Fühlerwurzel und Endglied — bräunlich, Glied 2 und 3 dicht, fein behaart. L. 7½ mm. (♂)

Голова и все туловище матовочернаго цвѣта; конецъ хобота, хоботокъ (кроме послѣдняго сустава) и ноги рыжевато-бурнаго цвѣта; надкрылья красноватобурныя; вдоль *clavus* заметна черта чернаго цвѣта; черное же круговое пятнышко находится въ углу между главнымъ и внутреннимъ ребрами и наконецъ большое четырехугольное пятно такого же цвѣта находится во внутреннемъ углу надкрыльевъ. Основной суставъ усиковъ — бурый, съ нижней стороны рыжий, 2 и 3 суставы черные, густо покрыты весьма нѣжными буроватыми волосками; послѣдній суставъ рыжеватый, съ чернымъ основаниемъ, покрытый длинными тонкими волосками желтоватаго цвѣта. Видъ этотъ найденъ около Дербента г. Беккеромъ.

Drymocois n. g. Körper länglichoval. Kopf klein, so lang als breit. Wangenplatten sehr klein, vorn. Fühlerwurzel so lang

als der Kopf, mit der Hälfte denselben überragend; Glied 2 doppelt länger als 1, Glied 3 gleichlang mit 4. Schnabel bis zum Ende der Mittelbrust reichend; Schnabelwurzel wenig länger als der Kopf. Augen halbkugelig, vorstehend. Pronotum trapezförmig, breiter als lang; der Seitenrand leicht geschweift, mit 2-3 lichen, blattartigem Kiele. Pronotum-Mitte querüber eingedrückt. Membran mit vier Rippen. Vorderschenkel unbewehrt mit zwei Borsten an der unteren Kante. Hinterfusswurzel länger als Glied 2 und 3 zusammen.

Голова небольшая, почти в половину короче переднеспинки; ширина ее, взятая вмѣстѣ съ глазами, равна длине. Усики длинные, волосистые; первый сустав почти равен по длине — головѣ и на половину выдается перед концом носа; второй сустав вдвое длиннѣе первого, 3 и 4 суставы равной длины, каждый изъ нихъ на $\frac{1}{5}$ часть короче второго; вообще суставы усиковъ тонкіе, цилиндрическіе, къ вершинѣ слабо расширяющіеся, кромѣ послѣднихъ, который веретенообразный. Хоботокъ тонкій, саблевидно изогнутый, достигающій до заднегруди; первый сустав его равенъ длиной головѣ, второй длиннѣе прочихъ, третій равенъ первому. *Visculae* очень короткіе, сидящіе впереди. Глаза выпуклые, полушаровидные, нѣсколько отстоящіе отъ задняго края переднеспинки. Послѣдняя трапециoidalной формы, нѣсколько болѣе развитая въ ширину, чѣмъ въ длину; передній край ее уже задняго, глубоковыемчатый; задній край почти прямой, у плечевыхъ угловъ широко закругленный и значительно вздутый; боковые края съ узкой, листоватой вырочкой, слегка вогнутые по срединѣ и закругляющіеся впереди. Переднія двѣ трети переднеспинки выпуклы, съ слабымъ углубленіемъ на срединной линіи, задняя треть почти плоскнутая, грубо пунктирована и отдѣлена отъ переднихъ доли широкой, но не очень рѣзкой бороздкой. Щитокъ длинный, заостренный, боковой край его прямой и едва длиннѣе

головы; основаніе щитка возвышено и ограничено съ боковъ ребрами, которыя сливаются по срединѣ въ одно сильное ребро, доходящее до острей щитка. Надкрылья вполне развиты, перепонка небольшая, у ♀ короче брюшка, съ развитыми ребрами, изъ которыхъ два крайніе слабо выражены. Нижняя часть груди покрыта сильными, рѣдкими точками; щитокъ довольно толстое, вздутое. Ноги длинныя; бедра переднихъ пары слабо утолщенные и невооруженныя зубцами; на среднемъ концѣ ихъ съ нижней стороны находятся только двѣ длинныя щетинки, сидящія на возвышенномъ основаніи. Третьи переднихъ ногъ прямыя, къ концу слабо расширяющіяся. Лапки задней пары ногъ длинныя: первый сустав почти вдвое длиннѣе остальныхъ двухъ.

D. gibbosus n. sp. Kopf, Pronotum und Schild dunkelbraun, glänzend und sehr zerstreut borstig behaart; Halbdecken auf Unterseite matt. Randkiel des Pronotum, Beine, Fühler, Vorder- und Hinterbrust und Halbdecken — hellbraun; Hinterleib röthlichbraun. Membran rauchbraun, Rippen bisweilen schmutziggelblich. Pronotum vorn mehr gewölbt, hinten grob punctirt. Brust und Schild ebenso punctirt. Halbdecken-Rand fein absteht behaart. $4\frac{1}{2}$ —5 mm. (♀)

Голова, переднеспинка и щитокъ блестящіе, покрыты длинными, очень нѣжными щетинками, весьма рѣдко разбросанными. Надкрылья и нижняя сторона туловища — матовыя. Голова и туловище темнубураго цвѣта, брюшко съ красноватымъ оттѣнкомъ; усики, хоботокъ, ноги, надкрылья, вилы и боковые края переднеспинки, а также окраины и края щитка — свѣтлобурыя. Перепонка сплошь дымчатаго цвѣта съ выпуклыми ребрами, которыя бываютъ иногда свѣтлѣе матоваго цвѣта; края надкрыльевъ оторочены рядомъ очень длинныхъ, короткихъ щетинокъ. Наиболѣе крупный пунктиръ находится на задней части переднеспинки, только выпуклые углы и очень узкая полоска по заднему краю

свободны от точек; самыя точки пунктира имѣютъ глубокихъ, продольныхъ черточекъ. Части груди снизу покрыты точками, нѣсколько рѣже расположенными, глубокими и обыкновенной формы. Очень грубый пунктир находится также по бокамъ щитка, особенно къ его только высокое и острое ребро щитка совершенно возвышенная, основная часть щитка покрыта болѣе нѣжными и рѣдкими точками. Вдоль *clavus* и *corium* идетъ по правильныхъ рядовъ точекъ; главное ребро очень идетъ близко къ боковому краю, который совершенно Вдоль надкрыльевъ также проходитъ гладкая полоска, расширяющаяся книзу, которая нѣсколько темнѣе общаго тѣла. Голени покрыты очень нѣжными волосками и того имѣютъ съ внутренней стороны рядъ рѣдкихъ щетинка. Самецъ неизвѣстенъ, ♀ достигаетъ 4½ — 5 мм. Два экземпляра этого вида было открыто С. М. Сольскимъ въ Лукомскомъ уѣздѣ, С.-Петербургской губернии.

5. *Poeciloscytus intermedius* n. sp. Blassgrünlichgelb, silberweiss behaart. Fühler rötlich, Wurzelglied am Grunde am Ende mit schwarzem Ring. Kopf, vier Streifen auf dem Pronotum, Schild, Mitte der Vorder- und Mittelbrust schwarz, zwei Fleckchen vorn am Kopfe, Tylus und Schildspitze gelb. Halbdecken bräunlichgelb, Randlinie des Corium schwärzlich. Im Clavus drei, am Coriumende zwei Streifen bräunlich. Cuneus blutroth, am Rande schwarz; Grund und Spitze gelblich. Rücken grünlich, Basis schwarz. Beine bräunlichgelb, Schenkel unterseits braunlichgelb, Schienbeine am Grunde bräunlich; Schienbeinende, Klauen und Dorne — schwarz. L. 4 mm. (♂).

Все насекомое блѣднаго зеленоватожелтаго цвѣта съ чернымъ рисункомъ. Голова чернаго цвѣта, два большихъ полуовальныхъ пятна около глазъ, два другихъ въ переднихъ части головы и конецъ носа свѣтложелтые; усики красные, первый суставъ у основанія имѣетъ черное пятно, въ

съ внутренней стороны продолжается иногда въ полоску, переходящую до вершины сустава, которая имѣетъ снизу также такое пятно въ видѣ полукольца. Первые два сустава холчатые — зеленоватые, третій рыжеватый, четвертый весь и основаніе третьяго — чернаго цвѣта. Переднеспинка зеленоватожелтая съ четырьмя черными, продольными полосами, не доходящими до задняго края; одна пара полосъ идетъ по боковымъ краямъ переднеспинки, постепенно расширяясь къ плечевымъ угламъ; вторая, внутренняя пара полосъ лежитъ по сторонамъ средней линіи. Щитокъ черный, конецъ его желтый (какъ у *P. cognatus*). Надкрылья буровато-желтыя, наружная линія желтоватая; окраины *clavus* и одна полоска вдоль его — буроваго цвѣта; такія же двѣ полоски находятся въ задней части *corium*; основаніе и конецъ *cuneus* желтоватые, между ними заняты кроваво-краснымъ пятномъ трехугольной формы съ округленными концами; наружный край *cuneus* буроваго цвѣта. Перепонка свѣтлая, прозрачная, ребра ея желтыя; внутри большой, мембранальной клѣтки помещается кольцо буроваго цвѣта; такое же кольцо окружаетъ всю клѣтку и съ наружной стороны; въ малой клѣткѣ средняя буроватая. Спина зеленоватая, кромѣ предпоследняго сустава, который чернаго цвѣта. Брюшко снизу и части груди съ боковъ однообразнаго зеленовато-желтаго цвѣта; средняя переднегруди и особенно среднегруди — чернаго цвѣта. Ноги буровато-желтыя, къ основанію свѣтлѣе; на бедрахъ, съ нижней ихъ стороны, расположены въ два ряда бурныя точки; у вершины бедръ онѣ сосредоточены гуще, не имѣютъ никакой правильности и образуютъ пятно въ видѣ полукольца; голени у основанія имѣютъ иногда буроватое пятно снизу, или кольцо; конечный край голеней, также какъ и когтевой суставъ лапокъ чернаго цвѣта; шипики, находящіеся на голенихъ — черные, не имѣющие у основанія темныхъ точекъ, или пятнышекъ. Туловище сверху и снизу покрыто серебристыми, прилегающими волосками; кромѣ того на

задней части *corium* и на вершинѣ бедръ находятся темнобурые волоски.

Экземпляръ этого вида былъ найденъ въ Хвалынскомъ уѣздѣ, Саратовской губерніи. *P. intermedius* относится къ той группѣ, къ которой принадлежатъ *P. vulneratus* Westw. и *P. cognatus* Fieb. и по своимъ признакамъ долженъ считаться какъ разъ между ними.

6. *Agalliaster lucidus* n. sp. Bleich orangegelb, mit schwarzen braunen Borsten und gelblichem Schuppenhaar bekleidet. Halbedecken weisslich, fast durchsichtig, Membran bleich bräunlich. Zellrippen und Zellen weisslich. Fühler bleichgelblich, Fühlerglied 2 am Grunde, Glied 1 oben schwarz. Schenkel, besonders die hinteren, unterseits dicht schwarz gefleckt; Schienbeine oberseits mit einer Reihe schwarzer Punkte mit schwarzen Borsten. L. 2¹/₂ mm.

Весь однообразнаго блѣдно-желтоватаго цвѣта, съ слабымъ оранжевымъ оттѣнкомъ; надкрылья полупрозрачныя, бѣловатыя, перепонка блѣдно-буроватая; ребра ея вѣтвистыя, равно какъ и пространство, заключенное въ нихъ — свѣтлыя. Вся наружная сторона покрыта двумя родами волосковъ: одними, прилегающими, свѣтло-шелковистыми, въ видѣ чешуекъ; другими — весьма нѣжными стоячими — темно-бурого цвѣта. Глаза крупныя, темно-краснаго цвѣта. Усики блѣдножелтоватые, основаніе втораго сустава и пятно на первомъ — чернаго цвѣта. На бедрахъ, особенно заднихъ, съ нижней ихъ стороны, расположены ряды крупныхъ черныхъ точекъ; такія же точки находятся и на наружной сторонѣ голени; точки эти несутъ ряды черныхъ длинныхъ шпиль.

Описываемый видъ стоитъ ближе всего къ *A. verbasci* H. Sff., отличаясь отъ него однообразнымъ цвѣтомъ тучища и полупрозрачными, безцвѣтными надкрыльями. У *A. verbasci* — нижняя сторона тучища чернаго цвѣта, а надкрылья имѣютъ буроватыя пятна. Одинъ экземпляръ этого

вида найденъ г. Христофомъ въ Казумкентѣ (на Кавказѣ).

Salda halophila n. sp. Kopf schwarz, sehr fein silberbehaart. Fühler weisslich, Glied 1 und 2 unterseits mit schwarzem Strich, Glied 3 und 4 ganz bräunlich. Pronotum quer reifenförmig, breiter als in der Mitte, lang, schwarz, glänzend. Halbedecken weiss, die Zeichnung nach hinten erweitert. Membran schwarz, am Grunde matt. Halbedecken grob punctirt, Membran schwarz, fein behaart; Corium und Clavus schwarz, Ende weiss; Clavus im Randfelde am Grunde und ein Fleck im Innenwinkel weisslich. Beine schmutzigweiss. L. 4—4¹/₂ mm. ♂, 5 m. ♀.

Видъ этотъ принадлежитъ къ немногочисленной группѣ, въ которой боковыя стороны переднеспинки бѣлаго цвѣта. По своему волосистой наружности видъ этотъ походитъ на *S. fallax* Fall., встрѣчающійся въ Швеціи и Германіи, но отличается отъ него нѣкоторыми особенностями.

Голова сверху и снизу чернаго цвѣта, покрытая весьма длинными, серебристыми волосками; между сложными и простыми глазами помѣщается круглое, выпуклое бѣлое пятнышко, съ длинной черной щетинкой; пара бѣлыхъ бугорковъ съ такой же щетинкой находится еще на лбу, между передними краями глазъ. Конечъ носа (*tylus*) и двѣ пары бугорковъ, сидящихъ передъ глазами и между усиками — бѣловатые. Хоботокъ, за исключеніемъ перваго сустава, черный. Голени желтовато-бѣлые, послѣдніе два сустава буроватые; 1 и 2 суставы имѣютъ снизу черную продольную полосу. Усики, кромѣ втораго сустава, покрыты длинными, очень слабо раскиданными щетинками. (Цвѣтъ головы и ея придатковъ очень постояненъ и остается неизмѣняемымъ у всѣхъ разновидностей.) Переднеспинка блестящаго чернаго цвѣта, желтоватая; боковыя края ея бѣлые; бѣлый цвѣтъ иногда проникаетъ узкимъ ободкомъ по краю переднеспинки, чаще же расширяется передъ плечевымъ угломъ въ большое трехуголь-

ное пятно. Щитокъ черного цвѣта, основная широкая половина — матовая, отъ весьма мелкаго, струйчатого пунктира, а конечная доля гладкая, блестящая; у свѣтлыхъ экземпляровъ вся эта половина щитка бываетъ часто бѣлаго цвѣта, кромѣ острея, которое остается чернымъ. Надкрылья покрыты сплошь грубымъ, частымъ пунктиромъ, особенно развитымъ на *clavus* и черными, прилегающими волосками. Надкрылья черного цвѣта; широкая бѣлая полоса идетъ по боковому краю нѣсколько далѣе половины надкрыльевъ; конецъ *clavus*, круглое пятнышко во внутреннемъ углу надкрылевъ и большое пятно на концѣ *corium* — бѣлаго цвѣта. Иногда надкрылья вмѣстѣ съ перепонкой бываютъ сплошь грязновато-бѣлаго цвѣта и тогда пунктиръ на нихъ гораздо нѣжнѣе; между надкрыльями черного и бѣлаго цвѣта встречаются всевозможные переходы. Туловище снизу черного цвѣта; передній и задній край переднегруди, окраины брюшныхъ колець и послѣдній генитальный сегментъ брюшка — бѣлаго цвѣта; у свѣтлыхъ экземпляровъ брюшко бываетъ почти сплошь молочно-бѣлаго цвѣта. Ноги грязновато-бѣлыя; бедра имѣютъ съ нижней стороны рядъ буроватыхъ точек; концы голеней и когтеваго сустава и рѣдкія щетинки, покрывающія голени двухъ заднихъ паръ ногъ — черного цвѣта; бедра густо покрыты короткими, бѣлыми волосками. Заднія голени изогнуты.

Найдены были мною во множествѣ на полуостровѣ Магншлякъ, по берегамъ соляныхъ озеръ. Около Бабу найдилъ этотъ видъ г. Христофъ.

8. *Nabis Reuteri* n. sp. Grauweissgelblich. Kopf unterseits Brust und Hinterleib schwarz; Vorderrand der Vorderbrust weissgelblich. Connexivum gelblich mit schwarzen Flecken. Fühler gelbbraunlich; Fühlerwurzel fast so lang als der Kopf, nur $1\frac{1}{2}$ Mal kürzer als Glied 2; Glied 3 gleichlang dem 2. Halbddecken den Hinterleib bedeutend überragend, vollkommen ausgebildet. L. 7 mm.

Принадлежитъ къ группѣ видовъ, имѣющихъ на *connexivum* черныя пятна, куда изъ формъ русской фауны относятся только *N. marginipunctatus* Jakowl. (*N. Sareptanus* Drn.). Продолговатоовальный, къ заду болѣе расширенный. Голова выпуклая, вытнута, немного короче переднеспинки, снизу черная, покрытая густымъ серебристымъ пухомъ; на головѣ сверху находится черное продолговатое пятно. Первый суставъ усиковъ длинный, едва короче головы и лишь на $\frac{1}{3}$ короче второго сустава, который равенъ третьему (у *N. marginipunctatus* — первый суставъ усиковъ короткий, на половину короче второго, который значительно длиннѣе третьяго; по этому признаку *N. marginipunctatus* и *N. Reuteri* — очень рѣзко отличаются между собою). Грудь, а также брюшко сверху и снизу черного цвѣта, кромѣ широкихъ окраинъ переднегруди, которые бѣловатаго цвѣта и послѣдняго генитальнаго сегмента брюшка, который буроватаго цвѣта. Усики односторонняго рыжевато-бурого цвѣта. Надкрылья гораздо длиннѣе брюшка; *connexivum* съ черными пятнами въ переднихъ углахъ сегментовъ, значительно выдается изъ подъ надкрыльевъ. Общій цвѣтъ поверхности насѣямаго какъ у *N. ferus*. Ноги сильныя, бедра передней пары съ рѣзкими поперечными черными полосками и пятнами; остальные ноги также покрыты черными пятнами, а конецъ бедра задней пары ногъ — имѣетъ темное кольцо. Конецъ послѣдняго сустава лапокъ и югти — черноватые. Самецъ неизвѣстенъ, равно какъ и форма съ укороченными надкрыльями. Длина до конца надкрыльевъ 7 мм.

Окрестности Албазина на Амурѣ. Одинъ экземпляръ этого вида полученъ мною черезъ посредство С. М. Сольскаго.

В. Яковлевъ.

Астрахань.
Апрѣль 1875.