

Bull. Ent. Soc. Mosc.
1876

on computer

1876

Bull. Soc. Imp. Nat. Moscow (1876 No. 3: 85-124) Author Card
Bull. Soc. Nat. Moscow 50-51 (3): 85-124
from Kerzhner

New bugs, Hemiptera Heteroptera, of the Russian fauna

НОВЫЯ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ

HEMIPTERA HETEROPTERA

РУССКОЙ ФЛАНЫ.

B. Яковлева. Jakovlev

Fam. Pentatomidae

Subfam. SCUTELLERIDAE.

✓ Dybowskyia n. gen.

Körper eirundlich, beiderseits hochgewölbt, kahl. Jochstücke des Kopfes lanzettlich, aneinanderliegend. Augen sehr klein. Kopf vorn etwas gekrümmmt; Kopfrand kielförmig. Schnabel an das dritte Hüftpaar reichend. Wangenplatten gerade, gleichbreit, so lang als der Kopf. Fühlerglieder dünn, Glied 1 und 2 zusammen nicht an das Kopfende reichend; Glied 2 länger als 1 und so lang als 3; Glied 4 sehr kurz, so lang als Glied 1; Endglied spindelig, so lang als Glied 3 und 4 zusammen. Schild breit, den ganzen Rücken deckend, hinter dem Buckel abgedacht; Grund gewölbt.

1

Туловище укороченоovalной формы, выпуклое какъ съ верхней, такъ и съ нижней стороны. Голова трехъугольная, узкая, длинная; конецъ поса очень короткий, скелетные отростки весьма длинные, вытянуты, боковой край головы передъ глазами сильно вырѣзанъ, такъ что острые бугорки сидятъ у основания усиковъ хорошо видны если глядѣть сверху. Весь боковой край головы окружено возвышеніемъ каптикомъ; конецъ скелетныхъ отростковъ нѣсколько загнутъ книзу. Глаза очень маленькие. Висцелы прямолинейные, сильные, во всю длину головы. Усики тонкіе, пѣжные, особенно 2 и 4 суставы; основной суставъ очень короткий и вмѣстѣ со вторымъ едва достигаетъ конца головы; второй нѣсколько длиннѣе первого и равенъ по длине третьему; четвертый тонкій и очень короткий, равный первому; пятый тоже прочнохъ, веретенообразный, равный по длине двумъ предпослѣднимъ суставамъ—вѣтымъ вмѣстѣ. Хоботокъ тонкій, достигающій до третьей пары ногъ. Передний край переднегруди безъ отростковъ. Переднеспинка кпереди съуженная, кзади довольно выпуклая, съ ширококруглыми боковыми углами, не шире брюшка; передний и боковые края сильно вырѣзаны; передний край гораздо шире головы, такъ что довольно острые, шейные углы далеко отстоятъ отъ края глазъ. Въ передней части переднеспинки находятся три возвышения образующихъ поперечный рядъ; одно изъ нихъ приходится по средней линіи, а два лежатъ по бокамъ, ближе къ шейнымъ угламъ; эти возвышения отдѣлены другъ отъ друга довольно глубокими впадинами; вдоль переднеспинки, по средней линіи идетъ очень пѣжное ребро, которое переходитъ на ея, не доходя до его конца. Щитокъ широкий, дощитокъ, не доходя до его конца. Щитокъ широкий, дощитокъ, не доходя до его конца.

ленивые, изъ подъ нихъ видны узкіе края сорium и connexivum. Передняя часть щитка отдѣлена бороздкой, образующей почти правильный полукругъ; на концахъ этой бороздки, у основныхъ угловъ щитка, находится глубокая впадина, къ внутреннему краю которой приымкаетъ голое возвышеніе (callus); средина щитка выпуклая, задняя половина его спускается довольно круто къ концу, въ видѣ крыши. Брюшко выпуклое. Ноги короткія, довольно толстые. (Болѣе подробного описанія—частей груди, крыльевъ и пр. дать невозможно, потому что въ моемъ распоряженіи находился только одинъ экземпляръ.)

По формѣ головы родъ этотъ напоминаетъ р. *Ancyrosoma*, а по образованію щитка родъ *Psacasta*.

✓ *D. ussurensis* n. sp.

Schwarzbraun, dicht grobpunctirt. Fühler schwarzbraun, Glied 2, 3 und 4 am Ende röthlich. Kopf, Vordertheil des Pronotum, Bauchmitte und Schenkel fast schwarz. Schild mit einzelnen braungelben Knötchen. Pronotum und Schild mit feiner braungelblicher durchlaufender Mittellinie. Connexivum röthlichbraun mit schwarzen Winkelstecken. Schenkelende, Schienbeine und Füsse gelbbraun, Spiracula schwarz. L. 5 mm. Ussuri.

Весь темнобурый, сильно и часто пунктированный, безволосый. Голова, углубленія въ передней части переднеспинки, средина брюшка и бедра почти черного цвета; узкая продольная линія на переднеспинкѣ и щиткѣ, callus, множество мелкихъ бугорковъ на щиткѣ и на бокахъ груди, а также двѣ широкихъ полоски по

бокамъ брюшка изъ нихъ одна — на краю — буровато-желтаго цвѣта. Connexivum красноватобурый съ черными пятнами въ основныхъ половинахъ сегментовъ; концы бедръ, голени и особенно лапки буроваторыжие. Дыхальца черныя. Усики темнобурые, концы втораго, третьаго и четвертаго суставовъ — красноватые. Длина 5 мм., ширина около 4 мм.

Уссури, подъ 48° с. ш. (Dr. Дыбовскій.)

Subfam. Pentatomidae.

✓*Neottiglossa metallica* n. sp.

Unterseite, Kopf, Vordertheil des Pronotum und Schild am Grunde metallisch schwarzviolet. Membran hell, fast durchsichtig, Kopf verlängert, nicht gekrümmmt. L. 5½ mm. Ussuri.

Видъ близкій къ *N. inflexa* Wolff и *N. obscura* Sahlb. Вся нижня сторона тулowiща, голова, передняя часть переднеспинки и широкое основание щитка черного цвѣта съ металлическимъ фиолетовымъ блескомъ. Голова вытянутая, почти прямая; пятно на затылкѣ, боковые края переднеспинки, два небольшихъ пятна въ передней ея части, продольная линія по ея срединѣ, большія вытанутыя внизъ callus въ углахъ щитка, основной край падкрыльевъ и узкая окраина брюшка снизу — гладкія, бѣлаго цвѣта. Перепонка полупрозрачная, безцвѣтная. Конецъ ноги согнутоокруглый и приходится на одной линіи съ концемъ щитка. Первый суставъ усиковъ рыжий, (остальныхъ въ моемъ экземпляре недостаетъ.) Форма щитка и ноги — какъ у *N. inflexa*. Дл. 5½ mm.

Отъ другихъ близкихъ видовъ, съ первого взгляда, отличается формою головы почти вытянутой прямо, тог-

да какъ вообще у рода *Neottiglossa* передняя часть головы круто загибается книзу и сильнымъ развитіемъ металлическаго блеска.

Уссури, подъ 48° с. ш. (Dr. В. Дыбовскій.)

✓*Homalogonia* n. gen.

Körper breitoval, kahl, grobpunctirt, Kopf breit, Kopfrand gerade, Stirnchwiele eingeschlossen. Wangenplatten liniensförmig, vorn spitzeckig. Schnabel schlankgliederig, an das Ende der Hinterbrust lang; Wurzelglied viel kürzer als der Kopf. Fühlerglieder schlank, lang; Wurzelglied dünn, nicht an den Kopf reichend, Glied 2 doppelt so lang als 1, Glied 3 und 4 gleichlang, jedes fast um $\frac{1}{3}$ länger als das vorherige. Endglied dünn, spindelig, länger als 4. Pronotum breit, Schulterecke stumpf, stark zugerundet. Mittelkiel der Mittelbrust an das Ende des Mittelxyphus reichend. Bauchschiene 2 mit stumpfem Höcker am Grunde.

Родъ этотъ долженъ стоять около р. *Carcocoris* Kti. Тулowiще широкоovalное, гладкое, покрытое сверху частымъ, сильнымъ пунктиромъ. Голова плоская, широкая; ширина ея въ затылкѣ значительно короче длины; боковые края почти прямые, слегка приподнятые кверху; скапловые отростки плоскоокруглые, длинные, длинище конца носа, который остается открытымъ. Висцулæ узкие, линейные, занимающіе двѣ трети головы; спереди они оканчиваются довольно сильнымъ зубцомъ, а сзади незамѣтно уничтожаются. Хоботокъ тонкий, достигасть почти конца заднегруди; первый суставъ его гораздо короче головы, такой же длины какъ и висци-

лаe, второй — самый длинный. Усики тонкие и очень длинные, гораздо длиннее головы и переднеспинки взятыхъ вмѣстѣ; первый суставъ ихъ тонкий, короткий, недостающій конца головы, второй вдвое его длиннѣе, третій и четвертый равны между собою и каждый изъ нихъ на одну треть длиннѣе втораго; послѣдній суставъ тонкий, веретенообразный, длиннѣе всѣхъ прочихъ и втрое длиннѣе первого. Форма головы и хоботка почти такая же какъ у *Carpocoris*, но строеніе bucculae и особенно относительная длина суставовъ усиковъ совершиенно иная. Xyphus переднегруди глубоко вдавленный; вдавленіе это имѣеть форму копьевидную и окружено высокимъ кантомъ; конецъ его прямо обрѣзанъ; среднегрудь по срединѣ вдавлена какъ у *Carpocoris*, вдоль углубленія идетъ ребро, которое достигаетъ до конца широкаго, прямообрѣзанаго и короткаго хурhus, тогда какъ у *Carpocoris* это ребро на хурhus среднегруди не переходитъ и самый хурhus у этого рода имѣеть форму болѣе удлиненную и узкую. Переднеспинка короткая, но широкая; передній край ея глубоко выемчатый, задній передъ щиткомъ прямой, затѣмъ исподвѣль заворачивается кпереди и образуетъ весьма широко округленные, плоскіе, вѣсколько приподнятые кверху плечевые углы; боковые края, вслѣдствіе выдавшихся плечевыхъ лопастей — глубоко выемчатые и около шейнаго угла сильно зазубрены. Щитокъ, надкрылья и ноги — какъ у *Carpocoris*. Переопонка съ 8 невѣтвящимися ребрами. Второе брюшное кольцо снизу съ туннымъ бугоркомъ по срединѣ.

N. maculata n. sp.

Gelblichgrau, oder bleich röthlichgrau, schwarz punctirt. Unterseite blassgelblich, farblos punct-

tirt. Schulterecke schwarz, Schild ganz punctirt und schwarzgefleckt. Membran gleich bräunlich, mit zerstreuten schwarzen Flecken zwischen den Rippen. Fühler braunroth, Wurzelglied röthlichgelb, schwarzpunctirt, Glied 4 und 5 schwarz, am Grunde röthlich. Beine graugelblich, schwarzpunctirt-gestreift, L. 13 mm.

Ussuri.

Все тулowiще гладкое, безволосое, желтовато-брого цвета, иногда съ слабымъ буровато-краснымъ оттенкомъ. Частый и довольно грубый пунктиръ покрываетъ всю наружную сторону; точки пунктира черного цвета, снизу тулowiще светло-желтоватое и пунктиръ безцветный; брюшко снизу покрыто кромѣ того очень мелкими струйками, лишь продольная средняя линія почти гладкая. Широкіе въ видѣ языка плечевые отростки кажутся почти черными, отъ очень скученного пунктира. Въ передней части передней спинки замѣтно четыре небольшихъ гладкихъ возвышенностіи, которые лежать въ одинъ попеченному ряду. Щитокъ пунктируется до самаго конца и весь одноцветный, только у основанія его и по срединѣ замѣтно вѣсколько темныхъ парныхъ пятенъ, происходящихъ отъ большей скученности пунктира. На надкрыльяхъ множество светлыхъ возвышенностей гладкихъ мѣстъ. Переопонка светлобурая, ребра частію того же цвета, иногда же темнѣе; вся она покрыта кругловатыми пятнами бурого цвета. Усики буровато-красные, первый суставъ рыжий, покрытый чернымъ крупнымъ пунктиромъ; четвертый и пятый суставы черного цвета, но основанія ихъ на одну треть красноватыя. Ноги рыжевато-брюссия, покрытыми

пятнами и точками, особенно бедра, где опь расположены рядами болѣе или менѣе правильными. Послѣдний суставъ лапокъ на концѣ темнобурый, также какъ и концы когтей. Connexivum почти черноватый, покрытый весьма сильнымъ и густымъ пунктиромъ; по срединѣ каждого сегмента болѣе свѣтлая полоса. Наружный край брюшка снизу окаймленъ очень узкой оторочкой чернаго цвѣта. Дыхальца свѣтлыя, по вблизи ихъ съ внутренней стороны лежитъ по небольшому черному пятну круглой формы. Ипогда посрединѣ брюшка находится нѣсколько очень рѣдко раскиданныхъ черныхъ точекъ. Перепонка нѣсколько выдается падъ брюшкомъ. Дл. 13 мм., ширина между плечевыми углами—8—8½ мм., ширина передъ концомъ щитка—7—7½ мм.

Уссури подъ 48° с. ш. и по берегамъ Японскаго моря подъ 43° с. ш. Судя по количеству собранныхъ Dr. Дыбовскимъ экземпляровъ, видъ этотъ тамъ не рѣдокъ.

✓ *Stromatocoris* n. gen.

Körper eisförmig, kahl. Kopf viel kürzer als zwischen den Augen breit, vorn fast gestutzt. Stirnschwiele durchlaufend. Kopfrand vor den Augen tief, ausgeschnitten. Augen gross, halbkugelig. Pronotumseiten gerade, Schulterecke stumpf. Schnabel schlankgliederig, Wurzelglied kurzer als der Kopf; Wangenplatten linienförmig, kurz, vorn spitzig. Fühlerglieder schlank, Glied 1 das kürzeste, mit dem Ende der Stirnschwiele gleich, Glied 2 fast 1½ mal länger als 1, Glied 3 länger als 2 und so lang als 4; Endglied länger als 4, beide spindelig. Mittelbrust 2 mit einem Mittelkiel. Bauchschiene 2 mit vorstehendem Spiess.

Роль этотъ долженъ стоять рядомъ съ р. *Piezodorus* которому очень близокъ, отличаясь главнымъ образомъ строениемъ и формою головы и среднегруди.

Тулowiще продолговатоovalное или овальное, безволосое. Голова еще короче чѣмъ у р. *Piezodorus*, такъ что ширина ея въ затылкѣ взятая вмѣстѣ съ глазами значительно превышаетъ длину. Конецъ носа открытый, оканчивающійся на одной линіи съ скелетовыми отростками; эти послѣдніе широкіе, пологіе, округленные съ боковъ и передъ глазами сильно вырѣзанные, спереди голова почти прямо обрѣзана. Переднесинника, щитокъ, надкрылья и ноги—такой же формы, какъ у рода *Piezodorus*, только на шейныхъ углахъ переднесинники помѣщаются болѣе сильные зубцы. Хоботокъ достигаетъ половины заднегруди; суставы его очень тонкіе, изъ нихъ первый гораздо короче головы. Висцулас линейные, короткіе, занимающіе только двѣ трети головы, кзади они округлены, панереди образуютъ небольшой зубчикъ. Усики довольно тонкіе, первый суставъ ихъ очень короткій, едва достигающій конца головы, толще прочихъ, второй въ полтора раза его длиннѣе, третій и четвертый суставы равной длины, каждый изъ нихъ на ¼ часть длиннѣе втораго, пятый нѣсколько длиннѣе четвертаго; второй и третій суставы тонкіе, къ вершинѣ едва расширяющіеся, четвертый и пятый—толстые, веретенообразной формы. Вдоль среднегруди проходитъ тонкое, невысокое ребро. Второй сегментъ брюшка вооруженъ короткимъ, по сильнымъ зубцомъ, обращеннымъ остриемъ кпереди, конецъ котораго достигаетъ до заднаго края среднегруди.

✓ *Stamocnus* n. sp.

Körper länglichoval, graubraun, theils bronsartig glänzend, grob punctirt. Fühler schwarz,

Wurzelglied und Glied 3 oben-röthlich gelb, (Glied 4 und 5.... fehlt). Kopf, Vordertheil und Seitenrand des Pronotum kupferroth. Rand des Pronotum kantig, orangegelb. Pronotum und Schild mit seiner gelber durchlaufender Mittellinie. Schild orangegelb, am Grunde schwarz metallisch schimmernd, Schildspitze glatt, weiss; vor der Spitze zwei schwarze Querrandflecke. Die kallosen Knoten im Schildgrundwinkel—orangegelb. Rücken und Connexivum schwarz, mit grossem Mittelfleck auf jedem Schnittstücke. Unterseite orangegelb, dicht punctirt. Beine schmutziggelb, Schenkelende schwarzpunctirt und gestreift. L. 11 mm.

Ussuri.

Туловище продолговатоovalное, съроватобураго цвѣта, мѣстами съ сильнымъ металлическимъ отливомъ. Голова грубо пунктированная, вся металлически красноватозеленая, только конецъ носа и узкие боковые окраины ея свѣтло желтаго цвѣта. Снизу голова оранжево-желтаго цвѣта, лишь скловыя части впереди сплошь металлически зеленые; сильныя, но рѣдкія точки пунктира покрывающаго голову снизу имѣютъ металлический отливъ. Переднеспинка съ боковыми краями нѣсколько приподнятыми кверху; передній и боковые края ея въ видѣ узкаго гладкаго кантика—оранжево желтаго цвѣта; такого же цвѣта гладкая продольная полоска, весьма неправильной формы, замѣчается въ передней части переднеспинки. Вся переднеспинка грубо пунктирована; впереди точки сосредоточены чаще, а назади они гораздо рѣже и образуютъ короткія, поперечныя морщинки; вдоль переднаго и боковыхъ краевъ ея лежитъ довольно широкая полоса металлическаго мѣдиокраснаго цвѣта, оставлья-

часть съроватобурая, мѣстами съ оранжевымъ отливомъ. Точки пунктира черныя съ слабымъ металлическимъ отливомъ; кромѣ того нѣкоторые ряды точекъ оттѣнены буроватымъ цвѣтомъ. Щитокъ желтоватооранжевый, конецъ его довольно узкій и закругленный, совершенно гладкій, блестящаго бѣлаго цвѣта; передняя часть щитка, равно какъ и поперечная, широкая полоса передъ бѣльмъ остреемъ—чернаго цвѣта, съ сильнымъ металлическимъ блескомъ. У основанія щитка, а именно въ углахъ его и по срединѣ находятся гладкія возвышенія неправильной формы—оранжево желтаго цвѣта; нѣсколько такихъ же возвышеній раскидано и по всему черному основанію щитка; вдоль его проходитъ болѣе или менѣе замѣтная средняя полоска оранжеваго цвѣта, которая раздѣляетъ пополамъ черную поперечную полосу, лежащую передъ бѣльмъ концомъ щитка; средняя широкая часть щитка такого же цвѣта и также пунктирована, какъ задняя половина переднеспинки. Надкрылья съроватобураго цвѣта, сплошь покрытыя грубымъ чернымъ пунктиромъ; иногда внутренній уголъ надкрыльевъ бываетъ совершенно бураго цвѣта; ребра гладкія, свѣтлые. Перепонка значительно длиннѣе брюшка—свѣтлая, прозрачная, съ рѣзкимъ бурымъ пятномъ или полоской наружному краю, передъ концомъ. Брюшко сверху чернаго цвѣта, соплексивъ выдающейся изъ-подъ надкрыльевъ, чернаго же цвѣта; по срединѣ каждого сегмента проходить широкая, оранжево желтая полоса. Нижняя сторона туловища желтоватооранжевая, сильно пунктированная, особенно на брюшкѣ. Шейные углы переднегруди, мѣдиокраснаго металлическаго цвѣта; на брюшкѣ пунктиръ черный съ металлическимъ отливомъ; Xyphus переднегруди средняя часть среднегруди и заднегруди, а также дыхальца—чернаго цвѣта.

Средняя продольная линія брюшка — гладкая, не пунктированная; боковой край брюшка снизу имѣть по черному пятнышку въ переднемъ и заднемъ углахъ сегментовъ. Ноги грязно-желтоватыя, вершина бедръ покрыта сильными черными точками и кромъ того на каждомъ бедрѣ, на вѣнчайшей его сторонѣ, проходитъ короткая черная полоска; голени у основанія и къ концу, также какъ и лапки, буро-черного цвѣта; второй суставъ лапокъ и основаніе первого — рыжаго цвѣта; концы когтей черные. Первые два сустава хоботка рыжіе, остальные — буро-черного цвѣта. Усики черные (четвертаго и пятаго суставовъ у моихъ экземпляровъ недостаетъ); верхняя сторона основанія сустава и верхняя часть третьаго-рыжеватаго цвѣта. Усики и хоботокъ покрыты очень короткими свѣтлорусыми волосками, ноги — особенно нижняя сторона бедръ и внутренняя сторона голеней — длинными, такого же цвѣта волосками. Волоски на бедрахъ снизу расположены рѣдко, прямостоячіе, имѣющіе характеръ щетинокъ. Брюшко покрыто очень рѣдкими, тонкими волосками, едва замѣтными, но длинными. Зубцы на шейныхъ углахъ переднеспинки острые. Длина туловища безъ перепонки $9\frac{1}{2}$ мм., съ перепонкою до 11 мм.; ширина между плечевыми углами 5 мм., ширина брюшка, передъ концомъ щитка $5\frac{1}{2}$ мм.

Уссури, подъ 48° с. ш. (Dr. Дыбовскій.)

✓ *S. musivus* n. sp.

Körper breitoval, grobpunktiert. Kopf schwarz, Rand schmal, orangegelb. Fühler schwarz, Glied 2 ganz, Glied 3 am Grunde und Ende und Grundhälften des 4 Gliedes — röthlichgelb. Pronotum hinten und Halbdecken braunröhlich; Vordertheil des Pronotum und Schild weisslich, oder gelblich. Vier Querflecken auf dem Pronotum, zwei Flecke am Schulterecke — schwarz. Schildspitze — breit weissgelblich; vor der Spitze zwei schwarze Bandflecke, Grundwinkel mit schwarzem Fleck; vor der Schildmitte ein schwarzer Fleck. Rücken schwarz. Unterseite bleich graugelb, Bauch mit schwärzlichem fleckenweise punctirten Streifen. Beine schmutziggelb, Schenkelende fast ganz schwarz. L. 9 mm. Ussuri.

Туловище короткое, широкоovalное, безволосое, сильно пунктирующее и пеимѣюще металлическаго блеска, кромъ весьма слабаго отлива на задней части головы и въ углубленіяхъ переднеспинки около головы. Задняя часть переднеспинки и падкрыльевъ буровато-краснаго цвѣта, иногда очень густаго, иногда же съ болѣе свѣтлымъ сброватымъ оттенкомъ; передняя половина переднеспинки и птилокъ то очень свѣтлаго, почти бѣловатаго цвѣта, то переходя въ желтоватые оттенки, до яркооранжеваго. Эти части украшены разнообразными симметрическими расположеннымъ черными пятнами. Голова черного цвѣта, конецъ носа, узкія боковые окраины головы и пѣсколько мелкихъ гладкихъ возвышений, особенно на скапловыхъ лопастяхъ — свѣтло-желтаго или оранжеваго цвѣта. Первые три сустава хоботка свѣтло-желтоватые, изъ нихъ третій пѣсколько темнѣе, а послѣдній черноватобурый. Усики черные, второй суставъ, основаніе и вершина третьаго и широкое основаніе четвертаго — рыжаго цвѣта; иногда рыжая полоска замѣтна и на вѣнчайшей сторонѣ основанія сустава. Изрѣдка усики бываютъ почти сплошь черные,

кромъ основанія и вершины втораго и основанія четвертаго суставовъ. Зубцы па шейныхъ углахъ переднеспинки тупые, иногда довольно широкіе и округленные, иногда же заостренные, причемъ острее обращено нѣсколько кзади. Передній и боковые края переднеспинки гладкіе, въ видѣ свѣтлого канта; на плечевомъ углѣ по два черныхъ пятна; поперекъ переднеспинки, отдѣляя заднюю красную часть отъ передней — свѣтлой, идетъ рядъ черныхъ пятенъ, изъ которыхъ четыре довольно крупныя и нѣсколько мелкихъ (послѣднихъ иногда и не бываеть); въ переднихъ углахъ лежать большія по-перечныя, извилистыя полоски, неимѣющія пунктира, также чернаго цвѣта, иногда съ слабымъ металлическимъ фioletовымъ отливомъ. Конецъ щитка широкоокругленный, гладкій или бѣлаго цвѣта, или оранжеваго цвѣта; передъ концомъ по бокамъ щитка расположены два черныхъ пятна (какъ у многихъ видовъ *Strachia*); въ основныхъ углахъ щитка помѣщается до трехъ черныхъ пятенъ, неправильной формы, окружающихъ большое гладкое возвышеніе бѣловатожелтаго цвѣта; въ передней части щитка, по срединѣ, нѣсколько отступая отъ основанія лежитъ круглое черное пятно, раздѣленное пополамъ срединною продольною узкою полоскою. Надкрылья одноцвѣтныя, грубѣе пунктированныя чѣмъ остальные части тулowiща; иногда во внутреннемъ углу *corium* находится большое темное пятно; ребра гладкія; внутренній уголъ *corium*, какъ у этого вида, такъ и у *S. amoenum*, сильно вдавленъ. Перепонка длиннѣе брюшка, свѣтлая, полупрозрачная, ребра ея у основанія и самое основаніе буроватыя. Брюшко черное, *connexivum* почти такой же какъ у предыдущаго вида. Голова сплюснута, какъ и все тулowiще, свѣтлая, скроватожедыя, иногда почти бѣлая. На брюшкѣ точки пунктира сли-

ваются въ черныя пятна неправильной формы, которыя образуютъ до шести продольныхъ рядовъ. Дыхальца черныя; средняя лишь брюшка гладкая, свѣтлая. Нереднегрудь неимѣеть черныхъ пятенъ. Хурнус, среднегрудь и заднегрудь посерединѣ матовочернаго цвѣта; ребро вдоль среднегруди частію черное, частію свѣтлое. Ноги такого же цвѣта, какъ и у предыдущаго вида, только черный цвѣтъ получилъ здѣсь болѣе сильное развитіе; такъ, концы бедръ, особенно задней пары, почти совершенно черныя. Волоски на усикахъ, ногахъ и брюшкѣ такие же какъ и у *S. amoenum*. Длина безъ перепонки — 8 мм., съ перепонкой — $8\frac{1}{2}$ — 9 мм.; ширина тулowiща 5 мм.

Уссури, подъ 48° с. ш. (Dr. Дыбовскій.)

Renardia n. gen.

Körper oval, kahl. Kopf gross, lânglich, wenig geneigt. Wangenplatten lineal, vorn spitzekig. Schnabel schlankgliederig, an dem Ende der Hinterbrust lang. Fühlerglieder schlank, Wurzelglied kürzer als der Kopf, Glied 2 doppelt so lang als Wurzelglied, Glied 3 fast nochmal so lang als 2; Glied 3, 4 und 5 einander gleichlang. Schulterecke des Pronotum vorwärts gerichtet, spitz. Pronotum - Seiten bogig ausgeschnitten, kleinzahnig. Schild $\frac{3}{4}$ des Rückens lang, hinter der Mitte verschmälerl, Ende ziemlich spitz. Membran mit acht bis neun ablaufenden Rippen. Vorderbrust vorn kantig. Vorderxyphus rinnensförmig, hinten verengt. Mittelbrust mit einem Mittelkiel. Bauchmitte kantig erhoben; Bauchschiene 2 mit vorstehendem Spicess. Beine unbewehrt, Fussglieder stark.

Родъ этотъ долженъ быть поставленъ рядомъ съ р. *Rhapigaster*; онъ принадлежитъ къ той группѣ, представители которой имѣютъ на второмъ брюшномъ кольцѣ снизу — большой шипъ, который у *Renardia* достигаетъ до половины среднегруди.

Голова большая, плоская, едва наклонная книзу; ширина ся въ затылкѣ значительно менѣе длины; *latus* короткій, закрытый скелетными отростками. Переднеспинка почти полуулунной формы, именно плечевые части имѣютъ сильно развитые плоскіе отростки, которые правильно загибаются кпереди, въ видѣ роговъ луны; боковой край отъ головы до остряя плечеваго отростка усаженъ довольно сильными зубчиками и образуетъ полуулунную вырѣзку. Плечевые углы сзади почти прямые и также по краямъ усажены рѣдкими зубчиками. Передний край переднеспинки глубоко вырѣзанъ, составляя влагалище для головы; задний край передъ щиткомъ — прямой. Щитокъ длинный, довольно узкій; конецъ *corigium* удлиняется значительно далѣе простирающаго конца щитка. Переонка мелко морщинистая, выдается подъ брюшкомъ и имѣеть отъ восьми до девяти реберъ. Висцелы узкіе, линейные, впереди оканчивающіеся сильнымъ прямымъ зубцомъ. Тонкосуставчатый хоботокъ почти достигаетъ до брюшка; первый суставъ его короткій, гораздо короче головы и равенъ по длине четвертому; второй почти въ полтора раза длиннѣе первого и равенъ по длине третьему. Первый суставъ усиковъ очень короткій, далеко не достигающій до конца головы, второй суставъ на половину длиннѣе первого, третій почти вдвое длиннѣе втораго и равенъ по длине четвертому и пятому въ отдѣльности. Вообще усики тощіе и пѣжные. Переднегрудь спереди оторочена узкимъ кантомъ; *hurhus* углубленный, конецъ его заост-

ренъ; вдоль среднегруди проходитъ довольно высокое ребро. *Connexivum* выдается изъ подъ надкрыльевъ. Вдоль брюшка идетъ сильное, высокое ребро, которое переходитъ на второмъ брюшномъ кольцѣ въ длинный острый шипъ. Ноги такой же формы какъ у *Rhapigaster*; лапки сильныя, первый суставъ ихъ большой, равный по величинѣ третьему, второй вчетверо короче каждого изъ нихъ. Когти болыше, съ сильными отростками (*aroliae*) у основания *).

✓ *R. decemrumpunctata* Motsch. *Bullet. des Natur. de Moscou* 1859, IV, p. 501.—*Tropicoris 10-punctata* Motsch.

Весь блѣднобуроватозеленый, почти одноцвѣтный, покрытый довольно пѣжнымъ черноватымъ циркулярн. Щитокъ, *Connexivum* и ноги — блѣднобуроваторыжіе; кончикъ щитка блѣдоватый, гладкій, па ногахъ также пѣть точекъ. Первые три сустава усиковъ и основание четвертаго рыжіе, остальная же часть четвертаго и пятаго суставъ — чернаго цвета. Поперекъ переднеспинки расположены въ одинъ рядъ четыре пебольшихъ черныхъ пятна, четыре такихъ же пятна помѣщаются попарно на щиткѣ, кромѣ того въ основныхъ углахъ послѣдняго находится по одному углубленному черному же пятнышку (о которомъ Мочульскій не упоминаетъ въ своей краткой діагнозѣ). Одно черное же пятно находится почти посерединѣ *corigium*, съ внутренней стороны главнаго ребра, далеко не достигающаго мембранныаго шва и оканчивающагося голымъ плоскимъ бугромъ, который приходится какъ разъ сзади чернаго пятна. Боковой край надкрыльевъ у основания голый. *Connexi-*

*.) Родъ этотъ называнъ мною въ честь вице-президента Московскаго Общества Испытателей Природы К. И. Ренара.

вум безъ пятенъ, по часто пунктированъ; пунктиръ, какъ и на всей паружной поверхности, — чернаго цвѣта. Брюшко сверху блѣднобуроватое. Туловище снизу очень блѣднаго желтоватаго цвѣта съ безцѣннымъ пунктиромъ; между глубокими точками на брюшкѣ множество тонкихъ волнистыхъ морщинокъ и струекъ. Верхняя сторона бугорка поддерживающаго усики имѣеть сильную черную полоску. Съ каждой стороны груди находится по четыре черныхъ пятна; дыхальца также чернаго цвѣта. Конецъ брюшнаго остряя, концы голеней и лапки буроватыя, концы когтей чернаго цвѣта. Дл. 20—21 мм.; ширина туловища между плечевыми углами 11 мм.

Уссури и берегъ Японскаго моря подъ 43° с. ш. (Dr. Дыбовскій); Амуръ и Шилка (Мочульскій.)

Acrocoris n. gen.

Oval, kahl. Kopf klein, Stirnchwiele eingeschlossen. Schnabel schlankgliederig, an das Ende der Hinterbrust reichend. Fühlerglieder schlank, Wurzelglied kürzer als der Kopf, Glied 2 kaum kürzer als 1, Glied 3 das längste, an 4—5 mal länger als 2, Glied 4 nur $\frac{2}{3}$ von 3, Glied 5..... (fehlt). Schulterecke des Pronotum spitz, rückwärts gerichtet, Pronotum-Seitenrand gezähnelt. Schild etwas über den halben Rücken lang, am Grunde breit, von der Mitte verschmäler, Ende zugerundet. Membran mit 7—8 Rippen. Bauchmitte schwach kielförmig; Bauchschiene 2 mit vorstehendem Spiess. Beine unbewehrt, lang; Klauenglied der Hinterfüsse schwächer als das Wurzelglied. Mittelbrust mit einem Mittelkiel. Wangenplatten linienförmig, vorn gestutzt, spitz-eckig, auf den halben Kopf lang.

Родъ этотъ также принадлежитъ къ группѣ *Rhapigastrini*, имѣющей на второмъ брюшномъ кольце снизу длинный щипъ, который у *Acrocoris* достигаетъ почти до половины среднегруди. Голова небольшая, *tulus* передъ концомъ нѣсколько вдавлены, закрыты склерными отростками, концы которыхъ округлены и не соприкасаются между собою; края этихъ отростковъ передъ глазами имѣютъ пологую выемку и нѣсколько загнуты кверху. Хоботокъ тонкочленистый, достигающій до конца груди; первый суставъ его на одну треть короче головы, почти равный четвертому; третій самый длинный, нѣсколько длиннѣе втораго. Усики тонкие, довольно длинные; первый суставъ ихъ короткий, не достигающій конца головы, второй очень тонкій, нѣсколько короче первого, третій очень длинный — вчетверо или нѣсколько болѣе длиннѣе втораго; четвертый па $\frac{1}{3}$ короче третьаго; пятаго сустава у многихъ экземпляровъ недостаетъ. Переднесинка короткая, но сильно развитая въ ширину; плечевые углы вытянуты въ длинную лопасть выгнутую дугой, острее которой обращено кзади; передний край переднесинки имѣеть болѣе гелевы сильный зубецъ, далѣе же по всему протяженію, до самаго плечеваго остряя, усаженъ мелкими тонкими зубчиками, обращенными острями кзади, такъ что имѣеть форму пилообразную; онъ спачала образуетъ очень пологую выемку, но затѣмъ переходя постепенно въ плечевую лопасть закругляется и завертывается взадъ, образуя довольно острый крючекъ, вершина которого нѣсколько срѣзана. Задний край переднесинки передъ щиткомъ совершенно прямой. Щитокъ трехугольный, не широкій и довольно короткій, оканчивающійся тупымъ, плоскоокругленнымъ концомъ; боковые края его передъ концомъ значительно вогнуты. Надкрылья обык-

новенной формы, съ перепонкой едва длинище брюшка; послѣдняя съ 7—8 вышуклыми ребрами, изъ которыхъ нѣкоторыя вѣтвятся отъ самаго основанія, другія же далеко не достають до конца. Голова снизу имѣеть сильно выпуклое горло; скелетные пластинки (vissculae) лицейная, достигающая только до половины головы и впереди оканчивающіяся довольно сильно зубцомъ. Вдоль среднегруди идетъ тупое ребро; копецъ ея прямо обрѣзанъ. Брюшной шипъ довольно тонкій и острый, достигающій почти половины среднегруди; средина брюшка слабо килеватая. Задніе углы брюшныхъ колецъ переходятъ въ небольшіе, острые зубчики. Ноги тонкія, длинныя, невооруженныя; лапки длинныя, второй суставъ ихъ очень тонкій и маленький; первый нѣсколько длиннѣе и массивнѣе треть资料. Когти сильные, придатки ихъ (aroliae) большіе.

✓ *X. serraticollis* n. sp.

Bleich bräunlich, oberseits grobpunktirt, Kopf, Rand des Corium, Schlussnath und Corium-Ende grünmetallisch. Schulterecke schwarz metallischviolett, Spitze orangegelb. Pronotum schwarzmetallisch punctirt. Halbdecken schwach metallischviolett. Schuld bräunlichgrün, ganz grob zerstreut punctirt. Unterseite bleich schmutzigrün, Bauch glatt, glänzend. Spiracula schwarz. Rücken, Connexivum und Beine bräunlich; Fühler schwarz, Wurzelglied blassbraun, am Ende schwarz. L. 16—17 mm.

Ussuri.

Общій цвѣтъ туловища блѣднобуро-ватый, сверху оно грубо пунктировано. Голова сверху вся металлически-зеленаго цвѣта съ фиолетовымъ оттенкомъ. Простые

глаза ярко-красного цвѣта. Усики черные, основной су-ставъ ихъ светлобуроватый, только вершина его и по-лоски по наружному и внутреннему краю черного цвѣта. Хоботокъ, какъ и все туловище, снизу блѣднаго грязно-зеленоватаго цвѣта. Переднеспинка покрыта рѣдкими, но крупными точками черного цвѣта, съ зеленымъ металлическимъ отливомъ. Плечевые отростки черные, съ металлическимъ фиолетовымъ оттенкомъ, а самое острѣе плечевыхъ угловъ—оранжеваго цвѣта. Щитокъ блѣдно-буровато-зеленый, покрытый до самаго конца сильными, но очень рѣдко расположеннымъ черными точками. Надкрылья всѣ очень густо пунктированы, при томъ точки неправильной формы и часто сливаются ме-жду собою; края ихъ—наружный и внутренний приле-гающій къ щитку (clavus), а также острый конецъ со-rium—блестящаго металлически зеленаго цвѣта, средняя же часть надкрыльевъ блѣднаго металлически фиолето-ваго цвѣта. Перепонка блѣдно-бурая, сильные ребра ея оттенены съ обѣихъ сторонъ—болѣе темнымъ бурымъ цвѣтомъ, также какъ и самый конецъ ея. Брюшко сверху, Connexivum и ноги одноцвѣтныя, буроватыя; ноги по-крыты сильнымъ чернымъ пунктиромъ; брюшко гладкое, блестящее. Части груди покрыты слабымъ безцвѣтнымъ пунктиромъ. Дыхальца черные. Снизу плечевые отростки представляются выдолбленными въ видѣ ложки или корыта. Дл. 16—17 мм.; ширина между плечевыми от-ростками—12 мм., а ширина брюшка—9 мм.

Уссури, подъ 48° с. ш. (Dr. Дыбовскій.)

✓ *Sistrachia festiva* L. var. *albiventris*.

Bauch weiss, schwarzgefleckt.

Отъ типической формы отличается тѣмъ, что на пиж-ней сторонѣ туловища красный цвѣтъ замѣненъ бѣ-

лымъ, только наружный край брюшка остается краснымъ. Основаше бедръ средней и задней пары ногъ также бѣлаго цвѣта.

✓ *Elasmostethus dorsalis* n. sp..

Ganz röthlichgelb, grob schwarzpunctirt, Corium geröthet. Schulterecke spitz, schwarz. Rücken rothgelb, am Grunde schwarz. Connexivum röthlichgelb mit braunen Endflecken der Schnittstücke. Membran durchscheinend hell, mit braunen Rippen und Flecken. Bauch unten, Beine und Fühler bleich gelblich; Fühlerendglied, Schienbeinende und Klaenglied bräunlich. Bauchrand sehr zerstreut punctirt. L. 6 mm. (♂), 8 mm. (♀).

Ussuri.

Общий цвѣтъ туловища рыжий; вся поверхность покрыта глубокими черными точками, которые на головѣ, концахъ панцира и среднемъ полѣ надкрыльевъ мельче, чѣмъ на остальныхъ частяхъ; вообще точки раскиданы рѣзко, кромѣ головы, где они сильно скучены. Грудь снизу, кромѣ широкихъ, боковыхъ краевъ переднеспинки, также грубо пунктирована; брюшко снизу, кромѣ посеречныхъ струекъ и морщинокъ, имѣеть по бокамъ очень рѣдкій пунктиръ. Переднеспинка имѣеть такую же форму, какъ и у остальныхъ видовъ этого рода, только плечевые углы ея вытянуты въ длину острѣе, нѣсколько загнутое кзади; такого сильнаго развитія плечевыхъ угловъ у другихъ видовъ не встрѣчается. Плечевые углы и первый сегментъ брюшка сверху черного цвѣта; остальные сегменты красновато-рыжие, кроме послѣдняго, который всегда бываетъ темнѣе. Connexivum рыжий, въ заднихъ углахъ первыхъ трехъ сег-

ментовъ помѣщаются темнобурыя большія пятна. Боковой край надкрыльевъ, также какъ и у переднеспинки до плечеваго острея,—гладкій, бѣловатый; конецъ надкрыльевъ болѣе или менѣе красноватъ; перепонка прозрачная съ бурymi ребрами и пятнами въ задней ея половинѣ, которая часто сливаются между собою. Брюшко снизу, ноги и усики светлорыжіе; послѣдний суставъ усиковъ, концы голеней и когтевой суставъ лапокъ—буроватый. Самцы менѣе ростомъ самокъ.

Судя по довольно большому количеству экземпляровъ, собранныхъ Dr. В. Дыбовскимъ, видъ этотъ не рѣдокъ на Уссури.

✓ *Dinorhynchus* n. gen.

Körper oval. Kopf gross, sehr lang, Stirnchwiele kürzer als die vorn zugerundeten Jochstücke, Schnabel sehr stark, kurz, an das Mittelbrustende reichend; Wurzelglied kürzer als der Kopf. Wangenplatten linienförmig, vorn lappensförmig erweitert. Fühler sehr lang, Wurzelglied viel kürzer als der Kopf, Glied 2 sechs - siebenmal länger als 1 und fast so lang als 3, Glied 4 um $\frac{1}{4}$ länger als 3, Endglied bogig, so lang als 3. Schulterecke spitz, stark vorstehend, Pronotum-Seiten vor den Schultern fast winkelig geschweift, Vorderhälfte ziemlich stark gezähnelt. Bauchgrundschiene mit spitzem Höcker. Membran mit neun Rippen. Beine lang, unbewehrt.

Родъ этотъ принадлежитъ къ группѣ Asopini и долженъ стоять возлѣ рода *Podisus*.

Туловище продолговатоovalное. Голова большая, очень длинная, въ полтора раза болѣе ширины въ за-

тылкъ. *Tylus* короткій, сколовые отростки весьма длинные, листоватые, совершенно закрывающіе конецъ носа; напереди эти отростки закругляются и сходятся только своими концами, такъ что передъ *Tylus* остается свободное пространство. Хоботокъ короткій и очень толстый, такъ что первый суставъ—самый массивный—равняется $\frac{3}{4}$ ширины головы; этотъ суставъ короткій, не достигающій конца головы, второй длиннѣе прочихъ, сильно сжать у основанія съ боковъ и изогнутъ саблевидно, третій очень короткій и широкій, такъ что сверху кажется почти квадратнымъ, конецъ четвертаго сустава достигаетъ до начала заднегруди. Скуловыя пластинки листоватыя, короткія, кпереди широкоокругленныя, а кзади быстро переходятъ въ линейныя и не достигаютъ до заднаго конца головы. Усики топкосуставчатые, очень длинные, такъ что равняются длине головы, переднеспинки и щитка взятыхъ вмѣстѣ; первый суставъ ихъ очень короткій, достигающій только до половины головы, второй въ шестero или семеро длиннѣе первого и почти равенъ по длине третьему; четвертый на одну четвертую часть длиннѣе третьаго, послѣдній суставъ изогнутый (какъ у р. *Alydus*), гораздо короче четвертаго и равенъ третьему. Хурфус переднеспинки углубленный, трехугольный, съ сильнымъ продольнымъ ребромъ, которое переходитъ на среднегрудь. Переднеспинка съ сильно вытянутыми плечевыми углами, приподнятыми кверху и острее которыхъ обращено нѣсколько назадъ. Боковые края переднеспинки вырѣзаны и въ передней своей части сильно заузбрены. Основной суставъ брюшка снизу вооруженъ шипомъ. Ноги сильныя, длинныя, ребра неооруженныя. Перепонка узкая, длинная съ девятью ребрами.

✓ D. Dybowskyi n. sp.

Oberseite ganz metallisch smaragdgrün, fein weiss behaart. Pronotum-Mitte metallisch dunkelblau, Schulterecke schwarzgrün; Seitenrand des Pronotum an dem körnig gezahnten Theile—weisslich. Pronotum und Schild mit bleicher rothbräunlicher durchlaufender Mittellinie. *Tylus* am Ende, Pronotum hinten, Schildspitze und Beine gleich bräunlichroth. Fühler schwarz, Glied 1 gleich bräunlich, schwarz gestreift; Endglied bräunlich. Schenkel braungefleckt; Schienbeinende und Füsse braun; Connexivum schwarz mit rothgelbem querem Mittelfleck. Unterseite und Schnabel gleich gelblich, Schnabelglied 4—schwarzbraun. Spiracula schwarz. L. 18 mm.

Insel Askold.

Голова, переднеспинка и щитокъ весьма сильно пунктированы, на надкрыльяхъ пунктиръ гораздо нѣжнѣе. Вся наружная поверхность—прекраснаго, металлическаго изумруднозеленаго цвѣта, покрыта пѣжными бѣловатыми волосками; ноперекъ переднеспинки идеть широкая полоса металлическаго синаго цвѣта; плечевые углы темнозеленые. Зубцы переднеспинки бѣловатые. Конецъ носа, продольная линія переднеспинки и щитка, задний край переднеспинки, конецъ и бока щитка, ребра надкрыльевъ и ноги — блѣднаго красноватобурого цвѣта. Нижняя сторона часѣкомаго и хоботокъ блѣдношалеваго цвѣта, послѣдній суставъ хоботка темнобурый. Дыхальца и усики черные; первый суставъ ихъ светлобурый, съ черными полосами, послѣдній буреватый. Бедра покрыты темными пятнами и полосками, концы голеней и лапки бурыя; второй суставъ лапокъ и основанія пер-

ваго и третьаго—рыжие. Съ каждой стороны переднегруди по три пятна изумрудно-зеленаго цвѣта; перепонка бурая; connexivum черный, съ рыжими поперечными полосками по срединѣ каждого согмента. Длина безъ перепонки 15 — 16 мм., съ перепонкой — 18 мм.; ширина между плечевыми углами 9 мм., передъ концомъ щитка — 6½ — 7 мм.

Одинъ экземпляр этого вида взяты Dr. Дыбовскимъ на островъ Аскольдъ (Японское море подъ 43° с. ш.)

Fam. Lygaeides.

Lygaeus venustus Böb. var. *marginatus* m.

Clavus schwarz, am Ende roth; Corium schwarz, alle Ränder roth gesäumt.

Поперечная черная перевязка на падкрыльяхъ имѣеть форму большаго трехугольного пятна, которое доходитъ до конца согиума, нигдѣ однако не достигая его краевъ; такимъ образомъ Согиум является чернымъ, ограниченнымъ со всѣхъ сторонъ красными краями. Clavus черный, конецъ его красный. Нѣжныя стоячихъ волосковъ, которые есть у типической формы на переднеспинкѣ, у этой разновидности не замѣтно. Перепонка свѣтлѣе, именно буроватая, съ бѣлою широкою оторочкою. Разновидность эта такой же величины, какъ и типическая форма, но нѣсколько уже послѣдней.

Одинъ экземпляр съ береговъ Уссури, подъ 48° с. ш. (Dr. Дыбовский).

Fam. Tingitides.

Monanthia capitata n. sp.

Pronotum-Mittelkiel fein, Seitenkiel fehlt. Pronotum - Seiten mit seinem Randkiel. Rand-

feld der Netzdecken linear, nur mit einer Reihe Maschen. Braungelb, kahl. Kopf, Brustst cke und Bauch am Grunde schwarz. Mittelfeld am Ende und zwei Fleckchen an dem Vordertheil des Pronotum dunkelbraun. Beine, F hler und Kopfdorne—r othlichgelb. L. 3½ mm. Ussuri.

Относится къ подроду *Tropidochila*. Боковые края переднеспинки оторочены весьма тонкимъ кантикомъ; вдоль переднеспинки до конца отростка (processus) идетъ очень тѣжкое срединное ребро; боковыхъ реберъ пѣть, или замѣтны только очень слабые слѣды ихъ. Боковой край сагенъ очень узкий, почти линейный, въ одинъ рядъ клѣточекъ. Голова, грудь и основыя кольца брюшка снизу чернаго цвѣта; остальное туловище буровато-рыжее, только два пятна въ передней части переднеспинки и широкіе концы внутренняго поля сагенъ—темнобурые. Широкое шейное пятно и скапловыя пластинки бѣловатыя. Мелкія клѣтки перепонки бурыя. Ноги, усики и тунные головные шипики красновато-рыжаго цвѣта. Все туловище безволосое, пѣблестящее, кроме переднеспинки, на которой замѣтенъ слабый полуметаллическій блескъ. Дл. ¾ mm., ширина около 1 mm.

Отъ другихъ видовъ *Tropidochila* отличается, съ перваго взгляда, отсутствиемъ боковыхъ реберъ на переднеспинкѣ и большою головой чернаго цвѣта.

Одинъ экземпляръ этого вида найденъ Dr. Дыбовскимъ на Уссури, подъ 48° с. ш.

M. (*Platychila*) *helvina* n. sp.

Braunlichgrau, ganz weisslich behaart. Kopf schwarz dicht weissfilzig. Pronotum-Mitte dun-

У этого вида цвѣтъ нѣкоторыхъ частей тулowiща бываетъ очень измѣнчивъ, только головная пятна и цвѣтъ груди и головы снизу—остается всегда постояннымъ. Н. Dybowskyi ближе всего стоитъ къ Н. saginifex Muss., но между ними есть разница въ строеніи переднегруди, формѣ шейнаго кольца, величинѣ и окраскѣ.

Нѣсколько экземпляровъ этого вида было собрано Dr. Дыбовскимъ на Уссури, подъ 48° с. т.

Астрахань
Августъ 1876 г.

Издание Императорскаго Московскаго общества испытателей Природы.

Москва. 1876. Въ Университетской типографіи (Катковъ),
на Страстномъ бульварѣ.

— 124 —

ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЯ (НЕМИРТЕРА НЕТЕГОРТЕРА)
СЪВЕРНОЙ ПЕРСИИ.

В. Е. ЯКОВЛЕВА.

Во время своихъ путешествий по съверной Персии Г. Ф. Христоффъ собралъ, между прочимъ, небольшую коллекцію полужестокрылыхъ, которую передалъ для опредѣлевія и описанія мнѣ. Кромѣ того, чрезъ посредство Русскаго Энтомологическаго Общества, я получилъ нѣсколько экземпляровъ изъ той же мѣстности, собранныхъ членомъ Русскаго Географическаго Общества Огородниковымъ; впрочемъ, между послѣдними не оказалось ни одного вида, котораго не было бы найдено Христоффомъ.

Въ коллекціи преобладаютъ виды, принадлежащіе къ семействамъ съ крупными формами, представителей же *microhemiptera*, какъ-то: *Capsidae*, *Tingitidae*, *Anthocoridae*, очень мало. Это объясняется тѣмъ, что собиратели, какъ неинтересующіеся специально этимъ отрядомъ насѣкомыхъ, обращали свое вниманіе лишь на болѣе крупныя и красивыя формы и то въ такомъ только случаѣ, если они сами попадались подъ руку; мелочь же совершенно игнорировалась ими.

При такомъ случайному характерѣ коллекціи, не можетъ быть и рѣчи о какихънибудь сравненіяхъ и обобщеніяхъ; можно только замѣтить, что число новыхъ видовъ, сравнительно съ общимъ количествомъ найденныхъ полужестокрылыхъ, довольно значительно: оно составляетъ третью часть всей коллекціи, именно 23 вида, остальные двѣ трети относятся преимущественно къ формамъ южноевропейскимъ; кромѣ того, между ними оказалось два вида, описанныхъ ранѣе В. Ф. Ошанинымъ изъ Самарканда и Заравшанской долины.