

on compare

- 164 -

catalogue



HEMIPTÈRES HÉTÉROPTÈRES DE MOLDAVIE

ET DESCRIPTION DE DEUX NOUVEAUX EURYGASTER

Par A.-L. MONTANDON.

J'ai déjà fait connaître par la *Feuille des Jeunes Naturalistes* et le *Bulletin de la Société d'Études scientifiques d'Angers*, le vaste domaine de Brosteni qui a servi de champ d'exploration à mes recherches entomologiques de 1878 à 1884; mes excursions en dehors du périmètre de cette propriété ont été trop peu fréquentes et les matériaux qu'elles m'ont permis d'ajouter à la liste établie ci-après ne sont pas suffisants pour donner lieu, comme je l'aurais désiré, à un catalogue des Hémiptères de Moldavie. La forme plus modeste sous laquelle je les présente n'enlèvera rien à l'intérêt scientifique qui s'attache à la connaissance d'une contrée encore aussi peu connue au point de vue entomologique.

Quelques renseignements sur la position des localités indiquées ne seront pas de trop; car on risquerait de ne pas les trouver sur bien des cartes: *Brosteni*, *Cruce*, *Cotargasu*, *Holdiza*, *la Neagra*, *le Barnar*, *Boda*, *Dealu Ursului* et *le Mont-Rareu*, font partie du domaine de Brosteni; *Sabasa* se trouve sur la Bistriza un peu plus au sud; *Bacau* toujours dans la même direction, non loin du confluent de la Bistriza et du Sereth. *Poeni* et *Dobrovezi* sont les seuls endroits éloignés des précédents; ils appartiennent à la partie moldave du bassin du Pruth, entre la ville de Jassy et la Bessarabie.

Je n'ai commencé l'étude des Hémiptères qu'en 1880, sur les instigations de notre cher maître, M. le Dr Puton; c'est grâce à ses excellents conseils et à son inépuisable obligeance que je puis aujourd'hui faire ce travail; MM. Reuter et de Horvath y ont aussi contribué en rêvant quelques-uns de mes insectes douteux. Je les prie d'accepter ici l'hommage de ma plus vive gratitude.

Tous les hémiptéristes seront étonnés avec moi de la pauvreté de types spéciaux à la contrée que j'ai explorée; à part *Odontoplatus bidentulus* H.S., qui ne se trouve que dans les Carpathes (1), il n'y a dans cette énumération que deux espèces nouvelles: *Myrmedobia distinguenda* Reuter et *Aradus Montandoni* Reuter. Ce dernier, que

(1) Herrich-Schäffer d'abord, puis Fieber à son exemple, avaient attribué l'Europe méridionale comme patrie à *Odontoplatus bidentulus*; mais la phrase elle-même de l'auteur « Wohl aus dem südlichen Europa » indique déjà qu'il n'en était pas très-sûr. Fieber l'a reçu ensuite de Carl Fusz qui a parcouru toute la Transylvanie, et s'est empressé de rectifier la localité, M. le Dr de Horvath le trouve aussi dans les Carpathes de

- 165 -

j'avais pris en compagnie de *A. lugubris* et que j'avais confondu avec lui, en est effectivement assez voisin; un simple examen suffit cependant pour les distinguer. *Montandoni* a les antennes plus longues et plus grêles et les côtés du pronotum denticulés en avant; ces denticules n'existent pas chez *lugubris*.

La famille des Aradides, dont les représentants sont considérés comme rares partout ailleurs, est ici, toute proportion gardée, la mieux représentée, ce qui s'explique par l'abondance et l'étendue des forêts de la région et la quantité de bois mort qu'on y rencontre.

- ✓ *Corimelaena scarabaeoides* L., Cruce.
- ✓ *Eurygaster maurus* L., Brosteni, Cruce.
- ✓ *Araphosoma lineatum* L., id.
- ✓ *Behirus morio* L., id.
- ✓ » *luctuosus* M. et R., Cruce.
- ✓ » *bicolor* L., Bacau.
- ✓ *Gnathoconus picipes* Fab., Cruce.
- ✓ *Sciocoris macrocephalus* Fieb., Brosteni.
- ✓ » *uxbrinus* Wolff. et var. à abdomen tout noir, Brosteni.
- ✓ » *Helferi* Fieb., var. obscure, Brosteni.
- ✓ » *terreus* Sch., id.
- ✓ *Neottiglossa inflexa* Wolff., id.
- ✓ *Dalleria pusilla* H.S., id.
- ✓ *Eysarcoris perlatus* Fab., id.
- ✓ *Rubiconia intermedia* Wolff., Brosteni, Cruce.
- ✓ *Carpocoris baccarum* L., Cruce.
- ✓ » *nigricornis* Fabr., Brosteni, Cruce.
- ✓ » *verbasci* Deg., id.
- ✓ *Palomena viridissima* Poda., Brosteni, Cruce.
- ✓ » *prasina* L., Brosteni.
- ✓ *Tropicoris rufipes* L., id.
- ✓ *Strachia festiva* L., Brosteni, Cruce.
- ✓ » *oleracea* L., id., id.
- ✓ *Sastragala ferrugata* Fabr., Cruce, Dealu Ursului.
- ✓ *Elastomethus interstinctus* L., Brosteni, Cruce.
- ✓ *Cyphostethus tristriatus* Fabr., Cruce.
- ✓ *Picromerus bidens* L., id.
- ✓ *Podisus luridus* Fabr., Brosteni, Cruce.
- ✓ *Asopus punctatus* L., id.

Hongrie, mais il n'a plus été signalé ailleurs à ma connaissance. Le dessin qu'en a donné Herrich-Schäffer: Tab. CCXII, fig. 668, est très-incorrect, les couleurs non plus ne sont pas naturelles; il est vrai qu'il n'avait pas vu l'insecte en vie, lequel est alors d'un vert tendre très-délicat, qui passe facilement au vert sale jaunâtre après la mort. C'est ce qui nous a engagé à en donner une nouvelle figure (Voir planche I, fig. 1).

- Jalla dumosa* L., Cruce.
Zicrona caerulea L., id.
Enoplops scapha Fab., Brosteni.
Syromastes marginatus L., Brosteni, Cruce.
Coreus hirticornis Fab., Brosteni.
Terapha hyosciami L., Brosteni, Cruce.
Corizus crassicornis L., Brosteni, Cruce, Cotargasu.
» *capitatus* Fab., Cruce.
» *distinctus* Sign., Brosteni, Cruce.
» *conspersus* Fieb., Brosteni.
» *parumpunctatus* Schill., Brosteni, Dealu Ursului, M^r Rareu.
» *maculatus* Fieb., Brosteni.
» *hyalinus* Fabr., id.
» *tigrinus* Schill., Mont Rareu.
Neides tipularius L., Poeni.
Berytus clavipes Fabr., Poeni, Brosteni, Cotargasu, Mont Rareu.
» *minor* H.S., Brosteni, Cruce.
» *montivagus* Fieb., vallée du Barnar.
» *Signoreti* Fieb., Brosteni.
» *crassipes* H.S., Brosteni, Cruce.
Metatropis rufescens H.S., vallée du Barnar, Holdiza.
Lygæus venustus H.S., Brosteni.
» *equestris* Lin., Brosteni, Cruce.
Nysius Jacobæ Schill., Brosteni, Mont Rareu.
» *thymi* Wolff., Brosteni.
Cymus glandicolor Hahn, id.
» *clavicus* Fall., Brosteni, Cruce, Mont Rareu.
Kleidocerus didymus Zett., Cruce.
Metopoplax ditomoides Costa, Brosteni.
Oxycarenus Preysleri Fieb., id.
Plinthisus pusillus Scholtz, un seul exemplaire forme macroptère =
latus Reuter, Brosteni.
Pterotmetus staphylinoides Burm., Brosteni, Poeni.
Ischnocoris hemipterus Schill., Brosteni.
Rhyparochromus hirsutus Fieb., id.
» *chiragra* Fabr., Brosteni, Cruce, Poeni.
Acompus rufipes Wolff., Cruce.
Stygnus rusticus Fall., Brosteni, vallée du Barnar, Mont Rareu.
» *arenarius* Hahn., Brosteni, Cruce.
» *pedestris* Fall., Brosteni, Cruce, vallée du Barnar.
» *pygmaeus* Sahlb., vallée du Barnar, Boda.
Peritrechus geniculatus Hahn., Brosteni.
» *gracilicornis* Puton, Poeni.
Trapezonotus anorus Flor., Brosteni, Cruce, vallée du Barnar.

- Trapezonotus nebulosus* Fall., Brosteni, vallée du Barnar.
» *agrestis* Fall., id., id.
» *dispar* Stal., id.
Pachymerus lynceus Fab., Poeni.
» *pini* L., Brosteni, vallée du Barnar, Cruce.
» *phæniceus* Rossi, Brosteni.
» *vulgaris* Schill., Brosteni, Bacau, Dobrovezi.
» *pedestris* Pz., Poeni.
Drymus sylvaticus Fab., Brosteni, Cruce, Cotargasu.
» *brunneus* Sahlb., Cruce.
» *pilicornis* M. et R., Brosteni, Cruce.
Eremocoris plebejus Fab., Brosteni, vallée du Barnar.
Scolopostethus pictus Schill., Brosteni.
» *affinis* Schill., id.
» *adjunctus* Dougl. et Scott., id.
» *decoratus* Hahn., id.
» *pilosus* Reut., id.
Gastrodes ferrugineus H.-S., id.
» *abietis* L., Brosteni, Cruce, vallée du Barnar, Mont Rareu ;
très-commun dans les cones de sapin d'où on
les fait tomber quelquefois par centaines.
Pyrrhocoris apterus L., Cruce, Bacau.
Heterogaster urticae Fab., Brosteni.
» *artemisiae* Schill., Brosteni, Cruce.
Piesma quadrata L., Cruce.
» *maculata* Lap., Brosteni, Cruce.
» *capitata* Wolff., Brosteni.
Campylostira verna Fall., id.
Orthostira musci Schr., Dealu Ursului, vallée du Barnar, Holdiza.
» *cervina* Germ. Variété avec la marge des élytres unisériée
vers le milieu (1). Brosteni, Cruce.
» *macrophtalma* Fieb., Brosteni.
Dictyonota crassicornis Fall. et var. *erythroptalma* Germ., Bros-
teni, Cruce, vallée du Barnar, Mont Rareu.
Derephysa foliaceu Fall., Brosteni, vallée du Barnar.
Monanthia cardui L., vallée du Barnar.
» *ciliata* Fieb., Brosteni, Cruce.
» *setulosa* Fieb., id., id.
» *quadrinaculata* Wolff., Cruce, Dealu Ursului ; pas rare
sur l'aune.
» *costata* Fieb., Brosteni, Cruce.
» *Wolffi* Fieb., id.

(1) M, le Dr de Horvath possède aussi cette variété d'Allemagne.

- Monanthia lupuli* H.-S., Brosteni.
» *humuli* H.-S., id.
Aradus depressus Fab. vallée du Barnar, Cotargasu, hêtre et bouleau.
» *erosus* Fall., Brosteni, vallée du Barnar, sapin.
» *betulinus* Fall., id., id., Cruce, Mont Rareu, sapin.
» *dilatatus* Duf., id., bouleau.
» *Montandoni* Reuter, id., sapin.
» *lugubris* Fall., Brosteni, Cruce, sapin.
» *varius* Fabr., id., id., Cotargasu, sapin.
» *betulae* Lin., vallée du Barnar, Cotargasu, hêtre, bouleau.
Hebrus pusillus Fall., Brosteni, Cruce.
» *ruficeps* Thoms., id., id.
Microvelia Schneideri Scholtz, id.
Gerris rufoscutellata Latr., Brosteni, Holdiza, Cruce; parfois très-abondant au premier printemps après les orages, sur les flaques d'eau des chemins.
» *Costae* H.-S., Brosteni, Cruce.
» *thoracica* Schum., id., id.
» *lacustris* L., id., id., Holdiza, vallée de la Neagra.
» *odontogaster* Zett., id.
Ploiaria culiciformis Deg., Brosteni.
Pygolampis bidentata Fourc., id., Cruce.
Harpactor iracundus Scop., vallée du Barnar, Cruce.
» *annulatus* L., Cruce.
Nabis lativentris Boh., Brosteni, Poeni.
» *flavomarginatus* Schltz., Cruce, vallée du Barnar, Mont Rareu.
» *limbatus* Dahlb., Dealu Ursului, Mont Rareu.
» *ferus* L., Brosteni, Cruce, vallée du Barnar, Mont Rareu.
» » *var. punctatus* Costa, Brosteni.
» *rugosus* L., Brosteni, Cruce, vallée de la Neagra.
» *ericetorum* Schltz., Cruce.
» *brevis* Schltz., Brosteni, Cruce, vallée de la Neagra.
Salda orthochila Fieb., vallée du Barnar.
» *C-album* Fieb., id., Brosteni.
» *melanoscela* Fieb., Brosteni, Cruce.
» *saltatoria* Lin., id., id.
» *pallipes* Fabr., id., id.
» *morio* Zett., vallée du Barnar.
» *scotica* Curt., id., Brosteni, Cruce.
» *nigricornis* Reut., Brosteni.
» *Cocksii* Curt., Cruce.
Cryptostemma alienum H.S., Brosteni, Cruce; pas rare sous les galets enfoncés au bord de la Bistritz.
Ceratocombus coleoptratus Zett., Brosteni, Cruce, vallée du Barnar.

- Cimex lectularius* L., Brosteni, Cruce; dans toutes les maisons.
Myrmedobia distinguenda Reut. (1), Brosteni, vallée du Barnar, Mont Rareu.
Triphleps niger Wolff., Brosteni, Cruce, Sabasa.
» *minutus* L., id.
Xylocoris ater Duf., id.
Piezostethus cursitans Fall., id., Mont Rareu, Dealu Ursului.
Lycocoris campestris Stal., id., Cruce.
Anthocoris confusus Reuter, id.
» *sylvestris* Lin., id., Cruce, Mont-Rareu.
Acomocoris alpinus Reut., id., Mont Rareu.
Miris calcaratus Fall., id., Cruce.
» *virens* L., Cruce, Mont Rareu.
» *laevigatus* L., id., Brosteni.
» *holsatus* Fab., Brosteni, Cruce.
Notostira erratica L., id., id.
» *longicornis* Fall., vallée de la Neagra.
Megalocera ruficornis Fall., Brosteni, Mont Rareu.
Leptoterna dolabrata L., Brosteni.
Phytocoris populi L., Dealu Ursului.
» *longipennis* Fl., id.
» *pini* Kb., Mont Rareu.
Calocoris sexguttatus Fab., Brosteni, Mont Barnar.
» *bifasciatus* Fab., vallée de la Neagra, Dealu Ursului.
» *fulvomaculatus* Deg., Brosteni, Cruce.
» *alpestris* Mey., id.
» *chenopodi* Fall., id.
» *vandalicus* Rossi, id.
» *affinis* H.S., id., Mont Rareu.
» *roseomaculatus* Deg., id.
Pycnopterna striata L., id.
Oncognathus binotatus Fabr., id., Mont Rareu.
Dichrooscytus intermedius Reuter, Cruce.
Lygus pratensis Fabr., Brosteni, Cruce.
» *campestris* Fabr., id., id.
» *rubricatus* Fall., Cruce, Mont Rareu.
» *pabulinus* L., Brosteni, Cruce.
Orthops montanus Schill., Brosteni.
» *pastinacae* Fall., id., Cruce.
» *kalmi* L., id., id.
» » *var. flavovarius* F., Brosteni, Cruce.

(1) Le seul exemplaire ♂ que j'ai capturé fait partie de la collection de M. Reuter; quant aux ♀, je les ai toujours trouvées sous les écorces de vieilles souches de sapin (Cf. Reuter, *Monograph. Anthocoridae*, p. 134).

- Liocoris tripustulatus* Fabr., Brosteni, Cruce.
Capsus laniarius L., Dealu Ursului.
Monalocoris filicis L., Brosteni, Cruce.
Bryocoris pteridis Fall., id.; brachyptère et macroptère.
Pilophorus clavatus L., Cruce.
Stiphrosoma leucocephalum L., Cruce.
Halticus apterus L., Brosteni, Cruce; brachyptère et macroptère.
Orthocephalus brevis Pz., Dealu Ursului, Mont Rareu.
» *saltator* Hah., Cruce, vallée du Barnar, Mont Rareu.
Cremnocephalus umbratilis Fab., Brosteni.
Odontoplatys bidentulus H.S., Vallée du Barnar, Dealu Ursului; au mois de juin sur diverses essences d'arbres, principalement *Salix caprea* (Pl. I, fig. 1).
Macrolophus nubilus H.S., Brosteni, Cruce.
Dicyphus globulifer Fall., Cruce.
» *pallidus* H.S., Brosteni, vallée du Barnar, sur *Salvia glutinosa*.
Globiceps selectus Fieb., Dealu Ursului.
» *fulvipes* Scop., Cruce.
Æthorhinus angulatus Fabr., Cruce, Dealu Ursului, Mont Rareu.
Malacocoris chlorizans Fall., Cruce, vallée du Barnar, Mont Rareu.
Orthotylus flavinervis Kb., Brosteni.
» *nassatus* Fabr., id., Cruce.
» *prasinus* Fall., Dealu Ursului.
Plachochilus seladonicus Fall., Mont Rareu.
Macrotylus luniger Fieb.; Brosteni, Cruce; très-commun sur *Salvia glutinosa*.
Byrsoptera rufifrons Fall., Dealu Ursului.
Phylus coryli L., Brosteni.
» *plagiatus* H.S., id.
Atractotomus magnicornis Fall., Cruce, sur *Abies excelsa*.
Psallus Kolenatii Flor., Cruce.
» *ambiguus* Fall., id., Brosteni.
» *Scholtzi* Fieb., Mont Rareu.
» *lepidus* Fieb., Brosteni, Dealu Ursului.
» *variatus* Mey., Brosteni, vallée du Barnar, Dealu Ursului.
» *lapponicus* Reuter, Cruce.
» *piceæ* Reuter, id., Mont Rareu.
» *pinicola* Reuter, id.
» *roseus* Fall., id.
» *vitelinus* Schltz., id., Brosteni.
Tinicephalus hortulanus Mey., Mont Rareu.
Plagiognathus arbustorum Fab., Brosteni, Cruce.
» *viridulus* Fall., Mont Rareu.

- Plagiognathus albipennis* Fall., Brosteni.
Campylomma verbasci H.S., id.
Agalliastris saltitans Fall., Brosteni, vallée du Barnar.
» *pulicarius* Fall., id., Cruce.
» *pullus* Reuter, id.
Nepa cinerea L., id., Cruce.
Notonecta glauca L., id., id.
Corisa Geoffroyi Leach., Cruce.
» *dentipes* Thoms., id.
» *hieroglyphica* Duf., id.
» *Fabricii* Fieb., id.
» *concinna* Fieb., id.

Eurygaster Schreiberi.

(Pl. I, fig. 2). En ovale court, un peu plus large en arrière qu'en avant, d'un brun grisâtre à peu près uniforme. Tête trilobée en avant, joues de la même longueur que l'épistome qui est libre à son extrémité. Pronotum largement arrondi sur les côtés qui paraissent comme des marges aplanies, plus larges dans leur milieu aux deux extrémités du sillon transversal qui est très-peu apparent sur le disque. Écusson sans callosités à la base, orné longitudinalement sur le milieu d'une carène lisse, blanchâtre, comme dans *hottentotus*. Cories subitement rétrécies après leur tiers antérieur, par une sinuosité très-accentuée à angles légèrement obtus. Tête, pronotum, écusson et cories finement pointillés. Connexivum largement arrondi, fortement pointillé, ce qui rend la suture des segments à peine visible en dessus. Lames antépectorales ou bord antérieur des plogopleures moins avancé que dans *maurus*. Dernier arceau ventral ♀ plus profondément échancré que dans *maurus*. — L., 9 1/2 mill.

Cet insecte est assez voisin de *dilaticollis* Dohrn; il en diffère, outre sa couleur et son système de ponctuation, par la dilatation des côtés du pronotum et la sinuosité des cories qui sont beaucoup plus accusées; par la forme de l'écusson qui est aussi moins parallèle; chez *dilaticollis* il se rétrécit presque subitement près de l'extrémité, tandis que dans *Schreiberi* il diminue de largeur déjà vers les 3/5 de sa longueur, ce qui lui donne une forme plus acuminée. L'abdomen est aussi plus élargi chez ce dernier. L'insecte est moins épais que *maurus*, mais plus convexe que *hottentotus*.

Je le décris à regret sur un unique exemplaire provenant des chasses de M. G. Schreiber dans les environs de Gorice (Illyrie), et je me fais un plaisir de le dédier à ce zélé correspondant.

Eurygaster minor.

(Pl. I, fig. 3). Forme parallèle, rappelant assez celle de *maurus*, à côtés du pronotum droits depuis l'angle latéral jusqu'aux yeux, bord des cories également droit; il en diffère cependant au premier aspect par sa taille plus faible et plus étroite proportionnellement. L., 8 1/4 mill., larg., 4 3/4 aux angles latéraux du pronotum. D'un jaune d'ocre à peine brunâtre, à petits points noirs enfoncés, assez régulièrement espacés en dessus, un peu plus serrés sur la tête de chaque côté des sutures de l'épistome, formant ainsi deux lignes plus foncées qui se prolongent sur la partie antérieure du pronotum; ces points noirs sont aussi plus denses sur les côtés latéraux du pronotum qui paraissent rembrunis. Tête trilobée, épistome dépassant sensiblement les joues. Écusson à côtés parallèles, brusquement rétréci à l'extrémité qui est arrondie, dépassant notablement l'abdomen; orné à sa base de deux callosités blanchâtres et lisses comme dans *maurus*, à ligne médiane de même couleur que le fond, mais ponctuée sans être relevée en carène. Ventre rembruni, à points noirs moins également distribués que sur la partie supérieure. Dessous de la tête, poitrine et pattes également jaunes d'ocre, pointillés de noir comme le dessus, les points noirs plus serrés sur le milieu des diverses pièces du sternum qui paraissent bordées d'un liseré plus clair. Rostre atteignant les hanches postérieures. Segment génital ♂ creusé de deux fossettes qui se rejoignent au milieu près de la ligne extérieure, ce qui lui donne un aspect trilobé fortement accentué.

Ce curieux *Eurygaster*, le plus petit du genre, a été trouvé par M. Xamheu sur l'*Astrantia major*, près de Montélimar (Drôme).

J'ai reçu de notre regretté collègue O. Pirazzoli un *Eurygaster integriceps* Ochan., trouvé à la Sila (Calabre); je ne crois pas que cet insecte ait été signalé jusqu'à présent en Italie. Quelques auteurs ne voient en lui qu'une forme de *maurus*; il en diffère cependant, outre sa taille bien plus forte et les côtés du pronotum légèrement arrondis, par l'absence de tache formée de points noirs sur le dernier segment de l'abdomen devant l'échancrure du segment génital. Chez tous les exemplaires de *maurus* qui me sont passés sous les yeux, j'ai observé cette tache plus ou moins marquée, laquelle se prolonge souvent latéralement en avant en deux branches formées de points noirs enfoncés qui prennent la forme d'un V; parfois l'intérieur des branches est aussi complètement rembruni. L'*E. minor* décrit plus haut ne possède pas non plus cette tache.

DESCRIPTION D'UN NOUVEAU *BYTHINUS*

DU GROUPE DES *MACHÆRITES*

Par J. CROISSANDEAU.

Bythinus (Machærites) Argodi.

De forme robuste et convexe; testacé, brillant. Tête d'un tiers plus étroite que le corselet, plus longue que large; front avec une profonde impression lisse, en forme d'ogive; vertex peu convexe, moins brillant, à peine ruguleux, avec une fine carinule longitudinale; deux grandes fossettes interoculaires; base du vertex non impressionnée près de la carinule. Palpes maxillaires à 2^e article à peine cannelé en dessous, 3^e à peine râpeux, 4^e grand, subsécuroïde, obtus au sommet, égalant en longueur la moitié des antennes, très-finement pubescent. Antennes assez fortes, de la longueur environ de la tête et du corselet, finement pubescentes, à 1^{er} article épais, moitié plus long que large, 2^e oblong, 3^e moitié plus étroit que le 2^e, un peu plus court, 4^e et 5^e subégaux entre eux, 6^e et 7^e plus courts, 8^e et 9^e transverses, 10^e moitié plus grand, transverse; 11^e très-grand, assez court, pyriforme. Yeux noirs, petits, à grosses facettes; bord supérieur de ceux-ci et tempes ciliés de longs poils mous, assez denses. Corselet plus long que large, cordiforme, obsoletement quoique visiblement ponctué, entièrement frangé sur les côtés de poils mous analogues à ceux des tempes, mais plus courts; sillon antebasilaire transverse bien marqué. Élytres à pubescence longue, peu serrée, frangée sur les côtés; à ponctuation assez grosse, mais peu profonde et peu serrée; calus huméral saillant, oblique, limité en dedans par une fossette profonde, mais non prolongée au delà en impression sur le disque. Abdomen pubescent comme les élytres, non visiblement ponctué; segment de l'armure largement impressionné en dessus, lisse, ou bien (? ♂) avec quelques points épars. Pattes longues, grêles; cuisses légèrement renflées, inermes; tibias très-finement pubescents, sans épine, les postérieurs arqués au delà du 1^{er} tiers. — L., 1,7 mill.

M. Albert Argod a trouvé quelques exemplaires de cet insecte au fond d'une grotte du Vercors, en mai.

[*Note du Réd.* — L'espèce est surtout remarquable par sa longue pubescence qui forme une touffe derrière les yeux; je n'ai pu apercevoir de différences sexuelles notables chez les deux individus que j'ai examinés; la grosseur de leurs yeux notamment est identique. D'après une information de M. Argod, la ♀ se distinguerait du ♂ par le 1^{er} article des antennes beaucoup plus court et plus large.]