

431  
M76 Hhe

Montandon, 1893

Ann. Mus. Civ. Storia Nat. Genova

(2) 13: 294-298

on computer

Division of Hemiptera  
Department of Entomology  
U. S. National Museum

Cat.

## HÉMIPTÈRES DE LA S. FAM. DES PLATASPIDINAE

RECOLTÉS PAR M. LE D.<sup>r</sup> ELIO MODIGLIANI

À L'ÎLE D'ENGANO SUR LA CÔTE OCCIDENTALE DE SUMATRA

PAR A. L. MONTANDON



✓ **Spathocrates**, nov. gen. — Corps oblong, très-peu élargi en arrière, à cotés latéraux presque droits, subparallèles; légèrement convexe supérieurement, aplati en dessous.

Tête assez fortement dilatée, aussi large que la moitié de la largeur du pronotum en arrière et presque aussi longue que large; subpentagonale, profondément enfoncée dans une large échancrure du devant du pronotum; à cotés latéraux postérieurs très obliques. Ocelles distants, aussi éloignés entre eux que des yeux. Tylus assez long, un peu convexe, atténué à l'extrémité, plus court que les joues qui sont convergentes et un peu valvantes devant le tylus, subtronquées en avant où elles sont légèrement relevées en forme de gouttière. Yeux très-petits peu proéminents, collés à l'angle antérieur du pronotum. Insertion des antennes assez éloignée des yeux, mais plus près de ces derniers que du rostre. Premier article des antennes n'atteignant pas le bord antérieur de la tête, subégal en longueur aux articles 3, 4 ou 5 pris séparément; deuxième article très-court, à peine visible. Rostre assez long, dépassant un peu les hanches postérieures.

Pattes courtes, fémurs atteignant le niveau des cotés du corps; tibias peu profondément sillonnés, plus courts que les fémurs et plus de deux fois plus longs que les tarses.

- 294 -

\* off Sumatra

Orifices odorifiques plus éloignés des hanches que des cotés latéraux de la poitrine; prolongés d'un très-court sillon faiblement arqué. Poitrine et abdomen non sillonnés longitudinalement au milieu. Sixième segment ventral prolongé au milieu antérieurement en angle aigu n'atteignant pas la base du cinquième segment qui a elle même une échancrure arrondie au milieu. Stigmates très-petits, situés au bord externe des segments abdominaux sur la ligne légèrement enfoncée qui les separe de la marge abdominale.

Ce genre, très voisin des *Brachyplatys* Boisd., s'en distingue par sa forme plus allongée, par la forme de sa tête presque aussi longue que large, profondément enfoncée dans la vaste échancrure antérieure du pronotum, à cotés latéraux postérieurs très obliquement dirigés en arrière; par ses yeux très petits, subarrondis, non transverses.

✓ *Spathocrates atroæneus*, n. sp. — Entièrement d'un noir légèrement bronzé, finement et densément ponctué sur toute la partie supérieure, sauf le disque convexe de la partie postérieure de la tête, englobant le tylus; et, la région des cicatrices sur la partie antérieure du pronotum, qui sont presque lisses.

Dilatations latérales du pronotum peu étendues très obtusément arrondies, subtronquées au bord externe.

Écusson déprimé près de la base, de chaque côté, cette dépression se continuant vaguement sur le disque et légèrement arquée en arrière, derrière un espace basal non calleux et finement ponctué comme le reste de l'écusson. Ce dernier est assez profondément échancré au dessus des pièces génitales chez les ♂, très-obtusément sinué chez les ♀.

Dessous du corps noir, antennes, rostre et pattes brunâtres. Poitrine mate; abdomen assez brillant, finement et densément ridé longitudinalement; quelquefois un peu brunâtre foncé sur la marge abdominale. Pièce genitale ♀ petite, aussi étroite que l'espace interocellaire; ♂ en ovale transversal, posée obliquement à l'axe du corps avec une petite protubérance brunâtre

non située au milieu, mais touchant presque le bord antérieur; bord postérieur pubescent.

Longueur ♂  $4\frac{3}{4}$ -6 millim. ♀ 6-7  $\frac{1}{2}$  millimètres.

Largeur ♂ 3-4  $\frac{1}{4}$  millim. ♀ 3  $\frac{3}{4}$ -5 millimètres.

Un assez grand nombre d'exemplaires des deux sexes, Kifa-juc, Mai 1891 (1). Musée Civique de Gènes.

✓ *Brachyplatys WahlII* Fabr. — 9 exemplaires ♂ et ♀ Bua-Bua, Mai et Juin 1891. Musée Civique de Gènes.

✓ *Coptosoma Modiglianii*, n. sp. — Noir poli, brillant, sans ponctuation apparente, avec une double bordure jaunâtre clair, sur les cotés latéraux du pronotum; une petite tache jaune rougeâtre humérale en dedans de l'angle latéral et quelquefois deux petits traits, bruns-rougeâtres mal définis sur le disque du pronotum. Écusson bordé d'un fin liseré intramarginal jaune clair, atteignant de chaque côté la base où il se continue, rougeâtre, sinué en arrière près de l'angle antérieur et largement interrompu au milieu.

Tête noire, très-large, environ le tiers de la largeur du pronotum en arrière; yeux globuleux saillants, très-légèrement subconiques; ocelles assez rapprochés des yeux, l'espace compris entre l'ocelle et l'œil moins de deux fois le diamètre de l'ocelle. Joues peu proéminentes, s'avancant au devant des yeux un peu moins que la longueur du diamètre longitudinal de l'œil; non convergentes à l'extrémité. Tylus large, à cotés parallèles, nullement rétréci au sommet qui est très étroitement jaunâtre et dépasse légèrement le niveau antérieur des joues.

Pronotum très rétréci en avant, à surface très lisse, sans trace de ponctuation sur tout le disque. Expansions latérales faibles, imperceptiblement ponctuées. Une large tache jaune intramarginale recouvrant les cotés latéraux dont le bord externe reste très étroitement noir. Cette tache commence en avant der-

(1) Le Musée National Hongrois de Budapest possède aussi quelques exemplaires de cette espèce, provenant de Bornéo.

rière le bord antérieur très étroitement noir, depuis le niveau du côté interne des yeux, très étroite et parfois légèrement rougeâtre derrière l'œil, s'élargissant ensuite en se dirigeant obliquement depuis le niveau du milieu de l'œil jusque sous l'angle huméral du pronotum; un peu avant le milieu de son côté interne, cette tache envoie un petit prolongement jaunâtre en forme de dent. Parfois sur la ligne fictive tirée entre ces dents latérales on observe deux petites taches indécises rougeâtres, légèrement transversales, sur le disque du pronotum, mais beaucoup plus éloignées entre elles que de la dent jaune interne de la marge latérale dont elles sont par conséquent assez rapprochées. Sur les marges jaunes un large trait noir oblique assez éloigné du bord antérieur du pronotum, acuminé en arrière où il touche parfois le côté latéral au fond de la sinuosité devant l'angle huméral. En dedans de cet angle huméral une tache subarrondie, un peu indécise, à centre plus ou moins jaunâtre et bords rougeâtres.

Écusson parfaitement lisse, sans trace de callosité basilaire ni de dépression latérale au côté interne des angles antérieurs; bordé tout autour d'un liseré jaunâtre pâle, rougeâtre et un peu indécis à son bord interne, très finement pointillé de brunâtre, atteignant la base où il tourne sans interruption et se continue de chaque côté le long de la base avec une sinuosité qui le fait s'écarter de cette base sur un petit espace semicirculaire où il rougit et brunit parfois assez sensiblement, pour se terminer ensuite par une tache plus pâle, rougeâtre, parfois jaunâtre, près de la base, au sommet de la branche interne de la sinuosité; tout le milieu de la base de l'écusson restant assez largement, privée de liseré jaunâtre. Extrémité de l'écusson très-obtusement échancrée à l'extrémité chez les ♂ à liseré rétréci, un peu plus rougeâtre et parfois étroitement interrompu au devant de la sinuosité; largement arrondi chez les ♀ sans sinuosité ni rétrécissement du liseré.

Dessous de la tête brunâtre; dessous des dilatations latérales du pronotum largement jaunâtre; poitrine grisâtre. Rostre brun, assez long, dépassant les hanches postérieures. Antennes jaunâtres,

pâles à la base, un peu rembrunies vers l'extrémité. Pattes jaunâtres, courtes, extrême base des fémurs un peu rembrunie, sommet des fémurs n'atteignant pas les côtés latéraux des pièces de la poitrine; tibias sillonnés, les postérieurs pas plus longs que les fémurs.

Abdomen noir brillant, lisse, un peu ponctué au milieu du disque, surtout vers la base; avec la marge jaune et des taches de même couleur sur le bord des segments; ces taches doubles sur les deuxième, troisième et quatrième segments, simples et plus petites vers l'angle antérieur externe des cinquième et sixième segments.

Pièce génitale ♂ brunâtre, petite, aussi étroite que l'espace interocellaire, posée obliquement à l'axe du corps, un peu élargie et subtronquée à sa partie postérieure; sixième segment ventral prolongé en angle droit sur le milieu jusque près de la base du cinquième segment. Pièce génitale ♀ noire, très-étroite, sixième segment ventral un peu moins prolongé en avant que chez le ♂. Abdomen creusé d'un faible sillon longitudinal sur le milieu des cinq premiers segments dans les deux sexes.

Longueur  $3\frac{3}{4}$  - 4 millim.; largeur  $4 - 4\frac{1}{4}$  millimètres.

Un assez grand nombre d'exemplaires des deux sexes Kifa-juc, Mai 1891 (1). Musée Civique de Gênes.

Cette espèce ne rentre dans aucune des divisions de Stål. Elle viendra se placer dans une coupe spéciale qui est à intercaler à la suite de la division h. b. de l'éminent auteur Suédois.

✓ *Coptosoma lascivum* Bergroth, un seul exemplaire ♂ Kifa-juc, Mai 1891. Musée Civique de Gênes.

(1) Ma collection possède aussi deux exemplaires de cette espèce, provenant de Birmanie.

---

Estratto dagli Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova  
Serie 2.<sup>a</sup>, Vol. XIII (XXXIII) 5 Giugno 1893.

---

---

Genova — Tip. Sordo-muti