

Montandon, 1894
Ann. Mus. Civ. Storia Nat. Genova
(2) 14: 119-144

on computer

Cat.

16455

Division of Hemiptera
Department of Entomology
U. S. National Museum



VIAGGIO DI LEONARDO FEA
IN BIRMANIA E REGIONI VICINE



LVIII.

HÉMIPTÈRES DE LA S. FAM. DES PLATASPIDINAE

RÉCOLTÉS PAR M. LEONARDO FEA EN BIRMANIE ET RÉGIONS VOISINES.

PAR A. L. MONTANDON.

Cratoplatys, n. g.

De forme ovale, presque arrondie, déprimée, très-légèrement convexe supérieurement, complètement aplatie en dessous.

Tête très-large, presque aussi large que le pronotum, plus large que la longueur du pronotum sur la ligne médiane. Joux foliacées, très-étendues, convergentes et légèrement valvantes devant le tylus long, bien visible. Bord antérieur de la tête sub-semicirculaire en avant (♀). Distance des ocelles aux yeux environ une fois et demie la distance des ocelles entre eux.

Pronotum coupé presque droit en avant, très-obtusément échancré derrière la tête.

Antennes insérées à égale distance de l'œil et du canal rostral, à premier article très-long, le plus long de tous; le deuxième excessivement court, à peine visible; le troisième égal aux trois quarts du premier; le quatrième égal aux deux tiers

du troisième et le cinquième un peu plus court que le précédent et beaucoup plus grêle.

Pattes courtes; l'extrémité des fémurs n'atteignant pas les cotés des pièces de la poitrine; tibiais sillonnés, plus courts que les fémurs, surtout aux deux paires antérieures.

Rostre dépassant les hanches intermédiaires.

Orifices odorifiques situés plus près des anches que du bord externe des metapleures; suivis d'un long canal linéaire arqué dont l'extrémité atteint l'angle antérieur externe des métapleures.

Abdomen entièrement plat, stigmates non placés sur les flancs de l'abdomen, mais en dehors du rebord calleux, près de la marge extérieure.

Ce nouveau genre a des grandes affinités avec *Heterocrates*, *Handlirschiella* et *Aphanopneuma* et forme avec eux un groupe spécial à tête très-large, à ocelles moins éloignés entre eux que des yeux, et à stigmates situés sur la marge abdominale. Il diffère de ces trois genres par sa forme élargie, de *Heterocrates* et *Handlirschiella* par son pronotum presque droit en avant et de *Aphanopneuma* par ses antennes atténuées à l'extrémité, à troisième article sensiblement plus court que le premier et par la position des ocelles plus éloignés entre eux.

✓ 1. *Cratoplatys Gestroi*, n. sp.

Noir poli, brillant, avec une très-légère ponctuation fine et espacée sur les cotés de l'écusson; tête (♀) semicirculaire en avant, joues légèrement ridées longitudinalement; un trait jaune de chaque côté près de la base de la tête, partant depuis devant les ocelles jusqu'au devant des yeux; deux autres petits traits jaunes, en parenthèse sur les joues, un de chaque côté du tylus, se rejoignant en arrière derrière la base du tylus.

Pronotum avec un fin trait jaune de chaque côté sur les dilatations latérales en dedans de l'extrême bord externe finement noir; une autre ligne jaune étroite, légèrement ondulée, côtoyant la partie interne des expansions latérales très-larges, noires et légèrement ridées; un point jaune intramarginal sur

le devant du pronotum de chaque côté derrière le niveau des ocelles.

Écusson bordé tout autour, sauf la base, d'un très-fin liseré jaune intramarginal; un point jaune de chaque côté près de la base, sur l'extrémité du bourrelet basilaire très-faiblement accusé latéralement par une légère dépression et quelques points enfoncés un peu mieux marqués.

Partie visible des élytres avec une étroite bordure jaune intramarginale, limitée intérieurement par une forte strie noire qui est de nouveau bordée d'un trait jaune à sa partie interne.

Dessous du corps entièrement noir, mat sur la poitrine, brillant sur l'abdomen, ce dernier finement ridé longitudinalement.

Base de la tête en dessous avec une tache jaune. Premier articles des antennes, jaune, long, atteignant presque en avant le niveau du bord antérieur des joues; deuxième article très court, brunâtre; les trois derniers articles noirs couverts de petites soies blondes très courtes, extrême sommet des articles 3 et 4 étroitement jaunâtre.

Rostre jaune brunâtre. Pattes brunâtres avec la partie inférieure des fémurs et un trait sur la moitié apicale de leur partie supérieure, jaunâtres; tibiais fortement sillonnés, jaunâtres sur les arêtes de chaque côté du sillon; tarsi bruns; hanches brunâtres.

Parties latérales dilatées du pronotum, en dessous, avec une bordure jaune intramarginale, cette bordure se continuant sous le dessous du bourrelet élytral.

Canal des orifices odorifiques jaune sur les deux tiers apicaux. Extrême bord de la marge abdominale finement jaune et deux traits jaunes longitudinaux sur chaque segment en dedans de la marge.

Longueur 11 $\frac{1}{4}$ mill., largeur 8 $\frac{3}{4}$ millimètres.

Palon, Pegou, un seul exemplaire ♀. — Musée Civique de Gènes.

Au premier aspect cet insecte pourrait être pris pour une grosse espèce très-deprimée du genre *Brachyplatys*, dont il s'éloigne par les dimensions amplifiées de la tête et la position rapprochée des ocelles.

2. *Brachyplatys punctipes*, FIEB.

Largement ovale, légèrement convexe, bronzé foncé avec une ponctuation fine et assez dense; tête un peu moins des deux tiers de la largeur du pronotum, fortement ponctuée, ridée, subrugueuse en avant, presque lisse sur le vertex, avec deux petites taches jaunes, une de chaque côté du tylus et quatre autres taches de même couleur en arrière, deux de chaque côté sur la base des joues au côté interne de l'œil; ces deux taches de chaque côté sont quelquefois reliées entre elles et forment un trait un peu élargi aux extrémités; parfois aussi la petite tache extérieure manque, et il n'y a plus qu'un point jaune au devant des ocelles; les deux taches antérieures situées une de chaque côté du tylus sont quelquefois réduites à des points presque imperceptibles et chez les exemplaires où les taches sont au contraire bien accentuées on observe aussi deux petits traits jaunes longitudinaux, parfois soudés ensemble sur le tylus au niveau des deux taches antérieures des joues.

Pronotum finement et assez densément ponctué avec le milieu du disque presque lisse et deux plaques lissés, une de chaque côté au devant du milieu sur la région des cicatrices; une très fine bordure jaune intramarginale sur le devant du pronotum, dirigée ensuite obliquement en arrière depuis le niveau de la partie comprise entre l'œil et l'ocelle, jusqu'au devant de l'angle latéral du pronotum; une autre petite ligne, étroite, jaune, intramarginale sur le bord des dilatations latérales, atteignant antérieurement au niveau du côté externe de l'œil. La ligne du bord antérieur est parfois très réduite, à peine visible et peut manquer même totalement.

Partie visible de l'élytre avec un trait jaune intramarginal le long du bord externe et une petite tache jaune à l'angle interne.

Écusson assez densément ponctué tout autour, presque lisse vers le milieu de la base et sur le disque, avec quatre points jaunes le long de la base, deux de chaque côté, l'un touchant presque l'angle antérieur externe, l'autre vers l'extrémité de la

callosité basilaire qui est légèrement indiquée de chaque côté par une assez faible dépression; la distance qui sépare les deux taches intermédiaires près de trois fois plus grande que celle qui sépare les taches de chaque côté; à peu près comme chez *B. VahlII*, Fab., de même qu'un double liseré jaune, ces liserés très-étroits, sur les côtés latéraux et postérieur, n'atteignant pas tout à fait la base de l'écusson. Au dessous des pièces génitales, l'écusson est profondément échancré chez le ♂, très largement arrondi, subtronqué chez la ♀.

Antennes presque entièrement noires, avec le premier article, la base du troisième et les deux dernières sutures très étroitement jaunes pâles. Dessous de la tête noir tout autour, jaunâtre, clair au milieu avec le rostre jaunâtre, rembruni à l'extrémité qui dépasse les hanches postérieures. Poitrine noirâtre, mate, avec les hanches jaunâtres pâles et le prosthetium presque entièrement jaune rougeâtre; une tache noire sur les dilatations latérales qui sont bordées d'un fin liseré intramarginal jaunâtre.

Partie postérieure des metapleures parfois aussi étroitement rougeâtre.

Orifices odorifiques plus éloignés des hanches que des côtés de la poitrine, suivis d'un canal arqué en avant, court, élargi et jaune à l'extrémité. Pattes jaunâtres; fémurs couverts d'une ponctuation brunâtre disposée en lignes assez régulières; deux petits traits brunâtres vers l'extrémité, un de chaque côté de la tranche supérieure, la tranche inférieure étroitement ainsi que l'extrémité des fémurs très-étroitement brunâtres; tibias avec les sillons et la tranche inférieure ainsi que quelques points sur les côtés, brunâtres. Extrémité des articles des tarsi légèrement rembrunis, ongles bruns foncés.

Abdomen brillant, presque lisse, très-finement et assez superficiellement ridé longitudinalement, largement jaune sur les bords, noir sur le disque qui émet des rayons allant jusque près de la marge abdominale. Chez les ♂ le disque noir est un peu plus large et les rayons existent sur les sutures et sur le milieu de chacun des segments; chez les ♀ les taches jaunes traversées transversalement par un trait noir sont le plus souvent soudées

deux à deux à leur partie interne dont le sommet est comme tronqué, sur chaque segment et les rayons émanant du disque noir suivent, seulement les sutures, au moins sur les trois premiers segments. La tache jaune antérieure de chaque segment est ornée d'un petit point noir, non loin de la marge.

Marge abdominale jaune avec une série de points noirs assez réguliers et en chapelet à sa partie interne. Sixième segment ventral entièrement lisse, pièce génitale petite, guère plus large que l'espace interocellaire, noire à la base, jaunâtre à l'extrémité.

Longueur ♂ 7, ♀ $8\frac{1}{3}$ -9 mill.; largeur ♂ $5\frac{3}{5}$, ♀ $7\frac{1}{3}$ - $7\frac{1}{2}$ millimètres.

Montagnes des Carin, district des Carin Cheba, alt. 900-1100 m. — Musée Civique de Gênes.

C'est sur un exemplaire baptisé par Fieber étiqueté: *India*, et appartenant à la collection de M. le D.^r Reuter, que j'ai pu identifier cette belle et grande espèce, dont le dessin sur le pronotum sauf les taches discoïdales, sur l'écusson et sur l'abdomen, est assez semblable à celui de *B. Vahlü*, Fab., de même que la coloration et la ponctuation des pattes qui est cependant moins accentuée chez *B. Vahlü*, Fab.; mais outre les différences qui existent pour les taches de la tête, la ponctuation est plus forte sur toute la surface de *B. punctipes*, Fieb. dont la taille est aussi plus grande et proportionnellement moins convexe (1).

✓ 3. *Brachyplatys subaeneus*, WESTW. VAR.

Birmanie: Bhamo, Teinzo, Metanja. Tenasserim: Meetan, Kawkareet.

Musée Civique de Gênes.

✓ 4. *Coptosoma duodecimpunctatum*, GERM.

Pegou: Palon. — Musée Civique de Gênes.

(1) J'ai aussi observé un exemplaire ♀ de cette espèce, étiqueté de Java, appartenant aux collections du Musée Royal d'hist. Nat. de Belgique.

✓ 5. *Coptosoma Lethierryi*, MONTAND.

Montagnes des Carin, district des Carin Cheba, altitude 900-1100 mètres.

Musée Civique de Gênes.

La description de cette magnifique espèce (V. Rev. d'Ent. 1892, p. 284) est incomplète; le type unique ♀ de la collection de M. Lethierry, n'était pas de première fraîcheur et ses couleurs étaient un peu altérées, surtout sur la partie rouge de la corie qu'était très rembrunie, peu distincte. Chez les exemplaires récoltés par M. L. Fea, la teinte générale est un peu plus claire, non bronzée, violacée, foncée, mais d'un beau violet métallique, un peu lilas et la marge de la corie d'un beau rouge légèrement carminé. Le ♂ est de plus petite taille que la ♀ seulement 4 millimètres de longueur et l'écusson est obtusément échancré à l'extrémité au dessus des pièces génitales.

Sa place est auprès des *C. duodecimpunctatum*, Germ. et *C. denticeps*, Mont. à tête non proeminente au devant des yeux et sans traces de sillons transverses sur le pronotum et la base de l'écusson.

✓ 6. *Coptosoma cribrarium*, FAB.

Birmanie: Metanja, Swegoo, Bhamo.

Montagnes des Carin, district des Carin Cheba. 900-1100 mètres d'altitude.

Musée Civique de Gênes.

✓ 7. *Coptosoma pardalinum*, STÅL.

Tenasserim: Meetan, Vallée de l'Houngdarau.

Musée Civique de Gênes.

Chez cette espèce (comparée au type de Stål) les points noirs formant taches, sont plus ou moins confluent, très-variables.

8. *Coptosoma solitarium*, n. sp.

Subarrondi, très-peu élargi postérieurement, flave jaunâtre pointillé de noir. Tête petite très-étroite, très-proéminente au devant des yeux, joues allongées à peine convergentes à l'extrémité, tylus aussi long que les joues, un peu atténué au sommet; yeux médiocres, très-peu saillants, espace interoculaire un peu plus de deux fois le diamètre de l'œil. Bord externe des joues très étroitement noir, tylus rembruni, plus clair à l'extrémité; deux taches noires triangulaires sur la base de la tête, une de chaque côté couvrant la région des ocellus.

Pronotum étroitement noir sur le bord antérieur, lisse sur la moitié antérieure avec une fine ligne noire oblique à la partie interne des dilatations latérales; une large ligne noirâtre transversale, ondulée, en circonflexe de chaque côté, envoyant au milieu en arrière deux prolongements assez rapprochés l'un de l'autre qui se relie à une ligne médiane transversale assez régulière de points noirs enfoncés, étroitement interrompue au milieu. Partie postérieure du pronotum irrégulièrement parsemée de points noirs enfoncés qui laissent entre eux des plaques et une ligne médiane longitudinale lisses. Bord postérieur du pronotum étroitement noir depuis les angles latéraux.

Callosité basilaire de l'écusson bien marquée, étroite, à peu près lisse avec quelques vagues points brunâtres sur le milieu, limitée en arrière par une forte ligne enfoncée, noire, ininterrompue.

De chaque côté en dehors des extrémités de la callosité une petite plaque lisse très-transverse limitée aussi en arrière d'une fine ligne noire enfoncée suit la base de l'écusson jusqu'à l'angle antérieur externe d'où part le long des côtés latéraux une autre ligne enfoncée noirâtre qui arrive jusque derrière les angles postérieurs, laissant ainsi sur les côtés latéraux une étroite marge lisse qui ressort en bourrelet. Surface de l'écusson couverte de points noirs enfoncés très-irrégulièrement distribués laissant entre eux d'assez grands espaces lisses.

Partie visible de la corie un peu rembrunie.

Dessous de la tête et des marges latérales du pronotum jaunâtres; poitrine noire grisâtre, mate; orifices odorifiques situés à égale distance des hanches et des côtés de la poitrine, suivis d'un très-court sillon un peu arqué qui n'atteint pas l'angle antérieur externe des métapleures. Antennes, rostre et pattes jaunâtres, tibias non sillonnés. Abdomen jaunâtre lisse sauf des points en ligne le long de la suture des segments qui est noire ainsi qu'une ligne transversale sur le milieu de chacun des segments et une large ligne longitudinale sur le milieu du disque, également noire.

1 seul exemplaire ♀ longueur 3 mill. largeur $2\frac{4}{5}$ millimètres.

Birmanie: Shwegoo. — Musée Civique de Gènes.

Cet insecte ne rentre dans aucune des divisions de Stål, il viendra se ranger en compagnie des *C. atomarium*, Germ. et *C. respersum*, Bergr. qui ont aussi la tête étroite, très proéminente et atténuée en avant, avec les joues distantes, non confluentes, devant le tylus. De beaucoup plus petite taille que cette dernière espèce, il diffère de la première par la callosité basale de l'écusson beaucoup plus étroite et les taches jaunes qui ont envahi presque tout l'abdomen.

9. *Coptosoma tenasserimense*, n. sp.

Subarrondi, flavescent, brillant, ponctué et taché de noir bronzé. Tête petite, étroite, lisse, assez proéminente au devant des yeux; joues jaunes depuis le niveau du milieu des yeux sauf le bord externe très-étroitement noir, très-légèrement convergentes à l'extrémité, pas plus longues que le tylus qui est imperceptiblement rétréci au sommet, noir bronzé, ainsi que la partie postérieure de la tête avec une petite tache jaunâtre allongée sur le vertex derrière la base du tylus; yeux petits, peu proéminents, espace interoculaire plus de deux fois le diamètre de l'œil.

Pronotum jaune pâle sur sa partie antérieure avec les bords très-étroitement noirs, une petite ligne oblique, noire, ponctuée, de chaque côté à la partie interne des dilatations latérales, n'atteignant pas postérieurement le bord latéral du pronotum; ces

dilatations assez fortes, arrondies extérieurement, et une large bande noire transversale, en circonflexe de chaque côté, reliée au milieu en avant au bord antérieur et en arrière à la seconde moitié du pronotum par un petit trait noir. Sillon transversal marqué par des points noirs disposés en ligne pas très-régulière; seconde moitié du pronotum flave, ponctuée de noir, avec une tache rembrunie sur les angles latéraux et une tache noire le long de la base, s'étendant un peu sur le disque.

Callosité basilaire de l'écusson lisse, peu proéminente mais bien limitée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue, noire bronzée sur le milieu et les deux extrémités avec une large tache flave jaunâtre transversale de chaque côté. Une petite tache transversale jaunâtre de chaque côté sur la base de l'écusson en dehors des extrémités de la callosité. La surface de l'écusson flave, imponctuée sur une étroite bande extérieure, densément et irrégulièrement ponctuée de points enfoncés noirs bronzés sur le disque, cette ponctuation laissant des plaques flaves, lisses; et une tache noire bronzée peu étendue sur le milieu du disque derrière le centre noir de la callosité basilaire. Ecusson ♀, très largement arrondi à l'extrémité. Marge élytrale jaunâtre pâle, imponctuée.

Dessous de la tête et des marges latérales du pronotum, antennes, rostre et pattes jaunâtres, tibias non sillonnés. Poitrine mate grisâtre. Orifices odorifiques placés à égale distance des hanches et des côtés de la poitrine, suivis d'un très-court sillon arqué qui n'atteint pas l'angle antérieur externe des métapleures.

Abdomen noir brillant, finement aciculé ponctué sur la partie postérieure des segments avec la marge jaune coupée d'un fin trait noir transversal vis à vis de la suture des segments abdominaux; deux taches jaunes triangulaires sur le bord de chacun des segments, l'antérieure beaucoup plus grande que la postérieure et comme soudées ensemble.

1 exemplaire ♀ long. 3 mill., largeur $2\frac{4}{5}$ millimètres.

Tenasserim: Aswon. — Musée Civique de Gènes.

Cette espèce aurait assez l'apparence d'une variété claire de *C. pulchellum*, Montand. décrit plus loin, où le jaune aurait fait

beaucoup d'envahissements; elle en diffère en outre par la ponctuation aciculée de l'abdomen.

10. *Coptosoma caudatum*, n. sp.

Subpentagonal, aussi large postérieurement que long, brillant, presque lisse, très-finement ponctué, noir avec des taches jaunes disposées comme chez le type de *C. variegatum*, HS. sur la tête, le pronotum et la base de l'écusson, le pourtour de ce dernier très large postérieurement, plus étroit sur les côtés, jaune, finement mais densément ponctué de noir avec une tache noire subarrondie au niveau des angles postérieurs.

Tête petite, lisse, noire, rétrécie au devant des yeux où les joues jaunes sauf la bordure étroitement noire sont un peu convergentes au sommet; tylus noir, ridé transversalement, aussi long que les joues et à peine rétréci à l'extrémité qui est étroitement jaune; yeux globuleux, assez proéminents, espace interoculaire deux fois plus large que le diamètre de l'œil.

Pronotum presque lisse, imperceptiblement ponctué sauf de chaque côté sur la dépression transversale qui accuse légèrement les extrémités d'un sillon médian transversal totalement obsolète sur le disque. Deux taches jaunes transversales au bord antérieur derrière l'extrême bord étroitement noir, se rejoignant latéralement à la marge jaune très-large qui est coupée obliquement par une ligne enfoncée noire, n'atteignant pas en arrière la marge latérale du pronotum. Au milieu de sa partie interne la marge latérale jaune est dilatée et s'avance en pointe à la rencontre des taches jaunes transversales posées une de chaque côté sur le disque au devant de la dépression du milieu des côtés du pronotum; ces taches transversales sont parfois très étroitement reliées avec la marge et s'étendent aussi par exception un peu irrégulièrement en arrière où elles sont alors assez densément pointillées de noir. Une tache jaune un peu longitudinale, le plus souvent subtriangulaire, de chaque côté, derrière l'angle latéral du pronotum.

Partie visible de l'élytre jaune, en dedans du bord externe

étroitement noir. Ecusson très-transverse, élargi postérieurement, avec une grande tache noire tenant toute la largeur de la base et s'avancant, arrondie en arrière sur plus de la moitié du disque de l'écusson, surtout chez les ♂, laissant toute la partie postérieure très-largement, et partie des cotés latéraux jaunes, pointillés de noir avec une tache noire ovale au niveau des angles postérieurs. Cette tache noire située en dedans d'un liseré imponctué qui borde les cotés latéraux et postérieurs de l'écusson est parfois réduite, surtout chez les ♀ à un simple trait noir légèrement renflé au milieu et a des tendances à disparaître. Chez les ♂ au contraire elle a des tendances à s'agrandir et à rejoindre la partie noire du disque, aussi un peu envahissante, avec laquelle elle est parfois reliée. Callosité basilaire de l'écusson peu accentuée, mais bien limitée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue, avec deux larges taches transversales jaunes, une de chaque coté; et, en dehors de la callosité, un petit trait jaune transversal de chaque coté sur la base de l'écusson.

Chez les ♂ l'échancrure du sommet de l'écusson, large et profonde est munie au milieu d'une petite dent aigüe dirigée en arrière; chez les ♀ l'écusson est largement arrondi en arrière.

Dessous de la tête et des dilatations laterales du pronotum jaunâtres pâles. Antennes et pattes jaunâtres, base des fémurs étroitement rembrunie, tibia non sillonnés. Rostre brunâtre.

Poitrine grisâtre, orifices odorifiques situés au milieu des métapleures, suivis d'un très-court sillon qui n'atteint pas l'angle antérieur externe de la pièce métapleurale. Angle postérieur externe des métapleures brunâtre. Abdomen noir brillant, finement ponctué avec la marge et une tache jaune longitudinale sur le bord de chacun des segments; cette tache plus ou moins régulièrement tridentée à sa partie interne est plus large chez les ♀, très étroite chez les ♂. Pièce génitale ♂ très grande, plus large que la tête avec les yeux, posée presque perpendiculairement à l'axe du corps, avec une profonde échancrure triangulaire au milieu de sa partie inférieure.

Aussi long que large postérieurement ♂ $3 - 3\frac{1}{5}$ mill.; ♀ $3\frac{1}{3} - 3\frac{1}{2}$ mill.

Montagnes des Carin, district des Carin Cheba. 900-1100 mètres d'altitude; un assez grand nombre d'exemplaires. — Musée Civique de Gènes.

Cette espèce est très voisine pour la forme comme aussi pour la coloration de la tête et du pronotum de *C. lascivum*, Bergr. dont elle a en outre la pièce génitale ♂ très grande, échancrée à sa partie inférieure, et la petite dent au fond de l'échancrure de l'écusson; elle en diffère par la taille un peu plus forte et le mode de coloration de l'écusson qui est presque identique à celui de *C. erosum*, Montand. décrit plus loin; mais ce dernier, de taille plus faible a aussi la pièce génitale ♂ beaucoup plus petite proportionnellement. Elle ressemble aussi pour la disposition des couleurs à *C. assamense*, Atk. mais elle est un peu plus grande et la tache noire de l'écusson envahit une plus grande surface.

11. *Coptosoma erosum*, n. sp.

Aussi large que long, de forme subarrondie chez les ♀, largement tronquée en arrière chez les ♂. Noir, brillant, à peine bronzé, très finement et peu densément ponctué avec des taches jaunes disposées à peu près comme chez l'espèce précédente.

Tête noire, lisse, brillante, étroite, proéminente au devant des yeux où les joues jaunes depuis un peu au devant du niveau du milieu des yeux, sont très-légèrement convergentes au sommet et à bord externe très étroitement noir; tylus noir aussi long que les joues, à peine rétréci à l'extrémité; espace interoculaire un peu plus de deux fois plus large que le diamètre transversal de l'œil.

Pronotum noir, brillant, presque imperceptiblement ponctué avec une dépression transversale très-superficielle sur le milieu de chaque coté où la ponctuation un peu plus visible se continue très-faible sur le disque. Deux taches jaunes transversales sur le bord antérieur, derrière la marge très étroitement noire, une de chaque coté prenant intérieurement depuis le niveau des ocelles et rejoignant extérieurement le large bord jaune latéral qui est coupé obliquement par une ligne noire de points enfoncés qui n'atteint pas en arrière le bord lateral du pronotum dont la marge reste aussi très étroitement noire. Sur le disque une

large ligne jaune transversale, interrompue au milieu et ne touchant pas tout à fait sur les cotés l'angle saillant du milieu de la bordure jaune latérale. Une tache jaune subarrondie de chaque côté derrière l'angle huméral du pronotum; le sommet de cet angle est quelquefois aussi brunâtre.

Écusson noir, à callosité basilaire faible mais assez bien limitée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue, plus faible sur le milieu du disque; une large tache jaune transversale à chaque extrémité de la callosité, l'espace compris entre ces deux taches généralement un peu plus large que les taches; et une autre petite tache jaune triangulaire, très transverse, de chaque côté de la base de l'écusson, en dehors des extrémités de la callosité. Un assez large liseré jaune sur le pourtour extérieur, depuis la base de l'écusson. De chaque côté, en dedans du liseré jaune, au devant des angles postérieurs et postérieurement derrière ces angles, la teinte jaune assez densément ponctuée de noir s'avance plus ou moins sur le disque de l'écusson, de façon à se rejoindre derrière une tache noire subarrondie qui reste toujours à l'angle postérieur en dedans du liseré jaune; parfois, surtout chez les ♂ cette tache noire est plus ou moins largement soudée à la teinte noire du disque et l'on trouve même des exemplaires où la teinte jaune s'étend très peu sur les cotés latéraux et où au contraire la couleur noire du disque arrive presque jusqu'au limbe jaune marginal, érodée seulement sur ses bords. Sur la partie postérieure de l'écusson la teinte jaune ponctuée de noir s'avance généralement davantage et lorsque le noir empiète il laisse une petite ligne médiane longitudinale jaune qui s'avance sur la partie postérieure du disque et le bord postérieur est toujours assez fortement érodé devant le limbe jaune externe.

Marge élytrale jaunâtre pâle. Antennes et pattes jaunes, tibias non sillonnés, rostre brunâtre.

Dessous de la tête avec une petite tache jaune de chaque côté; dessous des dilatations latérales du pronotum bordé de jaune; poitrine grisâtre, mate; abdomen noir brillant avec une très fine ponctuation rangée en lignes transversales. Marge ab-

dominale jaune et une tache calleuse de même couleur, subtriangulaire et plus ou moins échancrée à la partie interne, sur le bord de chaque segment.

Pièce génitale ♂ un peu plus étroite que la tête avec les yeux, légèrement transversale, posée perpendiculairement à l'axe du corps. Sommet de l'écusson ♂ très obtusement échancré au dessus de la pièce génitale, largement arrondi en arrière chez la ♀.

♂ $2\frac{1}{2}$ - $2\frac{3}{5}$ mill. — ♀ $2\frac{4}{5}$ - $3\frac{1}{5}$ millimètres.

Montagnes des Carin, district des Carin Cheba. 900 - 1100 mètres d'altitude. 8 exemplaires. — Musée Civique de Gênes.

Très voisine de *C. variegatum*, H. S. dont la pièce génitale est aussi conformée de même façon, cette nouvelle espèce en diffère par la taille légèrement plus forte, moins différente entre les sexes et par la distribution des couleurs sur l'écusson où le jaune finement et assez densément ponctué de noir tend à envahir, en dedans du limbe jaune extérieur, sur les cotés latéraux et postérieur du disque de l'écusson. On ne saurait la rapporter à *C. vermiculatum*, Germ. de taille beaucoup plus grande, 4 - $4\frac{1}{2}$ millimètres et dont le pronotum est immaculé sur le disque comme aux angles latéraux. Il se pourrait que ce soit cette espèce que Vollenhoven a rapportée à tort à *C. vermiculatum*, Germ.; mais cette dénomination ne saurait convenir à l'insecte qu'il a décrit et doit par conséquent être changée.

12. *Coptosoma W.* MONTAND.

Birmanie: Bhamo. 1 seul exemplaire ♀.

Musée Civique de Gênes.

13. *Coptosoma Nepalense*, WESTW. var. ?

Birmanie: Bhamo. 1 seul exemplaire ♂.

Musée Civique de Gênes.

$3\frac{1}{2}$ millim. longueur. Diffère de la description de Westwood par les taches de la callosité basilaire de l'écusson, assez grandes, et une autre petite tache jaune, transversale, de chaque côté sur la base de l'écusson en dehors des extrémités de la callosité basilaire. C'est peut être à tort qu'on a réuni les *C. Nepalense*,

Westw. et *C. circumscriptum*, Germ.; ce dernier est plus grand et n'a pas de taches sur la base de l'écusson.

✓ 14. *Coptosoma variegatum*, H. S.

Birmanie: Bhamo, Shwegoo.

Pegou: Toungoo.

Montagnes des Carin, district des Carin Cheba (900-1100 mètres), des Carin Asciiui Cheba et des Carin Asciiui Ghecu.

Tenasserim: Malewoon.

Nombreux exemplaires. Musée Civique de Gènes.

C'est à tort, je crois, que cette espèce a été identifiée au *C. cinctum*, Esch. Chez cette dernière l'écusson est parsemé de petites taches jaunes lisses, irrégulières, plus ou moins nombreuses et confluentes; chez les exemplaires où ces taches jaunes sont en petit nombre et ne s'avancent pas sur le disque de l'écusson il en reste assez postérieurement le long du limbe pour donner à ce dernier un aspect très irrégulier, fortement déchiqueté à son côté interne; la bande jaune transversale sur la callosité basilaire du pronotum est le plus souvent entière, parfois à peine interrompue au milieu; la ponctuation des parties noires paraît aussi un peu plus forte et la taille de l'insecte sur une série d'exemplaires des Musées de Vienne et de Bruxelles que j'ai pu examiner est généralement un peu plus faible; les plus gros individus ♀ sont plus petits que les ♀ de *C. variegatum*, H. S. et ne dépassent guère la taille des exemplaires ♂ de cette dernière espèce.

La description de *C. seminulum*, Burm. 1834, se rapporte à n'en pas douter à l'insecte décrit par Eschscholtz en 1822, à la suite duquel l'espèce de Burmeister doit par conséquent figurer comme synonymie. Quant au vrai *C. variegatum*, H. S. dont les ♂ varient de $2\frac{1}{5}$ à $2\frac{1}{3}$ millimètres et les ♀ de $2\frac{1}{2}$ à 3 millimètres de longueur, et que je conserve malgré l'identification que son auteur lui-même a cru devoir faire avec *C. cinctum*, Esch., tout en signalant cependant les taches jaunes parsemées sur l'écusson de l'exemplaire d'Eschscholtz qu'il avait eu sous les yeux; il est probable que de nouvelles scissions devront démembrer

encore cette espèce lorsqu'on aura pu étudier de plus grandes séries d'individus. On constate en effet des différences assez marquées non seulement parmi les exemplaires de sources diverses, mais aussi parmi ceux d'une même provenance.

La bande jaune interrompue au milieu sur le bord antérieur du pronotum qui est reliée latéralement, chez le type, avec le double liseré des cotés du pronotum, en est parfois séparée et réduite à une simple tache derrière le niveau de la partie comprise entre l'ocelle et le côté interne de l'œil. Les deux traits jaunes transversaux qui forment une bande interrompue sur le disque du pronotum, bien marqués chez le type, peuvent être reliés ou non aux liserés latéraux; l'interruption du milieu plus ou moins large; et ces traits parfois très atténués, remplacés par de très petites taches jaunes atrophiées, disparaissent aussi complètement. Le trait noir oblique qui sépare le double liseré latéral est presque toujours assez fortement accentué et atteint le bord antérieur du pronotum.

La petite tache jaune subarrondie de l'angle huméral du pronotum est toujours bien visible, parfois agrandie, envahissante, et rejoignant en avant le liseré jaune du bord latéral. Les taches transversales de la callosité basale de l'écusson toujours séparées au milieu bien que parfois très rapprochées entre elles, se réduisent souvent à un simple point jaune près des extrémités de la callosité; et le liseré des cotés latéraux et postérieur de l'écusson présente des différences assez sensibles, non seulement dans sa largeur, mais aussi dans sa forme plus ou moins nettement arrêtée tout autour, avec ou sans ponctuation brunâtre et fine sur la partie interne du liseré; ce dernier est souvent plus large postérieurement que sur les cotés latéraux mais il n'est jamais brusquement rétréci derrière les cotés latéraux au niveau des angles postérieurs (1).

(1) Je sépare dès maintenant sous le nom de *C. latifolium*, n. sp. une forme des Iles Philippines, appartenant aux collections du K. K. Hofmuseum de Vienne, où elle se trouvait rapportée à tort à *C. seminulum*, Burm. et *C. cinctum*, ce dernier nommé par Mayr, très voisine et assez semblable en effet, même pour la disposition des couleurs, aux exemplaires les mieux marqués de jaune du *C. variegatum*, H. S., mais dont la tache jaune de la callosité basilaire de l'écusson est entière ou à peine

C. patricinctum Mont.

C'est évidemment cette espèce de 3 millimètres que Vollenhoven a identifiée à tort à *C. cinctum*, Esch. et non pas le *C. nepalense*, Westw. comme l'a cru Stål, car cette dernière espèce est de taille sensiblement plus forte et les taches jaunes du disque et de l'angle huméral du pronotum manquent entièrement.

La synonymie serait donc à rétablir ainsi:

C. cinctum, Esch. 1822.
= *semitulum*, Burm. 1834.

C. variegatum, H. S. 1839.
= *cinctum*, Volleh. 1863.

Dans diverses collections j'ai trouvé des exemplaires de *C. variegatum*, H. S. variété sans traits jaunes sur le disque du pronotum, qui étaient étiquetés *C. circumscriptum*, Germ., nom qui ne saurait leur convenir car cette dernière espèce est aussi sensiblement plus grande comme l'a très-bien compris Stål qui l'a identifiée à *C. nepalense*, Westw. Les descriptions de ces deux espèces *C. circumscriptum*, Germ. et *C. nepalense*, Westw. sont bien à peu près identiques, mais Dallas qui les a vues les deux, ne les a cependant pas réunies. C'est là un point qui reste encore à vérifier.

15. *Coptosoma pulchellum*, n. sp.

Subarrondi, un peu élargi en arrière, noir bronzé sur la tête, le pronotum et le milieu du disque de l'écusson avec deux petites taches sur la tête, les cotés du pronotum avec des lignes et taches jaunâtres, l'écusson jaunâtre, couvert d'une ponctuation noirâtre assez forte et dense tout autour sauf à la base où se

interrompt au milieu, et le limbe très élargi, surtout postérieurement, lisse et assez nettement arrêté à sa partie interne est échancré chez le ♂ par une tacole noire reliée à la partie noire du disque qui rétrécit le liseré de plus de moitié de sa largeur au niveau des angles postérieurs; chez la ♀, le limbe très large et entier est orné au niveau des angles postérieurs d'une tache noire indépendante. Au milieu de la partie postérieure le limbe s'avance en pointe sur la partie noire du disque d'une façon plus accentuée que chez les vrais *C. variegatum*, H. S. La forme de l'écusson, très obtusément échancré chez les ♂, arrondi en arrière chez les ♀ est semblable à celle de *C. variegatum*, H. S., de même que la pièce génitale ♂, un peu plus étroite que la tête avec les yeux, mais plus largement bordée de jaune. La taille un peu plus large que longue et aussi légèrement plus forte (♂ 2 1/2, ♀ 3 1/4, mill.).

trouvent deux taches jaunâtres irrégulières, une de chaque côté de la callosité basilaire.

Tête étroite, lisse, très proéminente au devant des yeux, joues légèrement convergentes à l'extrémité, pas plus longues que le tylus qui est à peine rétréci au sommet; une tache jaune subtriangulaire prenant depuis le niveau du milieu de l'œil, couvrant de chaque côté les joues dont le pourtour reste étroitement noir. Yeux médiocres, espace interoculaire plus de deux fois le diamètre de l'œil.

Pronotum presque lisse, noir bronzé; sillon transversal nul, très obsolètement pointillé entre les dépressions latérales faibles. Dilatations latérales jaunâtres, assez grandes, arquées à leur bord externe, limitées à leur partie interne par une ligne noire, enfoncée, oblique qui atteint en arrière le côté du pronotum devant l'angle huméral; derrière cette ligne noire un étroit liseré jaunâtre prend depuis le bord antérieur et aboutit sous l'angle huméral qu'il contourne en se prolongeant jusqu'à l'angle postérieur; en avant ce liseré se relie à un trait transversal sur le bord antérieur du pronotum qui s'avance de chaque côté en dedans du niveau interne des ocelles. Une tache allongée, jaunâtre, pointillée de brun en avant, de chaque côté en dedans de l'angle huméral, atteignant en avant le bord latéral jaune et en arrière le côté latéral postérieur limbé de jaunâtre.

Callosité basale de l'écusson faible mais bien limitée en arrière par une ligne enfoncée et régulière; d'un noir bronzé avec une petite tache de forme irrégulière de chaque côté, non loin des extrémités elles-mêmes étroitement jaunâtres; et une petite tache transversale de même couleur, de chaque côté en dehors des extrémités de la callosité.

Milieu du disque de l'écusson noir bronzé très finement ponctué; Cotés latéraux et postérieurs largement jaunâtres couverts d'une ponctuation noirâtre assez forte et assez dense, mais irrégulière, laissant par places des espaces pâles et lisses. En dedans des angles postérieurs une petite tache noire bronzée subarrondie.

Écusson ♂ très obtusément et peu profondément échancré à l'extrémité au dessus de la pièce génitale qui est assez grande,

aussi large que la tête avec les yeux, noire avec un point jaune central, les bords latéraux et supérieur largement jaunâtres. Chez la ♀ l'écusson est très-obtus, subarrondi à l'extrémité.

Dessous de la tête jaunâtre à la base et de chaque côté sur les joues, dessous des dilatations latérales du pronotum jaunâtres. Poitrine grisâtre, orifices situés à égale distance des hanches et des côtés de la poitrine, suivis d'un canal très-court, arqué, n'atteignant pas l'angle antérieur externe des metapleures.

Antennes et pattes jaunes, tibias non sillonnés.

Abdomen lisse, noir, brillant, avec une rangée de points en ligne le long de la base des segments; la marge jaunâtre et une tache allongée oblique sur le bord de chaque segment chez le ♂; chez la ♀ il y a sur le bord de chaque segment deux taches subtriangulaires, l'antérieure plus forte que la postérieure.

♂ long. 3; larg. $2\frac{4}{5}$ mill. ♀ long. $3\frac{3}{5}$ larg. $3\frac{1}{2}$ millimètres.

Montagnes des Carin, district des Carin Cheba. Musée Civique de Gènes, un seul couple.

Cette espèce est assez voisine de *C. nobile*, Dohrn. dont elle a l'abdomen lisse avec des points en ligne sur la base de chaque segment et un peu le mode de coloration; mais les yeux sont beaucoup plus petits, le pronotum manque de traits transversaux sur le disque; elle est aussi moins arrondie, plus élargie postérieurement, et la couleur diffère. Elle ne saurait être rapportée au *C. vermiculatum*, Germ. qui a deux lignes de longueur, par conséquent plus de 4 millimètres et dont la bordure de l'écusson est étroite sur les côtés latéraux. Elle ressemble aussi un peu au *C. caudatum*, Montand. mais cette dernière espèce a les couleurs mieux marquées, plus nettes, la ponctuation de l'écusson plus régulière, en outre la petite dent du sommet de l'écusson manque chez les ♂ de *C. pulchellum*, Montand. et leur pièce génitale est aussi plus petite, non échancrée au bord inférieur.

16. *Coptosoma obrosum*, n. sp.

Subarrondi, un peu élargi postérieurement, noir, poli, brillant sans ponctuation apparente sauf sur les côtés latéraux et postérieur de l'écusson où la ponctuation très-fine et espacée est

cependant plus visible; avec des taches jaunes pâles sur les joues, une double bordure sur les côtés latéraux et deux taches transverses, de même couleur, sur le bord antérieur du pronotum; deux faibles points sur la base de l'écusson et le tour extérieur de ce dernier bordé de jaune, la bordure éraillée à son côté interne.

Tête petite, lisse, joues proéminentes au devant des yeux, légèrement convergentes en avant où le tylus, aussi long que les joues est à peine rétréci à l'extrémité. Joues jaunes depuis le devant des yeux, étroitement bordé de noir tout autour. Yeux médiocres, espace interoculaire plus de deux fois plus large que le diamètre de l'œil.

Pronotum avec un double liseré jaune sur les côtés latéraux, le liseré intérieur se reliant le plus souvent en avant avec la tache transversale du bord antérieur qui s'avance jusqu'en dedans du niveau des ocelles; sur un exemplaire, cependant, cette tache antérieure réduite à un petit trait jaune transversal, indépendant, qui ne se soude pas à la tache latérale.

Écusson avec deux petites taches ovalaires longitudinales, parfois très-petites, une de chaque côté sur la callosité basilaire, non loin de ses extrémités; cette callosité peu accentuée mais bien limitée en arrière par une ligne enfoncée, régulière, ininterrompue. Une très-petite tache jaune transversale sur la base de l'écusson, de chaque côté en dehors de la callosité. Pourtour extérieur de l'écusson bordé de jaune en dedans de l'extrême bord brun; ce limbe jaune n'atteint pas tout à fait la base et est inégal, avec des points noirs, comme rongé sur le bord interne, surtout postérieurement où le jaune s'élargit davantage densément pointillé de noir. Écusson ♂ très-obtusément et peu profondément échancré au dessus de la pièce génitale; cette dernière médiocre, aussi longue que large, plus étroite que la tête avec les yeux, noire, bordée de jaune de chaque côté et un point de même couleur sur le milieu, chez les ♀ l'écusson est arrondi en arrière.

Dessous de la tête avec la base et une tache de chaque côté sur les joues jaunes; dessous des dilatations latérales du pro-

notum étroitement jaunes. Poitrine grise, mate; orifices situés à égale distance des hanches et des cotés de la poitrine, suivis d'un court canal arqué en avant qui atteint le bord antérieur des métapleures, bien en dedans de leur angle antérieur externe.

Antennes et pattes jaunes; tibias non sillonnés. Abdomen noir brillant, presque lisse, avec une très-fine ponctuation en lignes transversales à la base et à l'extrémité des segments. Marge abdominale jaune pâle et une tache oblique, allongée, calleuse de même couleur sur le bord de chaque segment.

Longueur ♂ $2 \frac{2}{3}$, ♀ $3 \frac{1}{4}$ mill.; largeur ♂ $2 \frac{1}{2}$, ♀ 3 millimètres.

Birmanie: Shwegoo. Trois exemplaires. — Musée Civique de Gênes.

Cette petite espèce est bien reconnaissable par sa surface lisse et le limbe de l'écusson irrégulier, inégalement pointillé à sa partie interne qui est comme rongée tout autour; la tache ovulaire sur chaque coté de la callosité basilaire de l'écusson, étroite et longitudinale, non transversale comme chez les espèces voisines.

✓ 17. *Coptosoma ophthalmicum*, n. sp.

Subpentagonal, de même longueur que large en arrière, noir poli, brillant, très finement et superficiellement ponctué, bordé de jaune sur les cotés latéraux du pronotum et les cotés extérieurs de l'écusson; deux taches d'un jaune assombri sur le devant du pronotum au niveau des ocelles et deux taches semblables à la base de l'écusson sur les extrémités de la callosité basilaire.

Tête petite, noire, joues proéminentes au devant des yeux, assez convergentes au sommet, pas plus longues cependant que le tylus qui arrive au bord antérieur de la tête, très rétréci au sommet; une petite tache jaune triangulaire de chaque coté sur les joues au devant des yeux; ces derniers globuleux, très saillants, espace interoculaire moins de deux fois le diamètre de l'œil.

Pronotum lissé, brillant, avec une légère dépression transversale de chaque coté du disque, marquant les extrémités du sillon

transverse qui est tout à fait obsolète sur le milieu du disque. Dilatations latérales avec une étroite bordure jaune intramarginale; cette bordure jaune se continue après les dilatations jusque sous l'angle latéral; une ligne noire de points enfoncés au coté interne des dilatations latérales et en dedans de la partie antérieure de cette ligne noire un petit trait jaune étroit qui n'arrive guère qu'au niveau du milieu des dilatations. Sur le devant du pronotum au niveau des ocelles deux petites taches pâles subarrondies, assombries, à peine visibles.

Ecusson noir brillant à ponctuation un peu plus dense sur les cotés. Callosité basilaire très faible, limitée en arrière par une fine ligne enfoncée presque effacée au milieu; une petite tache pâle subarrondie et assombrie de chaque coté sur la callosité près de ses extrémités. Cotés latéraux et postérieur bordés d'un liseré intramarginal jaune pâle n'atteignant pas tout à fait la base de chaque coté, un peu élargi en arrière où il est légèrement sinué au milieu et s'avance un peu en pointe comme chez *C. variegatum*, H. S.

Dessous de la tête noir, les joues tachées de jaune au sommet; dessous des dilatations latérales du pronotum étroitement jaune. Antennes et pattes jaunes, fémurs rembrunis vers la base, tibias non sillonnés. Poitrine noirâtre, mate, abdomen noir brillant, poli, légèrement aciculé sur le bord postérieur des segments; marge abdominale jaune et une tache subtriangulaire de même couleur, oblique, calleuse, sur le bord de chacun des segments. Pièce génitale ♂ subpentagonale, pas plus large que longue, un peu plus étroite que la tête avec les yeux, noir avec les cotés étroitement bordés de jaune. Ecusson ♂ obtusement échancré au dessus de la pièce génitale, arrondi postérieurement chez les ♀.

Aussi long que large. ♂ $2 \frac{1}{2}$ mill. ♀ 3 millimètres.

Montagnes des Carin, district des Carin Cheba. 900 - 1100 met. d'alt. — Musée Civique de Gênes.

Cette petite espèce se reconnaîtra assez facilement de ses voisines par la forme et la dimension de ses yeux.

✓ 18. *Coptosoma Feanum*, n. sp.

De forme subrectangulaire, presque transverse; noir, brillant, à ponctuation très-fine, un peu plus dense et plus visible sur les cotés de l'écusson; une petite tache jaune de chaque côté de la tête sur les joues au devant des yeux; cotés latéraux du pronotum bordés d'un ruban jaune blanchâtre assez large en avant, atténué en arrière à l'angle latéral, deux petites taches transversales de même couleur, une de chaque côté de la callosité basilaire, ainsi que le limbe de l'écusson qui n'atteint pas tout à fait la base.

Tête petite, lisse, noire, brillante, atténuée en avant où elle n'est pas très-proéminente au devant des yeux; ces derniers petits, espace interoculaire plus de deux fois plus large que le diamètre transversal de l'œil; joues légèrement convergentes au sommet, pas plus longues que le tylus qui atteint le bord antérieur de la tête, à peine atténué à l'extrémité qui est étroitement jaunâtre; les joues jaunes de chaque côté du tylus depuis le niveau du bord antérieur des yeux, sauf les bords étroitement noirs.

Pronotum noir, presque lisse, très-brillant avec une bordure latérale jaune blanchâtre, large en avant où le côté interne prend au niveau du milieu de l'œil sur le bord antérieur et se continue en droite ligne dirigée obliquement en arrière jusque sous l'angle huméral où la bordure se termine très atténuée. Sur le milieu de la bordure dans le sens de sa longueur, on observe un très faible sillon de points alignés, concolores, ou très légèrement rembrunis, indiquant faiblement la partie interne de la dilatation latérale. Sillon transversal sur le disque du pronotum très-superficiel, mais visible, même sur le disque, formé par une très-légère dépression pointillée.

Ecusson noir brillant, à ponctuation très-fine, assez dense et mieux marquée sur les cotés latéraux et postérieur en dedans du limbe jaune pâle, lisse, intramarginal, l'extrême bord restant très étroitement brun noirâtre, conformé assez exactement comme

chez *C. variegatum*, H. S., se relevant un peu en pointe au milieu du bord postérieur, mais n'atteignant pas tout à fait de chaque côté la base de l'écusson où l'on n'observe pas non plus de petite tache jaune en dehors de la callosité; cette dernière assez faible, mais bien limitée en arrière par une ligne enfoncée, régulière, ininterrompue, quoique plus faible sur le milieu; une tache jaune pâle transversale lisse de chaque côté sur la callosité, non loins des extrémités qui sont légèrement aciculées, finement ridées.

Marge de la corie bordée de jaune pâle.

Dessous de la tête et des marges dilatées du pronotum, antennes et pattes jaunâtres pâles, les antennes à peine rembrunies vers l'extrémité; tibias non sillonnés. Poitrine noirâtre, orifices odorifiques situés au milieu des métapleures suivis d'un très-court sillon coudé qui atteint la marge antérieure des métapleures très en dedans de leur angle antérieur externe. Abdomen noir brillant, finement aciculé avec une tache jaune pâle, oblique, calleuse sur le bord de chaque segment et la marge abdominale entièrement jaune pâle.

Ecusson ♂ obtusement échancré au dessus de la pièce génitale; cette dernière subpentagonale, pas plus large que longue, un peu plus étroite que la tête avec les yeux, jaune sur les cotés et le bord supérieur avec un point jaune median plus rapproché du bord inférieur que du bord supérieur. Aussi long que large $2\frac{1}{4} - 2\frac{1}{2}$ millimètres. 3 exemplaires ♂. Montagnes des Carin, district des Carin Cheba: Rangoon. Musée Civique de Gènes (1).

Cette jolie petite espèce de forme en apparence plutôt transversale se distingue facilement des variétés les plus foncées de *C. variegatum*, H. S., outre l'absence de taches pâles sur le bord antérieur, sur le disque et près des angles latéraux du pronotum ainsi qu'à la base de l'écusson en dehors des extrémités de la callosité basilaire; par la ligne oblique concolore ou très-obsolète des marges latérales du pronotum et par la forme de la tête un

(1) Ma collection possède aussi un exemplaire ♂ provenant de Perak, Malacca.

peu moins prolongée au devant des yeux, avec les taches jaunes sur les joues plus petites.

Je me fais un plaisir de la dédier à l'illustre voyageur Italien dont les patientes recherches ont largement contribué à enrichir le domaine de nos connaissances.

✓ 19. *Coptosoma sphaerulum*, GERM. var?

1 seul exempl. ♂ (3 mill. long.). Birmanie: Bhamo.
Musée Civique de Gènes.

Cet insecte répond bien à la description de Germar et surtout à la figure donnée par H. Schæffer, W. I., t. 150, fig. 476, sauf cependant deux petites taches jaunes allongées intramarginales sur le côté externe des joues au devant des yeux, et le liseré jaune du bord antérieur du pronotum très étroitement interrompu au milieu.

Je ferai remarquer à cette occasion que Stål a placé *C. sphaerulum*, Germ. dans une division où le limbe jaune de l'écusson n'atteint pas la base et ne commence qu'après le tiers basal des côtés latéraux; est-ce bien le type qu'il a eu sous les yeux?

On pourrait en douter, car ce détail n'est pas signalé dans la description de Germar et dans la figure de H. Schæffer le limbe est bien représenté comme arrivant jusqu'à la base sur les côtés de l'écusson.