

Montandon 1894

Ann. Soc. Ent. Belg. 38: 243-281

on computer

Extrait des Annales de la Société Entomologique de Belgique

TOME XXXVIII, 1894.

Cat



Division of Entomology  
Department of Entomology  
U. S. National Museum

NOUVEAUX GENRES ET ESPÈCES DE LA

S. F. DES *PLATASPIDINÆ*,

par A. L. Montandon.

*GABONIA* n. g. — De forme arrondie comme celle du genre *Brachyplatys*; convexe en dessus, entièrement plane en dessous.

Tête très large, transversale, différente selon les sexes, légèrement concave supérieurement, peu proéminente au devant des yeux, surtout chez les ♀; tronquée presque droite en arrière, derrière les yeux, où le pronotum est très faiblement et obtusément échancré en demi cercle au milieu du bord antérieur. Joues valvantes devant le tylus, ce dernier aussi court que la partie valvante des joues au devant de lui. Yeux très transverses, comme chez les *Brachyplatys*. Distance interocellaire très peu plus faible que la distance des ocelles aux yeux.

Surface du pronotum et de l'écusson sans traces de sillons, formant ensemble une convexité régulière.

Orifices odorifiques très visibles, situés en dehors du milieu des côtés de la poitrine, c'est-à-dire plus éloignés des hanches que du côté externe des métapleures; suivis d'un canal court, recourbé et élargi en avant en oreillette qui touche à l'angle antérieur externe de la pièce métapleurale.

Bord postérieur des 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> segments ventraux profondément échancré au milieu chez les ♂, où le 6<sup>e</sup> segment s'avance sur le milieu en angle excessivement aigu, un peu arrondi au sommet, jusqu'au bord postérieur du 3<sup>e</sup> segment; chez les ♀, le 4<sup>e</sup> segment est un peu rétréci au milieu par le bord postérieur qui s'avance en angle très obtus, et le 5<sup>e</sup> segment est très profondément échancré, comme coupé par le 6<sup>e</sup> segment qui s'avance sur le milieu en angle excessivement aigu jusque sur la base du 5<sup>e</sup> segment.

Stigmates placés en dehors des côtés de l'abdomen, contre le rebord du côté interne de la marge abdominale.

Rostre long, dépassant les hanches postérieures.

Pattes courtes, fémurs n'atteignant pas les côtés de la poitrine, tibias plus courts que les fémurs, fortement sillonnés.

Pièce génitale posée obliquement à l'axe longitudinal du corps, dans les deux sexes.

Ce genre, très voisin des *Brachyplatys*, s'en distingue aisément

par la position des ocelles et la forme du 6<sup>e</sup> segment ventral dans les deux sexes. La dilatation antérieure des joues chez les ♂ ne saurait le faire rapprocher des *Ponsila* qui ont des sillons transversaux sur le pronotum et l'écusson, le canal des orifices odorifiques long, et le 6<sup>e</sup> segment ventral conformé tout différemment, très obtusément anguleux au milieu de son bord antérieur.

✓ *Gabonia irradiata* n. sp. — Subarrondi, à peine plus long que large, noir bronzé avec de petites taches sur la tête, les liserés du pronotum, des élytres et de l'écusson, ainsi que des irradiations sur les côtés de l'abdomen, jaunes; deux taches sur le disque du pronotum et quatre sur la base de l'écusson, subarrondies, rougeâtres.

Tête très large, presque lisse, très finement ponctuée, légèrement concave à la partie supérieure dans les deux sexes; plus large que les deux tiers de la plus grande largeur du pronotum chez le ♂, où les joues, dilatées en avant, font saillie, et sont arrondies au sommet de chaque côté sur le bord antérieur de la tête qui est obtusément sinué au milieu. Chez la ♀, la tête un peu moins large que les deux tiers du pronotum est très obtusément arrondie en avant.

Le tylus, très court, est jaunâtre vers son extrémité, et de chaque côté, sur les joues, une petite tache oblique de même couleur rejoint plus ou moins nettement en arrière une autre petite tache jaune transversale ornant de chaque côté le milieu de la base des joues, sur une ligne fictive transversale qui partirait de l'angle postérieur interne de l'œil pour aboutir à la base du tylus.

Pronotum presque entièrement lisse, à ponctuation très fine, presque invisible sur les côtés latéraux. Un étroit liseré jaune intramarginal derrière le bord externe étroitement noir, le long du bord antérieur du pronotum, se recourbant de chaque côté en arrière au niveau de l'espace compris entre l'œil et l'ocelle, un peu en dehors du milieu de cet espace, et se dirigeant ensuite obliquement en arrière, un peu arqué en dedans, jusqu'à l'angle latéral du pronotum. Le bord des côtés latéraux est aussi orné d'un liseré jaune intramarginal qui commence antérieurement au niveau du côté externe de l'œil, et rejoint en arrière les prolongations postérieures du liseré de la marge antérieure, devant l'angle latéral du pronotum. Sur le disque du pronotum, les quatre exemplaires ♀ qui me sont passés sous les yeux, ont de chaque côté, au niveau du milieu de l'angle formé par les prolongations postérieures du liseré antérieur, une tache rougeâtre suboblongue qui manque chez l'unique exemplaire ♂ observé.

Partie visible de la corie avec une large bordure intramarginale et une petite tache près de l'angle interne jaunâtres.

Écusson presque entièrement lisse, à ponctuation très fine et rare, très superficielle, avec un double liseré intramarginal jaune,

arrivant de chaque côté jusque près de la base; le liseré interne un peu plus large et très finement pointillé de noir, cette ponctuation assez espacée. Le liseré interne n'est séparé du liseré extérieur que par le trait enfoncé, noir, qui limite au côté interne le bourrelet jaune des côtés externes de l'écusson dont l'extrême bord est très étroitement noir. Quatre taches rougeâtres subovales, transversales, le long de la base de l'écusson, deux de chaque côté chez les deux sexes, l'une près de l'angle huméral, la seconde peu éloignée de la première; l'espace compris entre les deux taches médianes plus de deux fois plus large que la distance de la tache médiane à la tache externe.

Dessous de la tête noir avec une tache jaune au milieu, de chaque côté à la base du rostre. Poitrine noire, mate, plus ou moins grisâtre. Antennes jaunâtres, rembrunies sur les deux derniers articles; rostre jaunâtre, rembruni vers l'extrémité. Pattes jaunâtres avec la base des fémurs rembrunie.

Abdomen lisse, noir, brillant, avec de petites rides longitudinales très fines et très superficielles, à peine visibles; marge abdominale jaune, ornée de taches noirâtres alternées, l'une plus large sur le niveau du milieu des segments, l'autre assez étroite vis à vis de la suture des segments, ces taches n'atteignant pas le bord externe de la marge abdominale. Sur le bord de chaque segment, à leur base le long de la marge, deux taches triangulaires transversales environ deux fois plus longues que larges, l'antérieure plus large que la postérieure et ornée d'un point noir au milieu. Ce point noir est légèrement enfoncé et simule un stigmat. En d'autres termes, le disque de l'abdomen, largement noir brillant, envoie des rayons de même couleur sur le milieu et sur la suture de chaque segment au travers de la large bordure jaune des côtés.

Chez le ♂, la pièce génitale est un peu plus large que l'espace interocellaire, et l'écusson est profondément échancré en demi-cercle au dessus de la pièce génitale.

♂ longueur 6  $\frac{3}{4}$  mill., largeur 5  $\frac{1}{2}$  millimètres.

♀ » 7  $\frac{1}{2}$  » » 6  $\frac{1}{4}$  »

Gabon; 1 ex. ♀, coll. de M. G. Fallou; ♂ et ♀, ma collection.

A première vue cet insecte ressemble beaucoup à un *Brachyphatys*; mais les caractères génériques énumérés plus haut l'en feront aisément distinguer.

✓ *SCHIZOMETOPUS* n. g. — De forme ovale, convexe en dessus, plane à la partie inférieure.

Tête très large, très proéminente au devant des yeux; joues légèrement convergentes en avant, mais non confluentes devant

le tylus qui, très allongé, est effilé à l'extrémité, où il atteint presque le bord antérieur de la tête lequel paraît légèrement échancré au devant du tylus entre les joues qui ne se rejoignent pas. Yeux subconiques comme chez les *Brachyplatys*; espace interocellaire subégal, à peine un peu plus large que la distance des ocelles aux yeux.

Antennes très grêles, assez longues, à 2<sup>e</sup> article ayant presque le tiers de la longueur du 3<sup>e</sup>, proportionnellement plus long que chez les espèces du genre *Brachyplatys*.

Rostre très long, atteignant presque l'extrémité de l'abdomen.

Pattes courtes, extrémité des fémurs n'atteignant pas les côtés de la poitrine, tibias beaucoup plus courts que les fémurs, fortement sillonnés.

Le 5<sup>e</sup> segment ventral ♀ est très rétréci au milieu par son bord postérieur qui est en angle rentrant presque droit, légèrement obtus, et dont le sommet n'atteint cependant pas le bord postérieur du 4<sup>e</sup> segment; ♂ inconnu.

Orifices odorifiques situés plus loin des hanches que du bord externe de la pièce métapleurale, suivis d'un court sillon recourbé en avant en oreillette vers l'angle antérieur externe des métapleures.

Stigmates placés sous le rebord du côté interne de la marge abdominale.

Pronotum sans trace de sillon transversal, presque coupé droit en avant, avec une échancrure très obtuse et peu profonde au milieu du bord antérieur.

Base de l'écusson à callosité formant bourrelet bien visible quoique fort mal limité en arrière.

Très voisine du genre *Brachyplatys*, cette nouvelle forme s'en sépare à première vue par sa taille plus allongée et moins arrondie, le tylus très long, non englobé par les joues, et la longueur du rostre qui arrive au 6<sup>e</sup> segment ventral.

✓ *Schizometopus obscurus* n. sp. — Noir, à reflets bronzés très sombres, très finement ponctué surtout sur la tête et le pronotum, avec deux petites taches jaunes sur la tête, et un fin liseré de même couleur sur le bord antérieur et les côtés latéraux du pronotum et autour de l'écusson.

Tête ♀ très large, un peu transverse, plus large que les deux tiers de la plus grande largeur du pronotum, assez proéminente au devant des yeux, subarrondie en avant où elle est moins obtuse que chez les espèces du genre *Brachyplatys*. La longueur de la tête est cependant un peu moindre que sa largeur entre les yeux. Les joues sont finement ridées transversalement; le vertex un peu en relief, très luisant, avec une ponctuation excessivement fine à

peine visible. Un très petit point jaune de chaque côté à la base des joues au niveau et un peu au devant des ocelles. L'extrême bord antérieur de la tête très étroitement brunâtre.

Pronotum presque entièrement lisse, à ponctuation très fine, rare, offrant quelques rides très superficielles sur le devant. Un liseré jaune, étroit, derrière le bord antérieur, étroitement interrompu au milieu et très aminci sur les côtés où il se retourne en arrière au niveau de l'espace compris entre l'ocelle et l'œil, largement interrompu ensuite derrière les dilatations latérales et reparaisant devant l'angle huméral du pronotum. Bord externe des dilatations latérales avec un liseré jaune intramarginal, commençant en avant au niveau du côté externe de l'œil et interrompu en arrière avant de rejoindre le second liseré qui est devant l'angle huméral.

Écusson avec un double liseré jaunâtre commençant de chaque côté à la base, au dessous d'une petite tache oblique plus pâle qui couvre l'angle antérieur externe de l'écusson. La base de l'écusson est assez fortement relevée en bourrelet bien visible, surtout sur les côtés où la dépression derrière le bourrelet est plus accentuée assez fortement ponctuée. Un petit point rougeâtre de chaque côté sur la partie calleuse de la base, non loin de ses extrémités. Cette callosité basilaire est presque lisse ainsi que les côtés latéraux et postérieur. Sur le disque de l'écusson la ponctuation assez superficielle et peu dense est cependant beaucoup plus visible, à points enfoncés plus gros que sur le pronotum ou les côtés de l'écusson.

Antennes, pattes et rostre d'un jaune clair; une tache jaune sur le milieu de la base du dessous de la tête; poitrine noire, mate, avec l'oreillette du canal des orifices odorifiques jaunâtre.

Abdomen noir luisant, lisse, avec la marge jaunâtre claire, ornée de taches noirâtres longitudinales, élargies au milieu, le long du bord des segments et sur le niveau de chaque segment; entre ces taches, un fin trait noir court jusqu'au milieu de la largeur de la marge sur la continuation des sutures des segments. Deux taches triangulaires jaunes sur le bord externe de chaque segment, environ de même longueur sur le segment que larges sur le bord du segment; l'antérieure un peu plus grande que la postérieure et ornée d'un point noir qui en échancre le bord antérieur surtout sur les derniers segments.

Un seul exemplaire ♀, longueur 7 1/3 mill., largeur 5 1/4 millimètres.

Nouvelle Guinée. — Musée de Stockholm.

Cet insecte est très voisin des *Brachyplatys*, mais sa forme allongée l'en distingue à première vue. Ce caractère est bien indiqué aussi chez le *Brachyplatys histeroides* Walker; mais ce dernier

a la tête et les côtés du pronotum étroitement rebordés; la tête est deux fois plus large que longue et beaucoup plus étroite que le pronotum; le rostre atteint seulement les hanches postérieures. Ces indications suffisent pour séparer les deux insectes.

Il est fort possible que l'espèce de Walker n'appartienne pas non plus au genre *Brachyplatys*.

*Brachyplatys truncaticeps* n. sp. — Noir bronzé brillant sur le pronotum, l'écusson et le dessous de l'abdomen; poitrine noirâtre mate; tête en grande partie jaunée; un double liseré de même couleur sur les côtés du pronotum et de l'écusson. Marge abdominale jaune avec des taches noires. Bord des segments abdominaux avec des taches jaunes courtes, irrégulières.

Tête large, plus large que la moitié de la largeur du pronotum entre les angles latéraux, largement tronquée à sa partie antérieure; presque entièrement jaune avec le bord postérieur, une petite tache sur la base du tylus, une assez grande tache nébuleuse, variable, sur les joues de chaque côté, l'extrême bord externe et les sutures du tylus très étroitement noirs. Parfois la tache nébuleuse noire du milieu des joues s'étend jusqu'au bord externe de la tête au devant des yeux mais le plus souvent elle s'arrête en laissant une large marge jaune. De chaque côté de l'extrémité du tylus on observe aussi parfois sur les joues un petit point noir, souvent à peine visible, et toujours bien séparé de la tache noire du milieu des joues. La ponctuation du dessus de la tête très fine, à peine visible sur le vertex, plus forte sur la tache noire du milieu des joues.

Pronotum et écusson presque lisses à ponctuation très fine et espacée, à peine un peu mieux marquée sur les côtés.

Pronotum peu rétréci en avant, à côtés latéraux arqués, légèrement dilatés et bordés d'un étroit liseré jaune derrière le bord externe qui est très étroitement noir; un autre liseré jaune suit, en dedans du bord antérieur, se contourne en arrière au niveau de l'angle interne de l'œil, se prolonge en suivant le côté interne des dilatations latérales jusque sur le côté latéral où il arrive un peu après le milieu pour se continuer ensuite, derrière le bord externe très étroitement noir, jusqu'à l'angle latéral du pronotum.

Écusson avec un double liseré jaune arrivant tout près de la base; le liseré interne un peu plus large et finement pointillé de brun, surtout vers l'extrémité de l'écusson qui est très obtusément arrondie, presque subtronquée en arrière chez les ♀, assez profondément échancrée chez les ♂ au dessus de la pièce génitale.

Dessous de la tête largement jaune au milieu, avec le bord externe très étroitement brun et les côtés noirs sur la région

comprise entre le côté interne de la base des antennes et les yeux.

Antennes, rostre, pattes et hanches entièrement d'un jaunâtre pâle. Poitrine noirâtre mate, avec la suture des pro- et mésopleures assez largement jaunâtre; un point sur l'extrémité du canal des orifices odorifiques, et l'angle postérieur externe des métapleures jaunes.

Abdomen brillant, finement et très superficiellement ridé-ponctué, avec le premier segment étroitement bordé en arrière d'un petit liseré jaune qui s'étend depuis le bord jusqu'au tiers de la distance comprise entre les côtés et le milieu du disque. Deux taches jaunes sur le bord de chacun des segments suivants; l'antérieure subtriangulaire à sommet interne tronqué ou arrondi, et un point noir sur le milieu, ce point noir parfois agrandi, échancrant le côté interne de la tache jaune; la postérieure aussi large que l'antérieure, subquadrangulaire, inégalement arrêtée au côté interne où elle a un petit prolongement sur le bord postérieur, le long de la suture des segments, chez les ♀. Chez les ♂ ces taches jaunes abdominales sont réduites à de simples petits traits jaunes longitudinaux sur le bord du segment près de la marge abdominale. La marge dans les deux sexes est jaune avec une tache noirâtre ovale dans le sens du liseré, sur le bord interne de la marge, et au niveau du milieu de chaque segment abdominal, et une petite ligne noire vis à vis de la suture de chacun des segments; cette petite ligne n'atteignant pas le bord externe de la marge abdominale.

♂ longueur 4  $\frac{1}{3}$ -4  $\frac{3}{4}$  mill.; largeur 3  $\frac{2}{3}$ -3  $\frac{4}{5}$  millimètres.

♀ " 6  $\frac{1}{3}$ -7 mill.; " 4  $\frac{3}{4}$ -5  $\frac{1}{2}$  millimètres.

Congo, Mpala, Marungu (Cap. Storms). — Musée R. d'H. N. de Belgique.

Congo, Landana (Dr Pipitz, 1883). — Musée Civ. de Gênes.

Cette espèce est certainement très voisine de *B. testudo nigra* de Geer; elle s'en distingue par sa teinte bronzée un peu moins foncée, la teinte jaune qui a envahi presque toute la partie supérieure de la tête, et surtout par la forme de cette dernière, très large, tronquée et non régulièrement arrondie en avant.

*Brachyplatys capito* n. sp. — Brun de poix foncé, poli, brillant, à ponctuation très fine et espacée; jaune clair sur la tête ainsi que les liserés et les taches humérales du pronotum, la bordure de l'écusson, des taches transversales sur la base de ce dernier et une faible ligne transversale peu distincte de chaque côté sur la disque du pronotum.

Tête très grande, presque aussi large que le pronotum, à peu près entièrement jaune, très finement pointillée. De chaque côté

sur le milieu des joues une bande nébuleuse transversale, mal limitée et peu accentuée, brunâtre; deux très petites taches sur la base du tylus et bord postérieur de la tête bruns.

Bord antérieur du pronotum avec un liseré intramarginal jaune derrière l'extrême bord qui est étroitement noir, ce liseré coudé en arrière à angle obtusément arrondi au niveau de l'espace compris entre l'œil et l'ocelle, et dirigé ensuite obliquement en dedans des dilatations latérales jusqu'au sommet de l'angle latéral du pronotum. Dilatations latérales également bordées au côté externe d'un liseré intramarginal jaune; la partie interne de ces dilatations, brunâtre et assez fortement ponctuée, assez large sur le milieu et atténuée aux deux extrémités. Au côté interne des angles latéraux du pronotum, une tache jaune assez large, finement pointillée de brun, envoyant obliquement en avant un prolongement subparallèle au liseré qui longe le côté interne des dilatations latérales; ce prolongement est très atténué en avant où il a l'air de se courber en dedans, à peu près vis à vis du milieu des dilatations latérales, pour se continuer transversalement, à peine visible, de chaque côté sur le disque du pronotum, où l'on n'observe qu'une ou deux petites taches jaunâtres obscurcies, transversales, assez confuses, au niveau du sommet de l'angle formé de chaque côté par le liseré du bord antérieur.

Écusson avec deux traits jaunâtres transversaux de chaque côté, le long de la base, et une large bordure jaunâtre intramarginale sur les côtés latéraux et postérieur, atteignant de chaque côté la base de l'écusson; cette bordure jaune, outre la ponctuation brune très fine et assez dense qui la couvre, est ornée de points bruns plus gros paraissant symétriquement disposés en ligne dans le sens de la longueur de la bordure. Ponctuation de l'écusson un peu plus visible de chaque côté près de la base.

Dessous de la tête, antennes, rostre et pattes d'un jaune clair, tibias très superficiellement sillonnés.

Poitrine grisâtre avec des taches jaunâtres mal limitées le long des sutures. Abdomen noir de poix, brillant, avec la marge jaune, ornée d'une tache brune semicirculaire sur le niveau du milieu de chacun des segments, et d'un fin trait brun qui la coupe sur la prolongation de la suture de chacun des segments. Deux très petites taches jaunes subtriangulaires sur chacun des segments abdominaux, le long de la marge, figurant un commencement d'irradiations jaunes qui s'avancent sur le disque de la largeur de leur base sur le bord le long de la marge. La tache antérieure de chacun des segments est ornée d'un point noir.

Écusson très profondément échancré au dessus de la pièce génitale chez les ♂; ♀ inconnue.

Longueur 4 mill., largeur 3 1/2 millimètres. Otahaiti. — K. K. Hofmuseum, Vienne.

Cette espèce paraît être assez voisine de *B. pusillus* Tryon, du moins par la largeur de la tête et le commencement de ligne jaune transversale sur le disque du pronotum; elle s'en éloigne par sa taille plus faible (M. Tryon indique 2 1/4 lignes = 5 millimètres pour son espèce et la mention « *scutellum conspicuously emarginate behind* » indique suffisamment, malgré l'absence d'autre indication plus précise à cet égard, que les individus décrits appartenaient aussi au sexe masculin). Elle ressemble aussi beaucoup à *B. flavipes* Fabr., mais outre la tête sensiblement plus large et la tache humérale jaune du pronotum, elle en diffère encore par les gros points en ligne de la bordure jaune plus large de l'écusson, et par sa teinte brune au lieu d'être d'un noir bronzé. Ces derniers caractères la distinguent aussi de *B. pusillus* Tryon.

✓ *Coptosoma flavescens* n. sp. — Convexe, tout à fait arrondi comme une demi sphère, jaunâtre, flavescents, avec une fine ponctuation assez dense à peine un peu plus foncée, presque concolore, sur les côtés du pronotum et de l'écusson.

Tête presque lisse, très finement ridée-ponctuée, jaunâtre, de moyenne grandeur, ayant environ le tiers de la largeur du pronotum entre les angles huméraux; sutures du tylus et partie postérieure de la tête rembrunies; yeux subconiques, de même largeur que les joues à leur base; ocelles très rapprochés des yeux, l'espace compris entre l'ocelle et l'œil n'étant guère plus large que le diamètre de l'ocelle. Joues un peu proéminentes au devant des yeux, dirigées presque en ligne droite en avant où elles ne s'avancent pas de la longueur du diamètre longitudinal de l'œil, très légèrement convergentes vers l'extrême sommet; tylus à côtés subparallèles, sauf à l'extrémité où il est à peine rétréci en atteignant le bord antérieur de la tête.

Pronotum presque entièrement lisse, à ponctuation nulle sur le disque, assez faible sur les côtés latéraux de la partie postérieure, et offrant quelques très petites taches brunâtres le long de la base, sans trace de sillon transversal sur le disque.

Partie visible de la corie jaunâtre.

Écusson sans trace de callosité basilaire, ponctué sur toute sa surface, cette ponctuation plus faible près de la base et sur le disque, un peu mieux accentuée sur les côtés latéraux et postérieur; quelques faibles petites taches brunâtres éparses sur la partie déclive de l'écusson, et principalement près du bord postérieur et des côtés latéraux.

Écusson très obtusément et faiblement échancré à l'extrémité

au dessus de la pièce génitale ♂. Pattes robustes, jaunâtres, tibias assez fortement sillonnés. Dessous de la tête et des dilatations latérales jaunâtre; l'unique exemplaire collé ne permet pas d'observer plus correctement la partie inférieure qui paraît brunâtre ainsi que la marge abdominale.

Un seul exemplaire ♂, aussi large que long, 3 1/4 millimètres.

Indes orientales. — Musée Nat. Hong. Budapest.

Cet insecte, qu'on ne saurait faire entrer dans aucune des coupes de Stål, a beaucoup d'affinités avec *C. Modigliani* Montand., telles que la forme de la tête et des yeux, l'absence totale de sillon transversal sur le disque du pronotum et de callosité basilaire à l'écusson; mais il en diffère beaucoup par la taille plus faible, la tête un peu plus étroite proportionnellement, et la couleur claire tout à fait différente.

**Coptosoma signatum** n. sp. — Jaunâtre pâle, ponctué de brun avec une tache allongée médiane longitudinale brune sur le disque de l'écusson.

Tête large, lisse, imponctuée, un peu plus d'un tiers de la largeur du pronotum entre les angles latéraux, très obtusément arrondie en avant, peu proéminente au devant des yeux; joues convergentes en avant, et confluentes devant le tylus qui est raccourci; l'extrême bord antérieur des joues très étroitement noir, deux très petites taches contiguës brunâtres sur la base du tylus, deux taches noirâtres triangulaires contiguës sur la base de la tête, une de chaque côté sur la région des ocelles; du sommet de chacune de ces taches part une petite ligne oblique brune qui traverse la joue au devant de l'œil, presque jusqu'au bord antérieur.

Partie antérieure du pronotum lisse, avec l'extrême bord externe très étroitement noir, surtout sur les côtés; coupée en deux par une ligne médiane longitudinale de points bruns plus ou moins confluentes depuis le bord antérieur jusqu'à la ligne transversale du disque qui est presque noire, enfoncée, ininterrompue. Un accent circonflexe de même couleur de chaque côté de la ligne médiane, ne se rejoignant pas au milieu; et une ligne oblique assez irrégulière de points enfoncés, bruns foncés, au côté interne des dilatations latérales. Partie postérieure du pronotum à ponctuation brune assez dense et régulière, ne formant pas de tache plus condensée, sur les angles latéraux.

Partie visible des élytres jaunâtre, avec de forts points enfoncés bruns. Callosité basilaire de l'écusson presque lisse, avec une ponctuation rare, très fine, brunâtre, à peine visible; large, bien limitée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue, sauf sur ses extrémités, où les points qui la forment laissent un petit

espace lisse. De chaque côté de la callosité, se superposant entre les extrémités de cette dernière et la base de l'écusson, de larges plaques latérales lisses se prolongent jusqu'à l'angle antérieur externe de l'écusson.

Ponctuation brune de l'écusson un peu plus dense derrière la callosité basilaire et de chaque côté près des angles latéraux postérieurs. Sur le milieu du disque de l'écusson, la couleur brune de la ponctuation s'étend, et relie les points entre eux sur une bande longitudinale très irrégulière et vermiculée de chaque côté sur ses bords.

Dessous de la tête jaunâtre. Prosternum presque entièrement d'un jaune grisâtre, méso- et métapleurales d'un gris noirâtre. Antennes et pattes jaunâtres, tibias fortement sillonnés.

Disque de l'abdomen noir, très finement pubescent. Marge abdominale avec de longues taches d'un jaune pâle, lisses, subsemi-circulaires, vis à vis de chaque segment, séparées sur la prolongation des sutures abdominales par un petit trait brun. Sur les côtés de l'abdomen et sur chaque segment, de larges taches jaunes s'avancent sur le disque de l'écusson, coupées transversalement sur les trois quarts externes de leur longueur par un trait noir assez large, surtout sur les 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> segments, laissant la partie antérieure élargie sur le bord du segment et ornée d'un point noir sur son milieu; la partie postérieure de la tache jaune linéaire. Ces grandes irradiations jaunes sont un peu rembrunies vers leur côté interne.

Un unique exemplaire ♀, longueur 5 mill., largeur 4 1/2 millim. Iles Philippines (Semper). — Musée de Stockholm.

Cet insecte est très voisin de *C. bufo* Esch. Il s'en distingue par le tylus pâle, la ligne transversale ondulée noire de la partie antérieure du pronotum interrompue au milieu, l'absence de tache noire sur les angles latéraux du pronotum, et par la bande médiane longitudinale noirâtre du disque de l'écusson.

**Coptosoma dilutum** n. sp. — Jaunâtre pâle, lisse, à ponctuation rougeâtre lavée.

Tête large, lisse et brillante, imponctuée, ayant un peu plus d'un tiers de la largeur du pronotum en arrière, très obtusément arrondie en avant, peu proéminente au devant des yeux; joues convergentes en avant et confluentes devant le tylus qui est raccourci. Deux très petits traits rougeâtres longitudinaux sur la base du tylus, et deux taches rougeâtres triangulaires contiguës sur la base de la tête, recouvrant de chaque côté la région des ocelles.

Partie antérieure du pronotum lisse, limitée en arrière par une ligne de points enfoncés rougeâtres formant un sillon transversal, interrompu par places sur le disque du pronotum. Une ligne rouge-

âtre longitudinale médiane coupe la partie antérieure du pronotum et de chaque côté un accent circonflexe transversal rougeâtre dont la branche interne ne rejoint pas la ligne longitudinale médiane, tout comme dans l'espèce précédente *C. signatum* Montand. Une ligne oblique rougeâtre, écourtée en avant et en arrière, limite les dilatations latérales à leur partie interne. Milieu du bord antérieur du pronotum étroitement noirâtre, l'extrême bord se continuant rougeâtre de chaque côté jusqu'après les dilatations. Partie postérieure du pronotum à ponctuation rare et très faible, couverte de petites taches rougeâtres qui relient très irrégulièrement les points entre eux. Une petite tache mieux accusée, subarrondie, rougeâtre, de chaque côté sur les angles latéraux. Partie visible des élytres jaunâtre, calleuse et lisse.

Callosité basilaire de l'écusson assez accusée et bien limitée en arrière par une ligne brune enfoncée et pointillée, très étroitement interrompue au milieu. La callosité est lisse, avec quelques petites taches rougeâtres indécises sur le milieu. De chaque côté, en dehors de la callosité, de larges plaques latérales en grande partie lisses, sauf près du bord externe; séparées de la callosité et limitées en arrière par une ligne enfoncée brune, s'étendant de chaque côté jusqu'à l'angle antérieur externe de l'écusson. En arrière de la callosité basilaire, l'écusson est entièrement, assez régulièrement et peu densément ponctué, les points enfoncés, rougeâtres; la teinte rougeâtre parfois extravasée, reliant par places la ponctuation en petites nébulosités qui laissent sur la ligne médiane longitudinale une bande plus claire. Écusson très faiblement échancré, à peine sinué au dessus de la pièce génitale ♂ qui est très petite, à peu près de la largeur de la tête entre les yeux.

Dessous de la tête, antennes, rostre et pattes jaunes, ces dernières courtes, tibias sillonnés. Poitrine d'un jaune grisâtre, plus foncée sur les méso- et métasternum. Disque de l'abdomen largement noir brillant, très finement pubescent au milieu, avec deux taches jaunes calleuses transversales sur le bord de chaque segment, l'antérieure subtriangulaire, avec un très petit point rougeâtre, la postérieure linéaire. Marge abdominale avec de grandes taches subsémi-circulaires jaunes, lisses, calleuses, vis à vis de chacun des segments, séparées du bord des segments par une ligne arquée rougeâtre qui coupe la marge sur la prolongation de la suture des segments.

Un seul exemplaire ♂, longueur et largeur 4 millimètres.

Cap York, Australie (Thorey). — Musée de Stockholm.

Très voisin de *C. bufo* Esch. et *C. signatum* Montand., entre lesquels il semble établir un passage. Il diffère du premier par la teinte générale beaucoup plus claire, le tylus jaunâtre, la callosité

basilaire de l'écusson à peine maculée au milieu et les irradiations jaunes des côtés de l'abdomen écourtées et divisées en deux sur chaque segment; ce dernier caractère l'éloigne aussi de *C. signatum* Montand., dont il se distingue facilement par la forme de la callosité basilaire mieux arrêtée sur les extrémités et la bande médiane longitudinale du disque de l'écusson plus claire et non plus foncée.

✓ *Coptosoma intricatum* n. sp. — Noir avec des taches jaunes vermiculées plus ou moins confluentes sur la partie postérieure du pronotum et l'écusson; ce dernier avec une bande longitudinale jaune, élargie en arrière, fortement ponctuée de noir.

Tête large, lisse, imponctuée, ayant un peu plus d'un tiers de la plus grande largeur du pronotum, arrondie en avant, peu proéminente au devant des yeux, ces derniers visiblement transverses. Joues très convergentes à l'extrémité, confluentes devant le tylus qui est raccourci, d'un jaune grisâtre obscur avec l'extrême bord antérieur étroitement noir. Tylus et deux grandes taches subtriangulaires contiguës sur la base de la tête, noires.

La partie antérieure du pronotum d'un jaune grisâtre violacé, assez densément ponctuée et vermiculée de petites taches noires, le bord antérieur étroitement noir, la bande ondulée transversale en accent circonflexe de chaque côté, noire, très large, évasée; ligne oblique enfoncée noire limitant les dilatations latérales, élargie en son milieu, atténuée et écourtée à ses extrémités, les dilatations finement pointillées de noir, avec le bord externe aussi étroitement noir. Sillon transversal sur le disque du pronotum très peu accusé, confondu avec les taches et lignes de points noirs du disque du pronotum. Partie postérieure noire sur le milieu, à taches d'un jaune grisâtre obscur vermiculées formant par places des lignes transversales plus ou moins ponctuées et interrompues; sur les côtés, la teinte jaune grisâtre obscure est plus étendue, ponctuée de noir, avec une tache noire subarrondie sur l'angle latéral.

Écusson à callosité basilaire presque lisse, très superficiellement ponctuée, large, assez accentuée, et bien limitée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue. Sur la base de l'écusson, de chaque côté en dehors de la callosité basilaire, et se superposant quelque peu sur les extrémités de cette dernière, les plaques latérales assez larges, presque lisses, superficiellement ponctuées, arrivent, élargies extérieurement, jusque sur les angles de l'écusson. La callosité et les plaques latérales d'un jaune grisâtre obscur, densément tachetées de noir. Surface de l'écusson à ponctuation assez fine et peu dense, noire, avec des taches d'un jaune

grisâtre obscur, ponctuées et vermiculées. Sur la ligne médiane, une bande longitudinale, très étroite en avant, un peu élargie en arrière, d'un jaune grisâtre, ponctuée de noir.

Dessous de la tête et des dilatations latérales du pronotum, antennes, rostre et pattes d'un jaune grisâtre, tibias fortement sillonnés; poitrine noirâtre, mate. Abdomen noir brillant sur le milieu et les sutures des segments, avec une grande tache transversale d'un jaune rougeâtre sur chaque segment, de toute la largeur du segment sur le bord près de la marge, un peu atténuée à son côté interne sur le disque où elle se termine d'une façon arrondie au sommet, éloignée de la ligne médiane de l'abdomen d'une distance équivalente à la moitié de sa longueur sur les 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> segments; sur le 6<sup>e</sup> segment elle s'avance presque jusqu'au milieu. Sur le milieu de chacun des segments, une ligne noire transversale, élargie à son côté interne, coupe la tache jaunâtre, et l'échancre souvent à son extrémité sur le disque de l'abdomen.

♀ longueur 4 1/4 mill., largeur 4 millimètres; ♂ inconnu.

Les Philippines. — Musée de Stockholm.

Cet insecte est très voisin de *C. bufo* Esch. dont il se distingue par la teinte beaucoup plus foncée, plus envahie par les taches noires beaucoup plus confluentes, sauf sur la bande médiane longitudinale claire de l'écusson.

✓ *Coptosoma abesum* n. sp. — D'un jaunâtre fauve avec une ponctuation noirâtre assez dense et des taches d'un fauve noirâtre reliant la ponctuation et formant par places de grandes nébulosités envahissantes.

Tête petite, ayant un peu plus du quart de la largeur du pronotum entre les angles latéraux, assez proéminente au devant des yeux; joues convergentes et confluentes devant le tylus qui est raccourci. Joues fauves avec le bord antérieur, le long du tylus, et une tache pointillée irrégulière sur leur surface, noirâtres. Partie postérieure de la tête noirâtre, depuis le niveau du bord postérieur des yeux, avec un trait jaune sur le milieu derrière la base du tylus.

Pronotum sans sillon transversal, à ponctuation assez dense sur toute la surface, plus fine sur la partie antérieure, avec des taches noires et brunes qui se relient confusément, plus denses sur la partie postérieure, où il ne reste que quelques taches jaunes éparses et vermiculées. Sur la partie antérieure, la bande transversale ondulée ininterrompue au milieu, en accent circonflexe de chaque côté, et la ligne oblique qui limite à leur côté interne les larges dilatations latérales, ressortent en noir parmi la ponctuation plus ou moins nébuleuse. L'extrême bord externe du pronotum, en avant et sur les côtés, est étroitement brunâtre.

Callosité basilaire de l'écusson peu accentuée, mais large et bien limitée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue. De chaque côté, en dehors des extrémités de la callosité, le bourrelet sur la base de l'écusson est très étroit, fauve, pas plus large et de même couleur que le bourrelet externe qui est limité tout autour par une ligne enfoncée d'un brun noirâtre. Toute la surface de l'écusson, y compris la callosité basilaire, à ponctuation noire assez dense et à taches brunes et noires envahissantes qui laissent seulement des petites taches jaunes vermiculées, lisses, dont quelques-unes un peu plus grandes, sur les extrémités de la callosité basilaire, puis en arrière de celles-ci, et près des angles huméraux de l'écusson.

Dessous de la tête et des dilatations latérales du pronotum, antennes, rostre et pattes fauves, fémurs quelque peu pointillés de brun, tibias sillonnés. Poitrine grisâtre, abdomen noir brillant, assez fortement ridé-ponctué, avec la marge d'un jaunâtre fauve, coupée de noir sur la prolongation des sutures des segments, et une grosse tache noire arrondie sur la région des stigmates. Bord de l'abdomen avec deux taches transversales jaunâtres, l'antérieure un peu plus grande avec un petit point noir au milieu. Ces taches jaunes des bords de l'abdomen, ainsi que la marge jaune, sont ponctuées par places de points enfoncés concolores.

Un exemplaire ♀, longueur 5 1/3 mill., largeur 4 1/2 millimètres.

Barway, Inde boréale (P. Cardon). — Musée R. d'H. N. de Belgique.

Très voisine de *C. pardalinum* Stal, cette nouvelle espèce en diffère par la taille un peu plus forte, la ponctuation plus dense, bien visible, même sur la partie antérieure du pronotum, sur les joues et sur les taches jaunes des bords de l'abdomen; la teinte d'un noir brunâtre qui relie la ponctuation en nébulosités, beaucoup plus étendue, ce qui donne à l'insecte un aspect beaucoup plus foncé.

✓ *Coptosoma sparsum* n. sp. — Entièrement d'un jaunâtre pâle brillant, uniforme, couvert d'une fine ponctuation brunâtre et rare sur tout le corps, dessus et dessous, sauf la poitrine qui est mate et brunâtre.

Tête petite, ayant un peu plus d'un quart de la plus grande largeur du pronotum, lisse, imponctuée, sans taches, la région des ocelles et les sutures du tylus très faiblement, presque imperceptiblement, rembrunies. Joues peu proéminentes au devant des yeux, très convergentes à l'extrémité, mais non confluentes devant le tylus. Ce dernier un peu plus court que les joues, et très rétréci au sommet, atteint cependant le bord antérieur de la tête qui paraît un peu sinué au milieu.



Partie antérieure du pronotum lisse avec la ligne transversale ondulée en accent circonflexe de chaque côté presque imperceptible, concolore, parfois très étroitement brunâtre; une ligne oblique de points espacés à la partie interne des dilatations. Le sillon transversal est remplacé par une ligne de points enfoncés, très espacés, et derrière cette ligne, la partie postérieure du pronotum est parsemée de petits points bruns enfoncés assez éloignés les uns des autres, de même que sur toute la surface de l'écusson, y compris la callosité basilaire qui n'est que très faiblement indiquée sur les côtés par une dépression assez faible et imparfaitement limitée en arrière par des points en ligne assez espacés les uns des autres.

Les antennes et les pattes sont aussi d'un jaune clair, les tibias non sillonnés. Les sutures des segments abdominaux sont noirâtres sur le milieu du disque, et la ponctuation noirâtre, espacée, s'étend assez régulièrement sur les côtés de l'abdomen en longeant les sutures.

Pièce génitale ♂ très petite, presque aussi étroite que la tête entre les yeux, d'un jaune pâle, avec le tubercule posé sur le bord inférieur entouré d'un trait enfoncé brun. Écusson très faiblement et étroitement échancré au dessus de la pièce génitale ♂.

Aussi large que long, ♂ 3 1/4 mill.; ♀ 3 1/3 millimètres.

Barway, Inde boréale (P. Cardon). — Musée R. d'H. N. de Belgique.

Cette espèce semble se rapprocher de *C. lynceum* Stål par la forme des joues, avec la tête plus étroite des *C. atomarium* Germ. et voisins, mais moins proéminente et moins atténuée en avant des yeux que chez ces derniers. La couleur et le genre de ponctuation la font aussi ressembler superficiellement à *C. cribrarium* Fabr., mais la façon indécise dont sont marqués les sillons transversaux sur le disque du pronotum ou près de la base de l'écusson, l'éloigne de toutes les espèces avec lesquelles on voudrait lui trouver des liens de parenté.

*Coptosoma parviceps* n. sp. — Jaunâtre, légèrement ocracé sur le devant du pronotum et le long de la base de l'écusson; d'un verdâtre pâle sur la partie postérieure du pronotum et l'écusson, à ponctuation fine, espacée et concolore.

Tête très petite, moins large que le quart de la largeur du pronotum entre les angles latéraux; yeux plus longs que larges; joues très convergentes et confluentes devant le tylus qui est raccourci, très peu proéminentes au devant des yeux, subsinuées en avant près de leur extrémité. Une tache jaune, commençant au niveau du milieu de l'œil, couvre de chaque côté les joues qui sont fortement ridées, bordées de noir en avant, cette bordure noire antérieure un peu élargie au devant des yeux. Tylus et partie posté-

rieure de la tête, noirs, brillants, très finement ridés-punctués. Un grand point jaune allongé sur le vertex derrière la base du tylus.

Ponctuation du pronotum très fine et très espacée, surtout sur la partie antérieure qui est presque lisse et séparée de la postérieure par une ligne transversale bien visible de points enfoncés, plus forts que ceux de la surface et noirs, non confluent, irrégulièrement disposés, et assez espacés par places.

Le bord antérieur du pronotum, très étroitement noir, envoie en arrière une ligne médiane longitudinale noire qui atteint la ligne transversale de points enfoncés du disque; de chaque côté de cette ligne médiane, un accent circonflexe noir transversal sur le milieu de la partie antérieure du pronotum, et quelques gros points enfoncés irrégulièrement alignés à la partie interne des dilatations latérales.

Callosité basilaire de l'écusson étroite, mais bien marquée et limitée en arrière par une dépression assez forte sur les côtés, plus faible sur le disque; ponctuation de la callosité faible et espacée, concolore, comme celle du disque de l'écusson, les points enfoncés mieux marqués et noirs de chaque côté près de la base, derrière les angles huméraux, et sur la ligne enfoncée qui limite en arrière la callosité basilaire.

Dessous de la tête noirâtre, poitrine grisâtre, avec le dessous des dilatations prothoraciques jaunâtre, le milieu et les hanches noirs. Antennes et pattes d'un jaune ocreux, les premières un peu plus foncées sur les derniers articles; tibias un peu obscurcis, fortement sillonnés. Abdomen noir sur le disque, avec la marge et les bords des segments largement jaunâtres; sur le bord postérieur du 6<sup>e</sup> segment, une tache médiane jaune et lisse rejoint de chaque côté la bordure; ponctuation assez forte, mieux marquée, plus dense et concolore sur les côtés qui sont jaunes. Un trait fin brunâtre, élargi en arrière en tache arrondie brune sur la région des stigmates, limite intérieurement la marge abdominale qui est aussi ponctuée de points enfoncés concolores plus petits que ceux de l'abdomen.

Un unique exemplaire ♀, longueur 5 1/4 mill., largeur 5 millim.

Chine. — Ma collection.

Cette espèce ne rentre dans aucune des coupes de Stål; elle ressemble comme couleur, forme et dessin aux *C. ictericum* Dall. et *C. obtusiceps* Stål, avec lesquels elle a encore de commun la tête très étroite, ayant à peine le quart de la largeur du pronotum; mais chez ces deux derniers, les joues sont dirigées en ligne droite en avant, et très proéminentes devant les yeux. *C. ictericum* Dall. est aussi de taille un peu plus grande (2 1/2-3 1/4 lignes, soit environ 6-7 millimètres), les points enfoncés qui forment la ligne trans-

versale sur le disque du pronotum ne sont pas plus accentués ni plus denses que ceux de la partie postérieure du pronotum, l'abdomen en dessous est très étroitement noir sur la ligne médiane longitudinale, avec de grandes irradiations accouplées jaunes pointillées de brun de chaque côté, arrondies au sommet sur le disque de l'abdomen. *C. obtusiceps* Stål est aussi de 6 millimètres; il se distingue par l'abdomen presque lisse, les irradiations accouplées sur chaque segment s'étendant aussi, atténuées vers le milieu, jusque sur le disque, où la large bande noire médiane paraît émettre des rayons noirs sur les sutures des segments. Chez *C. parviceps* Montand., il y a en outre une échancrure très légère et obtuse au milieu du bord postérieur du 5<sup>e</sup> segment ventral ♀, échancrure qui n'existe pas chez *C. ictericum* Dall. et *C. obtusiceps* Stål.

✓ **Coptosoma capitulatum** n. sp. — Semblable pour la forme, le dessin et la couleur à l'espèce précédente (*C. parviceps* Montand.); la même tête petite, plus étroite que le quart de la largeur du pronotum en arrière, avec les joues convergentes et confluentes au sommet, dépassant à peine le niveau antérieur des yeux; ces derniers presque plus longs que larges; les mêmes taches jaunes sur les joues et sur le vertex; n'en diffère que par la taille plus petite, la tête encore moins proéminente au devant des yeux, le sillon transversal du pronotum mieux accusé par une ligne enfoncée ininterrompue, la bande noire médiane longitudinale sur la partie antérieure du pronotum plus étroite, moins bien accusée, ainsi que par les branches externes des accents circonflexes de chaque côté qui sont amincies et rembrunies, non noires; les points enfoncés au côté interne des dilatations latérales concolores, ces dilatations très étroites, coupées droites, non arrondies extérieurement; la callosité basilaire de l'écusson plus bombée, mieux arrêtée en arrière par une ligne ininterrompue, plus forte, mieux accentuée, même sur le disque; l'abdomen est lisse, les irradiations jaunes s'étendent, rembrunies sur leur moitié interne, jusque près du milieu de l'abdomen; le bord postérieur du 5<sup>e</sup> segment ventral n'est pas échancré au milieu; le 6<sup>e</sup> segment est caréné transversalement près du bord postérieur au devant de la pièce génitale ♀; cette carène est jaune. Les tibias sont sillonnés et quelque peu rembrunis, comme chez *C. parviceps* Montand.

Un seul exemplaire ♀, longueur et largeur 4 1/3 millimètres.

Java. — Musée Nat. Hong. Budapest. ✓

✓ **Coptosoma Howathi** n. sp. — Jaunâtre, flavescent, avec des points enfoncés brunâtres, assez espacés sur la partie antérieure du pronotum et la callosité basilaire de l'écusson, plus denses et

manuscript 1-377 - Univ. Jour. 40:134

réunis par groupes formant nuages sur la partie postérieure de l'écusson.

Tête petite, assez brillante, très finement pointillée-ridée, très peu proéminente au devant des yeux; joues très convergentes et confluentes devant le tylus qui est raccourci, jaunâtres en dedans du bord antérieur, qui est largement noir et subsinué près de l'extrémité des joues. Tylus et partie postérieure de la tête brunâtres; un point jaunâtre très allongé longitudinalement, sur le vertex derrière la base du tylus.

Pronotum à ponctuation très fine et rare sur la partie antérieure, avec le dessin à peu près semblable à celui des deux espèces précédemment décrites, *C. parviceps* et *capitulatum* Montand., c'est à dire à bord antérieur étroitement noir, envoyant en arrière une ligne médiane longitudinale noire jusque sur la ligne transversale de points enfoncés sur le disque, et, de chaque côté de la ligne noire longitudinale un accent circonflexe noir à branche très amincie. Dilatations latérales très peu accentuées, extérieure coupées droites, non arrondies à leur côté externe, et couvertes sur leur surface de points enfoncés assez gros et irrégulièrement disposés. Partie postérieure du pronotum limitée en avant par une suite de points enfoncés irrégulièrement espacés, formant une ligne transversale interrompue par places, surtout sur le milieu du disque.

Callosité basilaire de l'écusson bien accentuée et limitée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue, avec quelques points enfoncés très espacés sur sa surface. De chaque côté de la callosité, un étroit bourrelet lisse suit la base de l'écusson jusqu'à l'angle huméral où il est un peu élargi. Ponctuation de l'écusson plus forte et plus dense de chaque côté près des angles huméraux derrière les bourrelets, et formant ligne derrière la callosité basilaire; réunie par groupes nuageux sur les côtés latéraux, et surtout sur la partie postérieure de l'écusson, où les taches pâles lisses paraissent légèrement calleuses.

Dessous de la tête noirâtre, antennes jaunâtres à la base, rembrunies sur les trois derniers articles, rostre brun, pattes jaunâtres, tibias légèrement rembrunis, assez fortement sillonnés. Poitrine et hanches noirâtres. Abdomen noir brillant sur le disque, fortement ponctué sur la base des segments, largement jaunâtre sur les côtés et sur la marge; les taches jaunes échancrées au côté interne par le noir du disque qui se continue en lignes de points noirs le long de la base des segments, au travers de la bordure jaune; le reste des parties jaunes avec une ponctuation assez forte et concolore.

Pièce génitale ♂ très petite, ayant environ 1/5 de la plus grande

largeur abdominale. Écusson très faiblement échancré au dessus de la pièce génitale ♂.

Un unique exemplaire ♂, longueur et largeur  $3 \frac{4}{5}$  millimètres. Chine. — Musée Nat. Hong. Budapest.

Cette espèce fait partie du même groupe que les *C. parviceps* Montand. et *C. capitulatum* Montand. Elle en diffère surtout par la taille plus faible, la ponctuation beaucoup plus forte, et le mode de coloration de l'abdomen.

✓ *Coptosoma insignitum* n. sp. — D'un noir très intense, brillant, avec une double bordure d'un jaune rougeâtre sur les côtés latéraux du pronotum; le limbe et une grande tache irrégulière sur le milieu de la partie postérieure de l'écusson jaunâtres, fortement pointillés de noir.

Tête entièrement noire, brillante, avec quelques fines rides très superficielles, étroite, ayant environ le quart de la plus grande largeur du pronotum; yeux assez saillants, mais non transverses. Tylus atteignant le bord antérieur de la tête, un peu rétréci à son extrémité entre les joues, qui sont légèrement convergentes et peu atténuées en avant, assez proéminentes au devant des yeux, et assez brusquement coupées au sommet, le bord antérieur de la tête paraissant quelque peu tronqué.

Pronotum noir brillant, à ponctuation presque nulle sur la partie antérieure, avec les dilatations latérales jaunes limitées à leur partie interne par une ligne oblique assez régulière de points enfoncés noirs; cette ligne de points est bordée à son côté interne d'un second liseré jaune écourté en avant, où il n'atteint pas le bord antérieur du pronotum. Partie postérieure du pronotum grossièrement mais superficiellement ponctuée, avec une tache jaunâtre irrégulière, ponctuée de noir, au devant des angles latéraux.

Partie visible de la corie brunâtre.

Écusson à callosité basilaire peu accentuée, presque lisse, limitée en arrière par une dépression ponctuée quelque peu interrompue sur le milieu, avec une très petite tache rougeâtre de chaque côté près des extrémités. Plaques latérales en dehors des extrémités de la callosité sur la base de l'écusson, étroites, ponctuées, pas nettement limitées. Surface de l'écusson grossièrement quoique assez superficiellement ponctuée. En dedans du bord externe en étroit bourrelet brun, l'écusson est orné sur les côtés latéraux d'un liseré d'un jaune rougeâtre, effrangé à son côté interne, un peu plus large et ponctué de noir en avant. Sur le milieu de la partie postérieure, la couleur jaune rougeâtre du limbe s'avance fortement ponctuée de noir sur la partie déclive de l'écusson. Écusson très faiblement et obtusément échancré, plutôt sinué, au dessus

de la pièce génitale ♂; cette dernière brune, très petite, au moins aussi étroite que la tête entre les yeux.

Dessous de la tête noir, dessous des dilatations latérales du pronotum jaunes; poitrine grisâtre; antennes et pattes jaunâtres, tibias sillonnés, rostre brun; abdomen poli, brillant, à ponctuation très superficielle sur les bords postérieurs des segments, d'un noir intense sur le milieu et le long des sutures des segments, avec de grandes taches transversales d'un rouge brun foncé qui s'avancent peu distinctes presque jusque sur le milieu du disque; sur les côtés de l'abdomen, ces taches transversales deviennent subitement jaunes sur toute la largeur du segment sur les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> segments, très rétrécies en arrière sur le 3<sup>e</sup> segment; sur les 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> segments, l'angle antérieur externe est seul avec une tache jaune un peu transversale, et sur le 6<sup>e</sup> segment, le jaune envahit de nouveau toute la largeur du segment, sur le bord près de la marge, et s'avance, atténué sur le disque presque jusque sur le milieu. Marge abdominale jaune, coupée de brun sur la prolongation de la suture des segments.

Un unique exemplaire ♂, longueur et largeur  $3 \frac{2}{5}$  millimètres. Iles Philippines (Semper). — Musée de Stockholm.

Cette espèce qui n'appartient à aucune des coupes de Stål, paraît établir un passage entre le groupe des *C. ictericum* Dall., *C. obtusiceps* Stål etc., et celui des *C. atomarium* Germ., *C. respersum* Bergr. etc., par l'intermédiaire des *C. frontatum* Montand. et *C. terminale* Montand.

✓ *Coptosoma acuticeps* n. sp. — Jaunâtre avec les lignes de la partie antérieure du pronotum et de la base de l'écusson d'un noir brunâtre; la partie postérieure du pronotum et l'écusson, sauf la callosité basilaire, finement et peu densément ponctués de points enfoncés bruns.

Tête petite, ayant environ le quart de la plus grande largeur du pronotum, jaune, lisse et brillante, atténuée en avant; tylus à côtés parallèles, atteignant le bord antérieur de la tête, imperceptiblement plus long que les joues, rembruni sur la base et sur l'extrémité. Deux taches triangulaires d'un brun foncé, contiguës sur la base de la tête, couvrant de chaque côté la région des ocelles. Yeux globuleux, assez saillants, mais non transverses.

Partie antérieure du pronotum lisse, séparée de la partie postérieure par une assez forte ligne enfoncée noirâtre, transversale sur le disque du pronotum; les extrémités atténuées de cette ligne ne touchent pas tout à fait les côtés latéraux du pronotum. Bord antérieur du pronotum étroitement noir derrière la tête; une large ligne brune ondulée en accent circonflexe de chaque côté, passe transversalement sur le milieu de la partie antérieure lisse, qui est

aussi coupée longitudinalement par une ligne médiane brune plus large en avant qu'en arrière. Sur les dilatations latérales, on observe quelques très petits points enfoncés, bruns, épars, et à leur côté interne, ces dilatations sont limitées par une fine ligne oblique brune formée de points enfoncés et à peine interrompue par places. La partie postérieure du pronotum est couverte d'une ponctuation brune assez espacée, les points bruns un peu plus gros et quelque peu confluents par places sur le milieu. Une petite tache subarrondie, brunâtre, de chaque côté sur l'angle latéral.

Partie visible de l'élytre jaunâtre, lisse, calleuse.

Callosité basilaire de l'écusson large, lisse, avec quelques très petites taches rougeâtres à peine visibles de chaque côté du milieu; assez accentuée et bien limitée en arrière par une ligne noirâtre ininterrompue, légèrement sinuée en dedans au milieu; cette ligne noirâtre arrive sans interruption jusqu'aux angles antérieurs de l'écusson, limitant aussi en arrière les plaques latérales lisses qui sont séparées de la callosité basilaire par une forte ligne enfoncée noirâtre oblique; ces plaques latérales se superposent sur les extrémités de la callosité basilaire dont elles paraissent faire le prolongement.

Derrière la callosité, la surface de l'écusson est entièrement et assez uniformément couverte d'une très fine ponctuation brune et rare.

Dessous de la tête et prosternum jaunâtres; poitrine noire sur le milieu, entre les hanches, grisâtre sur les méso- et métapleures, ces pièces jaunâtres sur les bords.

Marge abdominale et abdomen entièrement jaunes, ce dernier un peu rembruni sur le milieu du disque où les sutures des segments sont assez largement noirâtres, surtout vers la base de l'abdomen, où la bande jaune du 2<sup>e</sup> segment est un peu interrompue au milieu. Région des stigmates sur le côté interne de la marge abdominale très faiblement rembrunie. Pièce génitale ♀ très petite, plus étroite que la tête entre les yeux; ♂ inconnu.

Antennes, rostre et pattes jaunâtres, ces dernières assez grêles, tibias non sillonnés.

\*Un unique exemplaire ♀, longueur  $3\frac{2}{3}$  mill., largeur  $3\frac{1}{3}$  mill.  
Iles Philippines. — Musée de Stockholm.

Cette espèce est assez voisine de *C. atomarium* Germ., à laquelle elle ressemble beaucoup. Elle en diffère par la forme du tylus à côtés parallèles, un peu plus long que les joues qui ne sont que très imperceptiblement convergentes à leur extrémité, par la bande noirâtre ondulée de la partie antérieure du pronotum ininterrompue au milieu, par la tache brune humérale sur l'angle latéral du pronotum, par la callosité basilaire un peu plus large,

lisse et presque immaculée, et enfin par la coloration presque entièrement jaune du dessous de l'abdomen.

✓ *Coptosoma immaculatum* n. sp. — Entièrement d'un flave jaunâtre à ponctuation fine et concolore sur la partie supérieure; poitrine rembrunie entre les hanches postérieures ainsi que le milieu du disque de l'abdomen.

Tête petite, étroite, ayant un peu moins d'un tiers de la largeur du pronotum entre les angles latéraux, assez proéminente au devant des yeux, atténuée en avant; joues pas plus longues que le tylus, dont les côtés sont subparallèles jusqu'au sommet. Extrême bord postérieur de la tête très étroitement rembruni de chaque côté derrière les ocelles.

Pronotum lisse, brillant, à ponctuation excessivement fine; une ligne enfoncée concolore, ondulée, de chaque côté de la partie antérieure sur la région des cicatrices; dilatations latérales faibles, étroites.

Callosité basilaire de l'écusson bombée, lisse, brillante, bien limitée en arrière par un fort sillon enfoncé ininterrompu. La ligne enfoncée qui limite intérieurement le bourrelet marginal des côtés de l'écusson, très légèrement obscurcie près des angles huméraux, où elle se continue sans interruption pour limiter les bourrelets basilaires qui sont un peu élargis de chaque côté de la callosité basilaire. Ponctuation de l'écusson faible, mais mieux accentuée que sur le pronotum; un peu plus visible de chaque côté près de la base.

Dessous de la tête, antennes, rostre et pattes d'un jaune clair, tibias non sillonnés. Poitrine jaunâtre, mate. Abdomen jaunâtre, rembruni sur le milieu du disque, où les sutures des segments sont aussi largement noirâtres.

Écusson peu profondément et très obtusément échancré au dessus de la pièce génitale ♂ qui est arrondie, de taille moyenne, pas plus large que la tête avec les yeux, jaune, quelque peu rembrunie au milieu et autour du tubercule situé près du bord inférieur.

Longueur  $3\frac{3}{4}$ , largeur  $3\frac{2}{3}$  millimètres.

Indes orientales (coll. Signoret). — K. K. Hofmus, Vienne.

Cette espèce, qui était étiquetée à tort *C. cribrarium* par Signoret, vient se ranger auprès de *C. atomarium* Germ. dont elle a le tylus à côtés parallèles, aussi long que les joues; elle s'en distingue par l'absence de taches, la ponctuation concolore, le manque de ligne enfoncée transversale sur le disque du pronotum, et la taille un peu plus forte.

✓ *Coptosoma abbreviatum* n. sp. — Jaune flave pâle, finement et densément ponctué de noir. Tête moyenne, ayant un peu moins d'un tiers de la plus grande largeur du pronotum. Yeux globuleux, peu

saillants, non transverses. Tylus à côtés subparallèles, atteignant le bord antérieur de la tête, un peu plus long que les joues, ces dernières assez proéminentes au devant des yeux, très atténuées au sommet; sutures du tylus noires; deux taches noires trapézoïdales, contiguës sur la base de la tête, une de chaque côté sur la région des ocelles.

Partie antérieure du pronotum lisse, bien arrêtée en arrière par le sillon transversal du disque en forte ligne noire enfoncée ininterrompue. Bord antérieur du pronotum étroitement noir derrière la tête, le noir se prolongeant de chaque côté en liseré intramarginal derrière le petit bourrelet jaune au niveau des yeux, et se courbant ensuite en arrière pour limiter par une ligne droite toujours noire, enfoncée et ininterrompue, la partie interne des dilatations latérales; ces dernières très étroites. Sur le disque de la partie antérieure, de chaque côté sur la région des cicatrices, un accent circonflexe noir; les branches internes des accents circonflexes ne se rejoignent pas sur le disque qui reste jaune clair, sans taches. Partie postérieure du pronotum couverte d'une ponctuation noire, fine et assez dense, ayant par places des tendances à se rapprocher pour former des nébulosités.

Écusson entièrement couvert d'une ponctuation semblable à celle de la partie postérieure du pronotum, plus dense sur les côtés, un peu plus rare sur la callosité basilaire qui est large, très peu accentuée, mais bien limitée en arrière par une fine ligne noire ininterrompue. De chaque côté sur la base de l'écusson, en dehors des extrémités de la callosité basilaire, les plaques latérales lisses et étroites, à côtés parallèles, forment un bourrelet qui se relie sans interruption au bourrelet du bord externe de l'écusson; ce bourrelet limité tout autour par une ligne enfoncée noire. Sur une étroite bordure, en dedans du bourrelet, la ponctuation tout autour de l'écusson est beaucoup plus fine, presque concolore.

Dessous de la tête et des dilatations latérales du pronotum, antennes et pattes jaunâtres, tibias non sillonnés; poitrine grisâtre; abdomen noir avec la marge d'un jaune pâle, coupée d'un fin trait noir sur la prolongation de la suture des segments; sur les bords de l'abdomen, le long de la marge, une assez grosse tache calleuse d'un jaune pâle, atténuée en arrière, profondément échancrée à son bord interne, paraissant formée de deux taches subtriangulaires superposées, l'antérieure beaucoup plus grande que la postérieure. Sur les derniers segments abdominaux, ces taches sont même étroitement séparées.

♀ longueur 3 mill., largeur  $2\frac{3}{4}$  millimètres.

Barway, Inde boréale (P. Cardon). — Musée R. d'H. N. de Belgique.

Cet insecte est assez voisin des *C. atomarium* Germ. et *C. respersum* Bergr., dont il a la forme générale quoique avec la tête relativement un peu plus large, le mode de coloration, le tylus aussi long que les joues, les dilatations latérales du pronotum étroites; on l'en sépare à première vue par la taille très sensiblement plus faible, la callosité basilaire de l'écusson plus large, l'absence de ligne médiane longitudinale sur la partie antérieure du pronotum, etc.

Je rattache provisoirement à cette espèce un exemplaire ♂ de même provenance, appartenant aussi aux collections du Musée R. d'H. N. de Belgique, qui diffère de la ♀ par l'extension de la teinte noire, extravasée de la ponctuation, réunissant les points, et formant de grandes taches qui envahissent presque tout le disque du pronotum et de l'écusson; les taches jaunes calleuses sur les côtés de l'abdomen sont plus étroites et obliques; la taille est un peu plus faible.

Longueur  $2\frac{2}{3}$  mill., largeur  $2\frac{1}{2}$  millimètres.

*Coptosoma variolosum* n. sp. — D'un jaune paille pâle, légèrement verdâtre, parsemé de gros points enfoncés noirs, assez régulièrement espacés.

Tête petite, ayant environ un tiers de la largeur du pronotum entre les angles latéraux, peu proéminente devant les yeux, atténuée en avant, où les joues sont convergentes mais non confluentes; tylus aussi long que les joues, libre mais très rétréci au sommet. Extrême bord antérieur des joues très étroitement noir, ainsi que deux très petites taches à la base du tylus; deux taches noires triangulaires à la base de la tête sur la région des ocelles.

Marge antérieure du pronotum noire derrière la tête; l'extrême bord des dilatations latérales très étroitement noir; une ligne oblique de points enfoncés noirs à la partie interne des dilatations latérales; une ligne sinuée noire interrompue, transversale, sur la partie antérieure lisse du pronotum, formant vaguement une paire de lunettes, les branches intérieures de l'accent circonflexe étant doubles sur les cicatrices.

Sillon transversal du pronotum formé par une ligne irrégulière de points enfoncés, assez denses, mais bien nettement séparés les uns des autres; derrière cette ligne, qui est située après le premier tiers du pronotum, la surface est parsemée de points enfoncés noirs et espacés, de même que toute la surface de l'écusson; ces points un peu plus denses et cerclés de noir sur la callosité basilaire qui est fort peu accentuée, quoique bien visible, et limitée en arrière par une ligne irrégulière et interrompue de points enfoncés

et espacés les uns des autres, plus denses cependant que sur la surface du reste de l'écusson. La ligne enfoncée noire, intramarginale, qui borde l'écusson latéralement et postérieurement, se replie antérieurement pour former les bourrelets huméraux. En dedans de cette ligne noire, une étroite bordure reste imponctuée.

Antennes et pattes d'un jaune paille clair, tibias faiblement sillonnés. Dessous de la tête et des dilatations latérales prothoraciques jaunâtres. Poitrine grisâtre, mate. Abdomen noir brillant avec une assez grosse ponctuation en ligne sur la base, le milieu et le bord postérieur des segments, et quelques fines rides longitudinales très superficielles. Une large bordure jaune couvrant la marge et les côtés des segments abdominaux, avec deux points noirâtres reliés par une ligne oblique au côté interne de la marge, limitant le bord externe de chacun des segments. Sur le bord de chaque segment deux taches jaunes transversales soudées ensemble, s'avancent sur le disque aussi longues que la largeur du segment, et scindées au côté interne.

Pièce génitale ♂ arrondie, très grande, plus large que la tête avec les yeux, avec un liseré jaune élargi et sinué sur les côtés latéraux, et un tubercule jaune au milieu, un peu au dessus de la marge inférieure. Écusson très obtusément échancré au dessus de la pièce génitale ♂; ♀ inconnue.

Longueur  $4\frac{1}{3}$  mill.; largeur 4 millimètres. — 1 seul exemplaire. Lux, côtes du Loango (1879). — K. K. Hofmus. Vienne.

Cette espèce paraît établir un passage entre *C. nubilum* Germ., dont elle a la forme plus étroite et le genre de coloration, et les *C. confusum* Montand., *C. nebulosum* Montand., *C. leviusculum* Montand., à forme plus élargie, à callosité basilaire de l'écusson limitée en arrière par des points enfoncés plus ou moins réguliers, la tête à joues convergentes, mais non confluentes au sommet, les tibias sillonnés, etc. Elle pourrait bien être très voisine, sinon identique, de *C. repleta* Walk., mais la description trop incomplète de l'auteur n'est pas suffisante pour reconnaître une espèce. *C. varolosum* Montand. doit cependant en différer par sa couleur beaucoup plus claire, et se rapprocher de ce fait de *C. Colmeroi* Boliv., qui se distingue par la coloration du dessous du corps à trois bandes longitudinales noires, et les pattes rougeâtres avec les ongles noirs.

✓ *Coptosoma apiatum* n. sp. — Noir, très convexe, avec la partie antérieure du pronotum d'un jaunâtre pâle, ornée de taches et lignes noires; une tache d'un jaune pâle transversale sur la base de l'écusson, et de très petites taches d'un jaune pâle, éparses, assez éloignées les unes des autres, sur la surface de l'écusson.

Tête petite, ayant environ le quart de la largeur du pronotum entre les angles latéraux, assez proéminente au devant des yeux; joues convergentes, très étroitement confluentes à l'extrémité devant le tylus qui est légèrement raccourci. Bord antérieur de la tête, sutures et base du tylus, noirs, ainsi que deux grandes taches triangulaires contiguës sur la base de la tête, une de chaque côté, couvrant largement la région des ocelles. Surface des joues jaunâtre, ainsi qu'une petite tache derrière la base du tylus.

Pronotum brillant, entièrement lisse sur la partie antérieure qui est jaune, ornée de chaque côté d'un large accent circonflexe noir, échancré au sommet, et à petite ligne jaune transversale sur sa branche interne. Dilatations latérales amples, limitées à leur côté interne par une large ligne noire oblique, irrégulière; le bord externe des dilatations très étroitement noir ainsi que le bord antérieur du pronotum. Point de sillon transversal sur le disque du pronotum où l'on n'observe que quelques rares points enfoncés, assez superficiels, de chaque côté, avec quelques petites taches jaunes vermiculées sur le milieu du disque. Entièrement noir brillant sur la partie postérieure, à ponctuation excessivement fine, à peine visible.

Partie visible de la corie d'un jaune pâle, lisse, calleuse.

La base de l'écusson est ornée d'une tache d'un jaune pâle, transversale, légèrement calleuse, surtout sur les extrémités, lisse, mais très irrégulière, rongée et pointillée de noir à son bord postérieur, où il n'a pas trace de ligne enfoncée transversale pour la limiter. Milieu du disque de l'écusson presque lisse, ponctuation un peu plus visible sur les côtés et un peu plus accentuée près des angles huméraux. Toute la surface de l'écusson noire, brillante, parsemée de petites taches jaunes irrégulières et assez espacées les unes des autres. La tache jaune calleuse de la base de l'écusson s'étend, très amincie de chaque côté, jusqu'à l'angle huméral, où l'étroit bourrelet externe de l'écusson se poursuit en noir sur les côtés latéraux, et en brun sur la partie postérieure de l'écusson avec la ligne enfoncée qui le limite noire tout autour. En dedans de cette fine ligne noire enfoncée, l'écusson est étroitement jaune tout autour, la teinte jaune rongée, effrangée à son côté interne.

Pattes rougeâtres, tibias non sillonnés, rembrunis sur leur moitié apicale.

Poitrine mate, d'un noir grisâtre. Abdomen noir, très brillant, paraissant imponctué, avec la marge étroitement d'un jaune pâle, coupée de noir sur la prolongation des sutures des segments, et deux taches jaunes sur le bord de chaque segment, l'antérieure

ornée d'un très petit point noir, plus de deux fois plus large que la postérieure.

Un exemplaire ♀, longueur 4  $\frac{1}{5}$  mill., largeur 4  $\frac{1}{2}$  millimètres.

Congo (G. Hoton). — Musée R. d'H. N. de Belgique.

Cette espèce est très voisine de *C. Falloui* Montand., auprès de laquelle elle vient naturellement se ranger; elle en diffère par la taille un peu plus robuste, la ponctuation plus fine et superficielle, la teinte noire, non bronzée, plus étendue, les dilatations latérales du pronotum plus grandes, et la large tache jaune transversale sur la base de l'écusson.

✓ *Coptosoma cyanescens* n. sp. — D'un beau bleu d'acier sur toute la partie supérieure et le dessous de l'abdomen, avec quelques taches jaunes sur les joues, le devant du pronotum, le pourtour de l'écusson et les côtés de l'abdomen.

Tête petite, lisse, brillante, étroite, ayant un peu moins d'un tiers de la largeur du pronotum entre les angles latéraux, assez proéminente au devant des yeux, atténuée en avant. Joues convergentes et confluentes au sommet devant le tylus qui est raccourci, largement bordées de noir sur leur bord extérieur, et assez finement le long des sutures du tylus, avec une tache jaune atténuée en avant, plus large en arrière, où elle est profondément sinuée à son bord postérieur entre l'œil et la base du tylus; ce dernier noir ainsi que toute la partie postérieure de la tête, qui est ornée d'un point jaune derrière la base du tylus.

Pronotum d'un bleu métallique foncé, brillant, lisse sur la partie antérieure, finement et peu densément ponctué sur la partie postérieure. Dilatations latérales très larges, avec un très fin liseré jaune intramarginal derrière le bord externe qui est très étroitement noir. En dedans de l'extrême bord antérieur étroitement noir, une suite de taches jaunes plus ou moins soudées ensemble, forment un liseré très vermiculé à son bord interne, se prolongeant obliquement de chaque côté en arrière, en dedans des dilatations latérales, toujours d'une façon irrégulière, en ligne vermiculée, jusque devant l'angle latéral du pronotum. Sur le disque du pronotum, un peu avant le milieu, deux autres petites taches jaunes transversales, plus ou moins vermiculées, de chaque côté, simulant une ligne transversale irrégulière. Pas de sillon enfoncé ni de ligne de points coupant transversalement le pronotum.

Écusson de même teinte bleu foncé que le pronotum, à ponctuation très fine, un peu plus accentuée de chaque côté près de la base; callosité basilaire nulle, à peine indiquée sur les côtés; une étroite ligne jaune le long de la base, inégale, vermiculée en arrière, interrompue sur les côtés; un très fin liseré intramar-

ginal jaune, n'atteignant pas la base de chaque côté, et vermiculé à son côté interne; quelques petites taches jaunes près des angles huméraux et le long du bord sur la partie postérieure de l'écusson. Ce dernier obtusément, mais assez profondément échancré au dessus de la pièce génitale ♂.

Les antennes, les pattes et le rostre sont mutilés; les parties qui restent: les trois premiers articles des antennes, les fémurs et le 1<sup>er</sup> article du rostre, sont d'un jaune clair; les hanches postérieures, brunes. Dessous de la tête noir avec deux petites taches jaunes en avant, une de chaque côté. Poitrine grisâtre, mate, avec le dessous des dilatations latérales jaunâtre. Abdomen d'un bleu foncé brillant, couvert de très petites rides longitudinales très superficielles. Marge jaune, coupée d'un trait noir en triangle vis à vis de la suture de chacun des segments. Sur le bord des segments, le long de la marge, une tache jaune occupe l'angle antérieur externe de chaque segment, et sur les 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> segments elle est suivie le long de la marge, de deux autres plus petites, plus ou moins confluentes; sur le 6<sup>e</sup> segment la tache antérieure jaune est en triangle allongé orné d'un point noir, et la tache postérieure, linéaire, plus longue que l'antérieure, suit le long du bord postérieur du segment en s'avancant sur le disque.

Pièce génitale ♂ très grande, en ovale allongé dans le sens de la hauteur, noire, bordée de jaune, avec le tubercule central jaune, rapproché du bord inférieur.

Longueur 5 mill.; largeur de l'écusson en arrière 4  $\frac{1}{3}$  millimètres.

Un seul exemplaire ♂, Congo. — K.K. Hofmus. Vienne.

Malgré la mutilation des pattes qui ne permet pas de constater si les tibias sont sillonnés, je n'hésite pas à ranger cette espèce auprès des *C. transversum* Westw. et *C. Falloui* Montand. Elle est à peu près de même taille que *C. Falloui* Montand., dont elle se distingue par la couleur beaucoup plus foncée, bleue et non bronzée, les taches jaunes beaucoup moins nombreuses, et aussi par la ponctuation beaucoup plus faible.

✓ *Coptosoma bisoculatum* n. sp. — Noir, avec les joues, une double bordure latérale, deux taches sur le devant et deux autres sur le disque du pronotum, deux taches sur la callosité basilaire de l'écusson, jaunes. Deux taches humérales, une de chaque côté près de l'angle latéral du pronotum, et partie postérieure de l'écusson largement, jaunes, pointillées de noir, avec deux grandes taches noires subarrondies, une de chaque côté près des angles latéraux postérieurs de l'écusson.

Tête petite, assez proéminente au devant des yeux, atténuée en avant; joues à peine convergentes au sommet, recouvertes d'une

grande tache jaune triangulaire depuis le niveau du milieu de l'œil, et qui ne laisse que l'extrême bord en avant et le long du tylus très étroitement noir. Tylus noir, aussi long que les joues, à côtés subparallèles. Partie postérieure de la tête entièrement noire et brillante depuis la base du tylus, à ponctuation faible, très superficielle.

Pronotum lisse sur la partie antérieure, à ponctuation fine et espacée sur la partie postérieure. Côtés latéraux avec une large bordure jaune; en avant, cette bordure est fendue en deux par la ligne oblique, noire, enfoncée, qui commence au bord antérieur, et limite les dilatations latérales à leur côté interne; en arrière, cette ligne noire ne rejoint pas le bord externe, et la bordure jaune se continue, atténuée en arrière, jusqu'à l'angle latéral du pronotum. Sur le devant du pronotum, deux petites taches jaunes transversales, intramarginales, et derrière elles, deux autres taches jaunes très transversales, une de chaque côté sur le disque. Au côté interne des angles huméraux, une autre tache jaune irrégulière, subtriangulaire et ponctuée de noir sur les bords; l'angle huméral lui-même très légèrement rembruni.

Partie visible des élytres avec une large marge jaune lisse, brunâtre à l'angle interne.

Écusson à callosité basilaire lisse, très bien limitée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue, avec une grande tache transversale jaune sur chaque extrémité, la partie noire entre les taches, de même largeur que l'une des taches. En dehors de la callosité, de chaque côté sur la base de l'écusson, une petite tache jaune lisse sur le bourrelet, qui est un peu élargi extérieurement. Le disque de l'écusson noir sur toute la largeur derrière la callosité basilaire, sauf sur les côtés latéraux, où le limbe jaune arrive jusqu'à la base assez large et pointillé de noir à son côté interne. Après le premier tiers basal, la tache noire du disque s'éloigne brusquement des côtés latéraux, et s'avance obtusément en arrière sur le milieu de la partie postérieure, qui reste largement jaune, densément ponctuée de noir, avec deux grandes taches subarrondies, noires, une de chaque côté aux angles postérieurs, en dedans du liseré jaune; la ponctuation noire, de plus en plus fine vers le bord postérieur qui reste étroitement imponctué, jaune jusque sur l'extrême bord, avec une fine ligne enfoncée noirâtre limitant tout autour l'étroit bourrelet marginal.

Dessous de la tête et des dilatations latérales du pronotum presque entièrement jaunâtres; poitrine grisâtre, mate; abdomen noir, brillant, ponctué, avec la marge jaune, et une tache jaune, calleuse, oblique, irrégulière, au côté externe de chaque segment, le long de la marge, cette tache paraissant formée de deux taches dont l'anté-

rieure plus grande, étroitement soudées ensemble et scindées sur les 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> segments; sur ce dernier surtout, la tache postérieure, aussi grande que l'antérieure, se prolonge sur le bord postérieur du segment devant la pièce génitale ♀ qui est petite, jaune à sa partie supérieure, noire à la partie inférieure; ♂ inconnu. Pattes et antennes jaunes, tibias non sillonnés.

Longueur 3 1/4 mill., largeur 3 1/8 millimètres.

Barway, Inde boréale (P. Cardon). — Musée R. d'H. N. de Belgique.

Cette espèce est très voisine des *C. W* Montand. et *C. caudatum* Montand., entre lesquels elle paraît établir un passage comme mode de coloration; elle est un peu plus petite que *C. W* Montand., avec laquelle on serait peut-être tenté de la confondre, mais chez cette dernière espèce, de même que chez *C. caudatum* Montand., la teinte jaune de la partie postérieure de l'écusson est couverte d'une ponctuation très fine, à peine visible, qui permet de les reconnaître très facilement.

✓ *Coptosoma W* Montand. — La description de cet insecte (*Revue d'Entom.* 1893, p. 237) ne concernait que les ♀; un arrivage d'une nouvelle série d'individus me permet de combler cette lacune. Les exemplaires ♂ de Barway, Inde boréale, que j'attribue à cette espèce, n'ont pas le W jaune sur l'écusson, mais seulement une échancrure coupée en carré sur la partie postérieure de l'écusson; cette échancrure, très irrégulière, fait même quelquefois défaut, et le limbe est seulement plus élargi, ayant alors une ressemblance presque parfaite avec *C. lascivum* Bergr. dont *C. W* Montand. ♂ se distingue par la taille un peu plus forte, l'absence de dent aiguë au milieu de l'échancrure du bord postérieur de l'écusson, la pièce génitale plus petite, non échancrée à son bord inférieur. Cette pièce génitale ♂ est cependant d'assez grande dimension, plus large que la tête entre les yeux, avec un fort bourrelet calleux jaune à sa partie supérieure, une bordure latérale jaune unidentée intérieurement au milieu, et deux très petits points jaunes, un de chaque côté du milieu, sur le bord inférieur. Les taches jaunes abdominales sont réduites à un trait jaune calleux, sur le bord près de la marge, et dentelé à son côté interne, plus large antérieurement. Comme taille il est un peu plus petit que la ♀, aussi large que long, 3-3 1/3 millimètres.

Un exemplaire ♀ du Musée R. d'H. N. de Belgique est aussi sans W sur l'écusson, lequel est seulement à liseré jaune élargi postérieurement, mais il reste bien reconnaissable à ses longues taches transversales jaunes calleuses de l'abdomen.

Dans les deux sexes il arrive parfois que les traits transversaux



du disque du pronotum sont très atténués ou disparaissent même entièrement.

**Coptosoma bilineatum** Signoret, inédit. — Noir, joues jaunes, deux lignes transversales parallèles jaunes sur la partie antérieure du pronotum, interrompues au milieu; une double bordure latérale jaune au pronotum; deux grandes taches transversales orangées, une sur chaque extrémité de la callosité basilaire de l'écusson; deux petites taches jaunes, claires, transversales, sur la base de l'écusson, une de chaque côté en dehors de la callosité basilaire, touchant l'angle antérieur de l'écusson; liseré de l'écusson jaune, bien arrêté au côté interne, raccourci de chaque côté, où il n'atteint pas la base.

Tête petite, noire, très finement ponctuée sur toute la surface, assez proéminente au devant des yeux, atténuée en avant; joues très peu convergentes, pas plus longues que le tylus, dont les côtés sont parallèles presque jusqu'à l'extrémité et qui est imperceptiblement atténué au sommet. Joues jaunes, depuis le niveau du milieu de l'œil jusqu'à l'extrême bord antérieur qui est imperceptiblement bordé de brun, assez largement noires le long de la suture du tylus, ce dernier brunâtre vers l'extrémité et jaune au sommet.

Partie antérieure du pronotum d'un jaune pâle, imponctuée, avec l'extrême bord antérieur et les côtés latéraux très étroitement bordés de noir; une ligne oblique de points noirs enfoncés à la partie interne des dilatations latérales; ces dernières faibles, étroites, et coupées extérieurement en ligne droite, non arrondie, si ce n'est sur les extrémités, parallèle sur la plus grande partie à la ligne oblique qui les limite à leur partie interne. Une forte ligne noire transversale, élargie sur les extrémités, et une ligne noire longitudinale plus large en avant qu'en arrière sur le milieu de la partie antérieure jaune.

La bordure latérale jaune du pronotum se continue jusque derrière l'angle latéral. Le reste de la partie postérieure du pronotum entièrement noir, très finement ponctué.

Callosité basilaire de l'écusson nettement arrêtée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue, avec une large tache ovale, orangée, lisse de chaque côté sur les extrémités, l'espace noir restant entre les taches un peu moins large que l'une des taches. En dehors des extrémités de la callosité, le bourrelet basal de l'écusson, un peu élargi au côté externe, est entièrement d'un jaune pâle, lisse. Écusson très finement et densément ponctué, cette ponctuation un peu plus visible sur les côtés latéraux près de la base. Le limbe jaune commence de chaque côté, à peu près au premier tiers basal.

Partie visible de la corie d'un jaune clair sur la marge, brunâtre à l'angle interne.

Pattes jaunes, tibias non sillonnés, fémurs rembrunis sur les deux tiers basilaire. Poitrine grise; ventre noir, finement et densément ridé-ponctué, avec la marge d'un jaune pâle, coupée d'un très fin trait brunâtre vis à vis de la suture des segments; une tache jaune calleuse sur le bord de chaque segment le long de la marge, atténuée en arrière.

♀ longueur 3 1/3 mill., largeur 3 millimètres.

Chine? — K. K. Hofmus. Vienne.

Cet insecte, qui provient de la collection Signoret sous le nom que je lui ai conservé, ressemble beaucoup à *C. variegatum* H. S. dont il a assez exactement le dessin; il en diffère par la taille un peu plus grande, la callosité basilaire de l'écusson plus large, le limbe jaune de l'écusson qui n'arrive pas jusqu'à la base, les dilatations latérales du pronotum plus étroites et tronquées, non arrondies extérieurement, et l'absence de point jaune huméral au pronotum.

✓ **Coptosoma Aurivillianum** n. sp. — Noir, avec les joues, une large bordure latérale au pronotum, les cories et le liseré de l'écusson d'un jaune clair et deux grandes taches orangées, une de chaque côté, sur la callosité basilaire de l'écusson.

Tête brillante, presque lisse, très faiblement ridée transversalement, assez proéminente au devant des yeux, atténuée en avant. Joues jaunâtres, très peu convergentes au sommet, avec l'extrême bord externe très étroitement brun, bordées de noir le long de la suture du tylus, ce dernier noir, aussi long que les joues, à côtés subparallèles, très peu atténué au sommet qui est brunâtre.

Pronotum noir, très finement et densément ponctué, sillon transversal nul; côtés latéraux avec une large bordure calleuse, lisse, d'un jaunâtre clair, bisinuée à son côté interne, avec une ligne oblique de points noirs enfoncés qui coupe, dans le sens de la longueur, la moitié antérieure de la bordure, sur le niveau du côté interne des dilatations latérales. La bordure jaune s'étend en arrière jusques et y compris l'angle latéral.

Partie visible de la corie jaunâtre, à peine rambrunie à l'angle interne.

Callosité basilaire de l'écusson très peu accentuée, mais bien limitée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue, couverte sur toute sa surface d'une très fine ponctuation assez dense, mais peu visible, même sur les deux larges taches d'un jaune orangé qui couvrent, une de chaque côté, les extrémités de la callosité, et paraissant à peine plus lisses que le milieu de la callosité.

Ponctuation de l'écusson très fine et espacée sur le disque, un

peu plus dense sur les côtés; limbe jaune, large, atténué de chaque côté en avant, où il n'atteint pas la base de l'écusson.

Poitrine grisâtre; dessous de l'abdomen noir, brillant, finement ponctué, avec la marge jaune, et une tache longitudinale calleuse, jaune, lisse, sur le bord externe de chaque segment, le long de la marge.

Pattes et antennes d'un jaune clair, fémurs rembrunis ainsi que le rostre.

Un exemplaire ♀, longueur  $2 \frac{2}{5}$  mill., largeur  $2 \frac{2}{5}$  millimètres.

*Svakop, Afrique du Sud-Est* (J. Wahlberg). — Musée de Stockholm.

Cette espèce ressemble un peu pour la taille et le dessin à *C. Stålii* Montand. (= *marginellum* Stål var. C, nec Dallas); elle s'en distingue nettement par les dilatations latérales du pronotum imponduées, complètement recouvertes par la large bordure calleuse, lisse et jaune des côtés latéraux du pronotum; par l'absence de taches jaunes sur le bord antérieur du pronotum; par les dimensions et la couleur des grandes taches orangées de la callosité basilaire de l'écusson, et le limbe plus large de ce dernier.

✓ *Coptosoma Junodi* n. sp. — Noir, fortement bombé, brillant sur le pronotum, finement et densément ponctué sur la tête et sur l'écusson, avec de petites taches jaunes sur les joues, sur le devant du pronotum et sur les extrémités de la callosité basilaire de l'écusson. Bordure latérale du pronotum jaunâtre; limbe de l'écusson jaunâtre, très densément couvert d'une fine ponctuation brunâtre.

Tête petite, ponctuée-ridée sur toute la surface, même sur les parties jaunes des joues, peu proéminente au devant des yeux, subsemicirculaire en avant; joues largement jaunes, sauf le bord externe qui est étroitement noir, et une bordure noire le long de la suture du tylus, convergentes mais non confluentes en avant, où le tylus noir, sensiblement rétréci au sommet, arrive aussi long que les joues au bord antérieur de la tête.

Pronotum avec deux petites taches jaunes sur le bord antérieur, une de chaque côté, au niveau de la partie comprise entre l'œil et l'ocelle. Dilatations latérales du pronotum entourées le long du bord externe d'un liseré intramarginal jaune très élargi en avant et en arrière; densément ponctuées sur toute la surface depuis le liseré jaune de la marge; la ponctuation enfoncée mais concolore, couvrant aussi la partie jaune élargie au côté antérieur. Sillon transversal du pronotum nul, à dépression presque invisible.

Partie visible de la corie jaune le long de la marge, noire à l'angle interne. Callosité basilaire de l'écusson assez large, peu bombée, assez nettement arrêtée en arrière par une fine ligne enfoncée; cette ligne un peu atténuée, moins visible sur le milieu

du disque. Un assez gros point jaune orangé lisse de chaque côté sur la callosité, non loin des extrémités. Limbe jaune de l'écusson très atténué sur les côtés latéraux, ne commençant qu'après le premier tiers basal, un peu élargi en arrière, et densément couvert de très fins petits points bruns. Ponctuation de l'écusson presque nulle sur le disque, mieux marquée sur les côtés et surtout vers les angles huméraux.

Poitrine grisâtre. Abdomen noir, brillant, assez fortement et densément ponctué, avec la marge jaune largement coupée de noir sur la prolongation de la suture des segments, et une tache jaune, calleuse, allongée, irrégulière, atténuée en arrière, sur le bord de chacun des segments le long de la marge. Antennes et rostre brunâtres; fémurs noirs, sauf sur l'extrémité qui est jaunâtre ainsi que les tibias et les tarses; tibias non sillonnés.

Longueur et largeur  $3 \frac{1}{5}$  millimètres.

Un seul exemplaire ♀, *Mozambique*, Rikatla (M. H. Junod). — Ma collection.

De plus grande taille que *C. Stålii* Montand., cette nouvelle espèce se rapprocherait assez de *C. bisignatum* Stal, mais outre sa convexité bien plus accentuée, elle se distinguera facilement par la ponctuation brune, fine et dense, qui couvre le limbe de l'écusson.

✓ *Coptosoma libidinosum* n. sp. — Noir, finement ponctué, avec une large bordure d'un jaune orangé sur les côtés latéraux du pronotum, cette bordure coupée en avant dans le sens de sa longueur par une ligne noire enfoncée; deux taches sur la base et liseré de l'écusson de même couleur jaune orangé que la bordure latérale du pronotum.

Tête petite, entièrement noire, ayant environ un tiers de la largeur du pronotum, un peu proéminente et semicirculaire au devant des yeux; joues très ridées-ponctuées, pas plus longues que le tylus; celui-ci, à côtés parallèles et finement ponctué, atteint le bord antérieur de la tête; vertex à ponctuation très superficielle mais bien visible.

Pronotum presque lisse, à ponctuation très fine et superficielle, sans traces de sillon transversal, les dilatations latérales de moyenne grandeur, entièrement d'un jaune orangé, sauf le bord externe qui est très étroitement noir. A la partie interne de la dilatation, une ligne enfoncée noire part du bord antérieur du pronotum au niveau du côté externe de l'œil, mais n'arrive pas tout à fait en arrière jusqu'au bord du côté latéral du pronotum, où la bande jaune qui couvre la dilatation rejoint une seconde ligne jaune oblique longeant en dedans la ligne enfoncée noire qui limite les dilatations latérales à leur côté interne, depuis derrière l'étroite

marge noire du devant du pronotum au niveau du milieu de l'œil, jusqu'à l'angle latéral du pronotum.

Partie visible de la corie avec une large bordure orangée lisse, noirâtre sur l'angle interne.

Écusson noir, très finement ponctué, presque lisse sur le disque, à callosité basilaire bien marquée et limitée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue, avec une tache transversale d'un jaune orangé de chaque côté près des extrémités, l'espace noir entre les taches, deux à trois fois plus large que l'une des taches. Liseré jaune orangé de l'écusson ne commençant qu'après le premier tiers basal, assez large, couvrant jusqu'à l'extrême bord de l'écusson, derrière lequel une très fine ligne enfoncée noirâtre suit tout autour en coupant plus ou moins visiblement le limbe jaune orangé le long de l'extrême bord. A son côté interne, le liseré n'est pas très bien limité, surtout postérieurement, où il est couvert d'une très fine ponctuation noire assez dense.

Partie inférieure du corps noire; antennes et pattes jaunâtres, tibias non sillonnés; marge abdominale d'un jaune orangé, étroitement coupée de noir sur la prolongation des sutures des segments, et sur le bord de chaque segment, le long de la marge, une tache de même couleur, calleuse, obliquement allongée et atténuée en arrière. Abdomen finement et assez densément ponctué.

Pièce génitale ♂ très grande, plus large que le tiers de la plus grande largeur abdominale, en hexagone irrégulier plus large à la partie supérieure, aussi longue que large, avec un tubercule central pas plus rapproché du bord supérieur que du bord inférieur; noire avec les côtés latéraux étroitement bordés de jaune orangé. Écusson largement tronqué à l'extrémité au-dessus de la pièce génitale. Chez les ♀, l'écusson, arrondi postérieurement, est légèrement sinué au-dessus de la pièce génitale qui est aussi assez grande, allongée, noirâtre, et de chaque côté de cette pièce, le jaune orangé de la marge abdominale s'avance anguleusement en forme de petite dent.

Longueur ♂ 3 mill., ♀ 3 1/4 mill.; largeur ♂ 2 1/8 mill., ♀ 3 mill.

Barway, Inde boréale (P. Cardon). — Musée R. d'H. N. de Belgique.

Cette espèce, très voisine de *C. biguttulum* Motsch., s'en distingue à première vue par le double liseré des bords latéraux du pronotum; elle pourrait bien être très voisine de *C. Siamicum* Walker, mais cette dernière espèce a les joues largement jaunes.

✓ *Coptosoma notabile* n. sp. — Noir, joues étroitement jaunes en avant, une étroite bordure jaune sur les côtés du pronotum et la marge élytrale, deux larges taches orangées sur la base de

l'écusson, et limbe de ce dernier de même couleur, n'atteignant pas la base.

Tête petite, ayant environ un tiers de la largeur du pronotum, un peu proéminente au devant des yeux et atténuée en avant, très finement et superficiellement pointillée-ridée sur toute sa surface, avec les joues étroitement jaunâtres en avant, depuis le niveau du côté antérieur de l'œil; la marge antérieure et le long du tylus bordés de noir. Tylus noir, à côtés subparallèles, très peu atténué à l'extrémité qui atteint le bord antérieur de la tête.

Dilatations latérales du pronotum faibles, bordées d'un étroit liseré jaune derrière le bord externe qui est étroitement noir, ce liseré jaune n'atteignant pas en avant le niveau du côté externe de l'œil; une forte ligne oblique densément ponctué à leur côté interne; un petit trait jaune oblique au devant de l'angle huméral, en dedans du côté postérieur de la ligne ponctué qui limite les dilatations à leur côté interne. Ponctuation du pronotum très faible, à peine visible, dépression transversale sur le disque très superficielle.

Partie visible de la corie noire, étroitement bordée de jaune sur la marge.

Écusson noir, très finement ponctué, la ponctuation un peu plus visible sur les côtés latéraux; callosité basilaire étroite, bien marquée, et limitée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue, aussi finement ponctué que le disque du pronotum, avec deux taches ovales transversales, d'un jaune orangé, une de chaque côté près des extrémités, l'espace noir entre les taches de même largeur que l'une des taches. Liseré intramarginal jaune orangé de l'écusson ne commençant qu'après le premier quart basal, assez large en arrière, avec l'étroit bourrelet marginal et la ligne enfoncée qui le limite noirs tout autour du limbe.

Dessous du corps noir, antennes jaunâtres, rembrunies sur l'extrémité; pattes jaunes, base des fémurs rembrunie. Abdomen brillant, finement et densément ponctué, avec la marge étroite jaune coupée de noir sur le prolongement des sutures des segments, et une petite tache jaune allongée près de l'angle antérieur externe de chacun des segments.

Un unique exemplaire ♀, longueur 3 2/5 mill., largeur 3 1/2 millimètres.

Chine. — Musée Nat. Hong. Budapest.

Très rapprochée de *C. biguttulum* Motsch., cette espèce n'en diffère que par la taille à peine plus grande, les taches jaunes sur les joues, les taches de la callosité basilaire de l'écusson beaucoup plus larges et de couleur orangée, non d'un jaune clair, de même que par le limbe qui est entier et assez large sur la partie postérieure de l'écusson.

**Coptosoma anticum** Signoret, inédit. — Noir, très bombé, très finement ponctué, avec des taches et des bandes jaunes sur les joues, sur la partie antérieure, le disque et les côtés latéraux du pronotum, sur la base et le pourtour de l'écusson et sur les côtés de l'abdomen.

Tête noire, assez large, presque lisse, très finement ponctuée par places, peu proéminente au devant des yeux, semicirculaire en avant; joues convergentes et légèrement valvantes devant le tylus qui est raccourci; un gros point jaune subquadrangulaire sur la base des joues de chaque côté.

Dilatations latérales du pronotum très accentuées, arrondies en dehors, avec un liseré jaune derrière l'extrême bord qui est noir, finement et densément ponctuées à leur partie interne. En dedans de la partie interne des dilatations, une tache jaune, oblique et allongée, commence derrière le bord antérieur du pronotum étroitement noir, au niveau du côté externe de l'œil, et se prolonge en arrière jusqu'au niveau du milieu de la dilatation latérale. Deux autres taches jaunes transversales ornent la marge antérieure du pronotum derrière l'extrême bord noir, une de chaque côté, au niveau de la partie comprise entre le milieu de l'œil et le côté interne de l'ocelle. Sur le disque, deux petites taches jaunes transversales, en arrière et à peu près au même niveau que les précédentes, devant la dépression transversale, faible, mais bien visible du disque du pronotum. Sur les côtés latéraux de la partie postérieure du pronotum, le liseré jaune intramarginal se poursuit en arrière jusque derrière l'angle latéral du pronotum.

Callosité basilaire de l'écusson faible, mais bien limitée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue, quoique très peu visible sur le disque, avec une tache ovale orangée lisse de chaque côté près des extrémités; l'espace noir qui sépare les taches, près de trois fois plus large qu'une des taches. Les bourrelets qui suivent la base de l'écusson de chaque côté, en dehors de la callosité basilaire, noirs, un peu élargis en dehors, avec un très petit point jaunâtre sur leur milieu. Surface de l'écusson très finement ponctuée, presque lisse sur le disque; ponctuation un peu plus visible sur les côtés près de la base. Limbe orangé, nettement arrêté au côté interne, ne commençant qu'après le premier tiers basilaire.

Partie visible de la corie noire, avec la marge d'un jaune pâle.

Pattes rougeâtres, fémurs d'un brun foncé sur les deux tiers basilaires, tibias non sillonnés. Poitrine grise, abdomen noir, finement et assez densément ridé-ponctué. Marge abdominale jaune, coupée d'un trait noir sur le prolongement de la suture des segments, et une tache oblique jaune calleuse sur le bord de chacun des segments, le long de la marge, cette tache atténuée en arrière.

Un seul exemplaire ♀, longueur  $3\frac{1}{3}$  mill., largeur  $3\frac{1}{2}$  mill.  
Indes orientales. — K. K. Hofmus. Vienne.

Je conserve à cet insecte le nom que lui avait primitivement donné Signoret dans sa collection; plus tard cet auteur avait cru pouvoir le rapporter à *C. tondanense* Vollenh., nom qui ne lui convient pas. Cette espèce, très curieuse de par la forme de la tête, a quelques affinités avec les espèces africaines *C. pictulum* Stål, *C. subsimile* Montand. et surtout avec *C. inclusum* Stål, dont elle diffère par la taille plus forte, le pronotum plus atténué en avant, et la tête un peu plus faible proportionnellement. Les taches de la callosité basilaire de l'écusson sont aussi plus larges et de couleur orangée, non jaunâtre.