

Motschulsky 1861

J. T. Pollock

Library No. 2000

Dup.

on list

You may already have
on computer
cat.

ÉTUDES ENTOMOLOGIQUES,

rédigées

par

Victor de Motschulsky,

Lieutenant-Colonel d'Etat-Major, en retraite, &c.

Dixième année.

Déposé: chez M.M. Eggers à St. Pétersbourg, Leopold Voss à Leipzig
et Guérin-Meneville à Paris.

DRESDE.

Imprimerie de Ferdinand Thomass.

1861.

1861

Etud. Ent. 10: 21-24

Author Card

ETUDES ENTOMOLOGIQUES

1861.

Insectes du Japon,
énumérés
par
V. de Motschulsky.
(Continuation.)

COLEOPTÈRES. ENTOMOPHAGES.

CICINDÉLÉTES.

Cicindela japana Motsch. Et. Ent. 1857. D'après des renseignements récents, donnés par M. Gaschkevitch, les exemplaires de couleur plus ou moins vertes, ne sont qu'une variété du mâle de ma *C. aeneovopaca*. Et. Ent. 1860. Il faudra donc réunir ces deux espèces sous le nom de *japana* M.

CARABIQUES.

Pheuginus (Harpalus) corporosus Motsch., ♀ figura Ph. hirtipedi, sed crassior, brevior; subquadragulatus, subconvexus, vix nitidus, niger, palpis antennarumque articulo primo testaceis, haec articulis sequentibus tarsisque piceis; capite obtuso, inter oculos brevissime biimpresso; thorace transverso-quadrato, antice vix arcuato, postice distincto biimpresso, punctulato, linea media subobliterata, angulis posticis rectis; elytris thorace vix latioribus et triplo longioribus, subtiliter crenato-vel cancellato-punctatis, interstiiis fere planis. Long. 5 l.
— lat. elytr. $2\frac{1}{3}$ l.

Pseudoophonus cephalotes Motsch., figura Ps. ruficorni, sed fere quadruplo major, capite latiore; parallelus, subcon-

levissime 5 costatis; convexa, postice subelevata, punctata, nitida, supra aurichalceo-purpurata, subtus cum capite nigro subviolaceo-iridescens; thorace violaceo, transverso, quadrangularato, sparsim punctato, inaequale, lateribus incrassatis, subarcuatis, angulis anticis prominulis, apice obtusis, posticis rectis; scutello violaceo, triangulari, glabro; elytris thorace paulo latioribus et quadruplo longioribus, postice paulo incrassatis, sparsim fortiter punctatis, utrinque 5 costatis, costis vix elevatis, nitidissimis corporeque subtus glabris.

Long. 4 l. — lat. elytr. 2½ l.

Adimonia extensa Motsch., figura et color **Ad. tanaceti** L., sed major, elytris longioribus, costis nigris; elongatovata, convexa, crebre grossso-punctata, subnitida, nigro-fusca, thoracis marginis elytrisque dilutioribus; thorace transverso, inaequale, rugoso-punctato, antice arcuatim, postice subrecto-angustato, lateribus marginatis, subsinuatis, angulis anticis vix prominulis, posticis rectis; scutello subtruncato, grosso-punctato; elytris thorace paulo latioribus et quinduplo longioribus, postice dilatatis, crebre cicatricoso-punctatis, utrinque costis subinterruptis quatuor; corpore subtus sparsim punctulato et brevissime piloso. — Long. 4 l. — lat. elytr. ♂ 2⅔ l. — ♀ 3 l.

HÉMIPTÈRES.

EURYGASTRIDES.

✓ **Graphosoma crassa** Motsch., figura et color **Graph. lineati** L., sed paulo major, presertim latior et crassior; subquadrata, antice convexa, postice deplanata, rugoso-punctata, subnitida, sanguinea, supra lato nigro-lineata, lineis integris, subtus rufotestacea, nigro-maculata, maculis longitudinaliter confluentibus, pedibus nigro-annulatis, antennis nigris; thorace transverso, lateribus medio ampliatis, valde arcuatis, scutello ad medium transverso-impresso. — Long. 5 l. — lat. thor. 3½ l.

PENTATOMIDES.

✓ **Eurydema rugosa** Motsch., figura et color **Eur. ornati**, sed magis cyanea, thorace maculis magnis duabus corioque fere toto nigro-cyanis, postice solum fascia interrupta lateri-

busque sanguineis; abdominis marginis nigro-maculatis; scutello corioque rugoso-punctatis. — Long. 3 l. — lat. thor. 2 l.

✓ **Tropicoris decempunctatus** Motsch. Bull. de Mosc. 1860.

✓ **Cimex angulosus** Motsch., figura et color viridis **C. dissimili**, sed corpore subtus viridiore, angulis thoracis magis prominulis, scutello rugoso-punctato.

Long. 5½—6 l. — lat. thor. 3½—3¾ l.

ASOPIDES.

✓ **Menida** Motsch., n. g.

Ce nouveau genre présente le corselet des *Eusarcoris*, avec les hémélytres allongé-ovalaires comme chez les *Jalla*, mais la principale différence des uns et des autres existe dans le premier segment de l'abdomen, qui se prolonge antérieurement entre les hanches postérieures et intermédiaires, en une longue épine horizontale, qui va jusqu'au prosternum. Tête obtuse, chaperon faiblement attenué, arrondi et un peu échancre en avant, avec deux sillons et une carénule parallèles au milieu. Corselet transversal, obliquement rétréci vers la tête, un peu plus large que les élytres, angles latéraux obtus, peu saillants. Cuisses simples. Une seconde espèce (*Men. fusca* M.) presque le double plus grande se trouve en Morée. Je ne sais pas, s'il y a de ressemblance avec le genre *Telepta* Stål du Brésil.

✓ **Menida violacea** Motsch., figura **Eus. melanocephali**, sed quadruplo major, magis parallela, abdomine lateraliter elytris distincto superante; subovata, nitida, punctata, supra cupreoviolacea, thoracis marginis angustissime, scutello ad apicem abdominalisque maculis lateralis albidis, thoracis basi lato-corporeque subtus livido-testaceis, nigro-punctatis, abdominis medio antennisque nigris, spina antica abdominali albida, pedibus lividis, nigro-variegatis, thorace hemelytris paulo-latiore, subangulato, angulis obtusis, lateribus antice oblique angustatis,

scutello magno; hemelytris postice subattenuato-rotundatis, coreo postice utrinque arcuato, membrana fusco-testacea.

Long. 3½ l. — lat. thor. 2 l.

LYGAEIDES.

Lygaeus equestris L.

Lopus gothicus F.

HYDROCORIDES.

Notonecta triguttata Motsch., figura Not. glaucae, sed hemelytrarum dimidio postico nigro, corio apice triguttato, oculis postice magis approximatis; elongato-attenuato, sordido fusco-testaceo, capite thoraceque lividis, nitidis, hemelytris opacis, puberulis, albo-testaceis, dimidio postico lateribusque nigris, ad marginem corii punctis testaceis tribus; fronte subconvexo, utrinque versus oculos punctato; scutello nigro.

Long. 4½ l. — lat. 1¾ l.

Corisa striata L.

HOMOPTÈRES.

Cicada bihamata Motsch., figura et color C. plebejae Scop., sed major, scutello medio macula bihamata testacea; elongato-attenuata, opaca, supra nigra, rufo-testaceo picta, thorace rufescente, hoc margine, scutellis macula hamata in medio antice, lateribus, apice, alarum venis antice corporeaque subtus testaceis, scutellis abdominalisque lateribus dilute puberulis, alarum venis transversis postice dilatato-nigris; ♀ abdominis segmento penultimo subtus quadrato, ultimo parallelo, apice truncato, tympanis latitudine ½ longioribus; tegminibus plus minusve infuscatis, latitudine 2½ longioribus; femoribus anticis bidentatis, dente postico obliqui.

♂ long. corp. 12 l.	— ♀ long. corp. 16 l.
lat. 5½ l.	lat. 7 l.
exp. alar. 37 l.	exp. alar. 49 l.

Deltoccephalus stramineus Motsch.; magnitudine Tettig. viridi, sed corpore medio subdilatato, antice posticeque attenuato; unicolore livido-stramineus, nitidus, capite conico, antice utrinque puncto nigro, oculis subconvexis, dilutis; thorace transverso, capite paulo latiore, postice angulatum sinuato, angulis rotundatis. — Long. 3½ l. — lat. 1 l.

ETUDES ENTOMOLOGIQUES,

210919

rédigées

par

Victor de Motschulsky,

Lieutenant-Colonel d'État-Major, en retraite &c.

Onzième année.

Déposé: chez M. M. Eggers à St. Pétersbourg et Guérin-Meneville à Paris.

DRESDE.

Imprimerie de Ferdinand Thomass.

1862.